

Tabellenboek Zorgmonitor 2019

Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte:
2005-2018



NIVEL
Kennis voor betere zorg

Tabellenboek Zorgmonitor 2019

Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte:
2005-2018

Juliane Menting
Femke van Schelven
Rosa Grosscurt
Peter Spreeuwenberg
Monique Heijmans

December 2019

ISBN 978-94-6122-598-6

030 272 97 00
nivel@nivel.nl
www.nivel.nl

© 2019 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT

Gegevens uit deze uitgave mogen worden overgenomen onder vermelding van Nivel en de naam van de publicatie. Ook het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Inhoud

1	Leeswijzer	4
2	Leven met een chronische ziekte	5
3	Gebruik van zorg en ondersteuning	10
4	Ervaringen met de zorg	27
5	Eigen regie en zelfmanagement	45

1 Leeswijzer

Dit is het tabellenboek bij het rapport 'Zorgmonitor 2019 - Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte: 2005-2018'. Het tabellenboek bevat de meest recente cijfers over de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte. De tabellen zijn ingedeeld volgens de hoofdstukken van het onderzoeksrapport. Voor de juiste interpretatie van de gegevens raden we aan om het tabellenboek alleen te gebruiken in combinatie met het volledige rapport. Hierin staan ook de onderzoeksvragen en de methodologische verantwoording van het onderzoek. Het rapport kunt u hier downloaden: [Zorgmonitor 2019](#)

Bij alle resultaten geven we de puntschatting met het 95%-betrouwbaarheidsinterval of de gemiddelde met het 95%-betrouwbaarheidsinterval of standaarddeviatie. Significante verschillen tussen subgroepen zijn **vet** gedrukt: vet gedrukte resultaten wijken significant (getoetst met een alpha van kleiner dan 0,01) af van de referentiegroep (de eerst genoemde subgroep).

2 Leven met een chronische ziekte

Tabel B2.1 Kwaliteit van leven van mensen met een chronische ziekte, gemeten met de EQ-5D, 2018
(score -0,44-1)

	score (95%-BI)
Totale groep	0,78 (0,77-0,79)
Geslacht	
Man (ref)	0,78 (0,77-0,80)
Vrouw	0,77 (0,76-0,77)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	0,77 (0,72-0,81)
40-64 jaar	0,77 (0,75-0,79)
65-74 jaar	0,79 (0,77-0,80)
75 jaar en ouder	0,79 (0,77-0,80)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	0,77 (0,75-0,79)
Midden	0,77 (0,76-0,79)*
Hoog (HBO en WO)	0,80 (0,78-0,82)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	0,79 (0,77-0,81)
Astma/COPD	0,80 (0,77-0,82)
Aandoening bewegingsapparaat	0,78 (0,76-0,81)
Kanker	0,78 (0,74-0,82)
Diabetes	0,76 (0,74-0,79)
Neurologische aandoening	0,75 (0,71-0,79)
Spijverteringsaandoening	0,75 (0,71-0,79)
Overige chronische aandoeningen	0,78 (0,76-0,80)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	0,78 (0,77-0,80)
Twee	0,78 (0,77-0,80)
Drie of meer	0,76 (0,74-0,78)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	0,86 (0,85-0,87)
Matige of ernstige beperkingen	0,61 (0,59-0,63)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met een middelbaar opleidingsniveau en mensen met een hoog opleidingsniveau

Tabel B2.2 Percentage mensen met een chronische ziekte dat zich gelukkig voelt, 2017

Totale groep	74 (71-77)
Geslacht	
Man (ref)	77 (73-81)
Vrouw	72 (68-76)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	71 (57-82)
40-64 jaar	74 (69-78)
65-74 jaar	78 (74-82)
75 jaar en ouder	72 (67-77)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	73 (68-78)
Midden	73 (68-77)
Hoog (HBO en WO)	79 (74-83)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	77 (71-82)
Astma/COPD	74 (68-80)
Aandoening bewegingsapparaat	77 (70-84)
Kanker	76 (64-84)
Diabetes	70 (62-78)
Neurologische aandoening	66 (54-75)
Spijverteringsaandoening	74 (62-83)
Overige chronische aandoeningen	78 (71-83)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	77 (73-81)
Twee	73 (68-77)
Drie of meer	71 (65-76)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	80 (77-83)
Matige of ernstige beperkingen	60 (54-66)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B2.3 Percentage mensen met een chronische ziekte dat tevreden is met het leven, 2017

	% (95%-BI)
Totale groep	81 (78-84)
Geslacht	
Man (ref)	82 (77-85)
Vrouw	81 (77-84)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	79 (65-88)
40-64 jaar	78 (73-83)
65-74 jaar	83 (79-87)
75 jaar en ouder	84 (79-88)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	79 (74-84)
Midden	81 (77-85)
Hoog (HBO en WO)	83 (78-87)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	85 (80-89)
Astma/COPD	78 (71-84)
Aandoening bewegingsapparaat	79 (71-86)
Kanker	85 (73-92)
Diabetes	83 (75-88)
Neurologische aandoening	79 (68-87)
Spijverteringsaandoening	78 (65-87)
Overige chronische aandoeningen	80 (74-86)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	82 (77-86)
Twee	82 (77-86)
Drie of meer	78 (72-83)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	87 (84-89)
Matige of ernstige beperkingen	64 (57-69)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B2.4 Percentage mensen met een chronische ziekte dat zich eenzaam voelt, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	7 (5-9)
Geslacht	
Man (ref)	6 (4-10)
Vrouw	7 (5-10)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	2 (1-9)
40-64 jaar	9 (6-13)
65-74 jaar	7 (5-10)
75 jaar en ouder	9 (6-12)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6 (4-10)
Midden	7 (5-11)
Hoog (HBO en WO)	7 (4-11)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8 (5-13)
Astma/COPD	10 (6-15)
Aandoening bewegingsapparaat	4 (2-8)
Kanker	5 (2-13)
Diabetes	6 (3-12)
Neurologische aandoening	8 (4-17)
Spijverteringsaandoening	8 (4-18)
Overige chronische aandoeningen	5 (3-9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	8 (5-11)
Twee	6 (4-10)
Drie of meer	6 (4-10)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	5 (3-7)
Matige of ernstige beperkingen	13 (9-18)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B2.5 Percentage mensen met een chronische ziekte met een klinisch relevante depressie (Hospital Anxiety and Depression Scale ≥ 11), 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	5 (4-7)
Geslacht	
Man (ref)	7 (4-11)
Vrouw	4 (2-7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6 (2-21)
40-64 jaar	6 (3-10)
65-74 jaar	4 (2-7)
75 jaar en ouder	5 (3-8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7 (4-11)
Midden	5 (3-8)
Hoog (HBO en WO)	4 (3-8)
Chronische aandoening	
Hart- en vaatziekten (ref)	6 (4-12)
Astma/COPD	4 (2-8)
Aandoening bewegingsapparaat	6 (3-13)
Kanker	6 (2-19)
Diabetes	5 (2-11)
Neurologische aandoening	2 (0-10)
Spijsverteringsaandoening	16 (8-30)
Overige chronische aandoeningen	5 (3-10)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	5 (3-8)
Twee	6 (3-8)
Drie of meer	6 (3-10)
Aanwezigheid beperkingen	
Geen of lichte beperkingen (ref)	3 (2-5)
Matige of ernstige beperkingen	13 (8-19)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

3 Gebruik van zorg en ondersteuning

Tabel B3.1 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een huisarts, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	89 (86-92)
Geslacht	
Man (ref)	87 (82-90)
Vrouw	91 (87-94)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	91 (78-96)
40-64 jaar	86 (81-90)
65-74 jaar	90 (86-93)
75 jaar en ouder	91 (87-95)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	90 (85-94)
Midden	89 (85-92)
Hoog (HBO en WO)	88 (82-92)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	91 (85-94)
Astma/COPD	90 (84-98)
Aandoening bewegingsapparaat	88 (78-93)
Kanker	81 (67-90)
Diabetes	91 (83-95)
Neurologische aandoening	86 (75-93)
Spijverteringsaandoening	89 (78-95)
Overige chronische aandoeningen	88 (82-93)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	86 (81-90)
Twee	91 (86-94)
Drie of meer	92 (87-95)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	87 (83-90)
Matige of ernstige beperkingen	93 (89-96)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.2 Gemiddeld aantal contacten van mensen die in 2018 de huisarts bezochten, 2018

	Gemiddeld aantal contacten (95%-BI)
Totale groep	4,0 (3,6-4,4)
Geslacht	
Man (ref)	3,5 (3,0-4,1)
Vrouw	4,3 (3,8-4,8)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	3,9 (2,4-5,5)
40-64 jaar	3,8 (3,2-4,4)
65-74 jaar	4,1 (3,5-4,7)
75 jaar en ouder	4,2 (3,6-4,9)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	4,5 (3,8-5,1)
Midden	3,8 (3,3-4,4)
Hoog (HBO en WO)	3,6 (2,1-4,3)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	3,9 (3,2-4,6)
Astma/COPD	3,4 (2,6-4,2)
Aandoening bewegingsapparaat	3,5 (2,6-4,6)
Kanker	3,6 (2,3-4,9)
Diabetes	4,0 (3,1-5,0)
Neurologische aandoening	4,1 (3,0-5,3)
Spijverteringsaandoening	4,9 (3,6-6,2)
Overige chronische aandoeningen	4,7 (3,9-5,5)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	3,9 (3,3-4,4)
Twee	3,9 (3,3-4,4)
Drie of meer	4,3 (3,7-5,0)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	3,4 (3,0-3,9)
Matige of ernstige beperkingen	5,1 (4,4-5,7)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.3 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een praktijkondersteuner van de huisarts, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	58 (52-63)
Geslacht	
Man (ref)	57 (50-64)
Vrouw	58 (52-64)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	40 (24-59)
40-64 jaar	56 (49-63)
65-74 jaar	64 (57-70)
75 jaar en ouder	64 (57-71)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	62 (54-69)
Midden	57 (50-64)
Hoog (HBO en WO)	52 (44-60)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	56 (48-64)
Astma/COPD	62 (52-71)
Aandoening bewegingsapparaat	43 (32-54)
Kanker	38 (25-52)
Diabetes	79 (69-87)
Neurologische aandoening	42 (29-56)
Spijverteringsaandoening	49 (35-63)
Overige chronische aandoeningen	47 (38-56)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	48 (41-56)
Twee	61 (54-68)
Drie of meer	69 (61-76)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	56 (50-62)
Matige of ernstige beperkingen	61 (53-68)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.4 Gemiddeld aantal contacten van mensen die in 2018 de praktijkondersteuner van de huisarts bezochten, 2018

	Gemiddeld aantal contacten (95%-BI)
Totale groep	3,1 (2,6-3,6)
Geslacht	
Man (ref)	3,0 (2,4-3,6)
Vrouw	3,2 (2,7-3,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	4,8 (2,8-6,9)
40-64 jaar	2,6 (2,0-3,3)
65-74 jaar	2,8 (2,3-3,4)
75 jaar en ouder	3,0 (2,4-3,6)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	3,2 (2,6-3,8)
Midden	3,3 (2,7-3,8)
Hoog (HBO en WO)	2,7 (2,0-3,3)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	3,1 (2,4-3,7)
Astma/COPD	2,9 (2,1-3,6)
Aandoening bewegingsapparaat	2,7 (1,7-3,7)
Kanker	2,1 (0,6-3,6)
Diabetes	3,4 (2,6-4,3)
Neurologische aandoening	3,8 (2,4-5,3)
Spijverteringsaandoening	2,9 (1,4-4,3)
Overige chronische aandoeningen	3,3 (2,4-4,2)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	3,0 (2,4-3,7)
Twee	3,1 (2,4-3,7)
Drie of meer	3,5 (2,9-4,2)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	2,9 (2,4-3,4)
Matige of ernstige beperkingen	3,5 (2,9-4,2)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.5 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een huisartsenpost, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	17 (14-21)
Geslacht	
Man (ref)	14 (11-19)
Vrouw	20 (16-25)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	18 (8-34)
40-64 jaar	14 (10-19)*
65-74 jaar	18 (13-23)
75 jaar en ouder	24 (19-30)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	23 (17-29)
Midden	16 (12-20)
Hoog (HBO en WO)	14 (10-20)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	17 (12-23)
Astma/COPD	15 (9-23)
Aandoening bewegingsapparaat	20 (13-29)
Kanker	10 (4-21)
Diabetes	17 (10-27)
Neurologische aandoening	22 (13-35)
Spijverteringsaandoening	21 (12-35)
Overige chronische aandoeningen	20 (14-28)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	19 (14-24)
Twee	15 (11-21)
Drie of meer	18 (13-24)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	16 (12-19)
Matige of ernstige beperkingen	22 (16-28)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen uit de leeftijdscategorie 40-64 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder

Tabel B3.6 Gemiddeld aantal contacten van mensen die in 2018 de huisartsenpost bezochten, 2018

	Gemiddeld aantal contacten (95%-BI)
Totale groep	2,1 (1,3-2,8)
Geslacht	
Man (ref)	2,2 (1,2-3,3)
Vrouw	1,9 (1,1-2,8)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	*
40-64 jaar	1,9 (0,7-3,0)
65-74 jaar	1,8 (0,7-2,8)
75 jaar en ouder	2,9 (1,9-3,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	2,4 (1,3-3,4)
Midden	1,8 (0,7-2,8)
Hoog (HBO en WO)	2,1 (0,9-3,4)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	2,6 (1,4-3,8)
Astma/COPD	*
Aandoening bewegingsapparaat	2,4 (0,9-3,9)
Kanker	*
Diabetes	1,2 (0,0-3,0)
Neurologische aandoening	*
Spijverteringsaandoening	*
Overige chronische aandoeningen	*
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	2,3 (1,2-3,3)
Twee	1,7 (0,6-2,9)
Drie of meer	2,0 (0,9-3,1)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	1,9 (1,0-2,7)
Matige of ernstige beperkingen	2,4 (1,3-3,5)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

Tabel B3.7 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een paramedicus, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	67 (63-71)
Geslacht	
Man (ref)	58 (52-64)
Vrouw	73 (68-78)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	49 (33-66)
40-64 jaar	70 (64-76)
65-74 jaar	72 (66-77)
75 jaar en ouder	67 (61-73)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	55 (48-62)
Midden	72 (67-77)
Hoog (HBO en WO)	73 (67-79)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	60 (52-67)
Astma/COPD	68 (59-76)
Aandoening bewegingsapparaat	67 (57-76)
Kanker	55 (40-69)
Diabetes	74 (64-82)
Neurologische aandoening	72 (59-82)
Spijverteringsaandoening	58 (43-71)
Overige chronische aandoeningen	67 (58-74)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	67 (61-73)
Twee	68 (62-74)
Drie of meer	65 (58-72)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	65 (60-70)
Matige of ernstige beperkingen	71 (64-77)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.8 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een fysiotherapeut, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	37 (33-42)
Geslacht	
Man (ref)	33 (28-39)
Vrouw	41 (35-46)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	28 (17-44)
40-64 jaar	38 (32-44)
65-74 jaar	42 (36-48)
75 jaar en ouder	36 (30-43)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	32 (26-39)
Midden	39 (34-45)
Hoog (HBO en WO)	41 (34-48)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	28 (22-35)
Astma/COPD	38 (30-47)
Aandoening bewegingsapparaat	45 (35-55)
Kanker	31 (19-45)
Diabetes	33 (24-43)
Neurologische aandoening	51 (38-63)
Spijverteringsaandoening	43 (30-57)
Overige chronische aandoeningen	39 (31-47)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	35 (29-41)
Twee	40 (34-47)
Drie of meer	39 (32-46)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	34 (29-38)
Matige of ernstige beperkingen	45 (38-52)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.9 Gemiddeld aantal contacten van mensen die in 2018 een fysiotherapeut bezochten, 2018

	Gemiddeld aantal contacten (95%-BI)
Totale groep	16,7 (13,4-20,0)
Geslacht	
Man (ref)	19,8 (15,3-24,3)
Vrouw	14,3 (10,5-18,1)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	*
40-64 jaar	18,2 (13,7-22,7)
65-74 jaar	19,7 (15,4-23,9)
75 jaar en ouder	16,4 (11,5-21,3)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	13,8 (8,3-19,2)
Midden	18,5 (14,3-22,6)
Hoog (HBO en WO)	17,3 (12,4-22,1)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	11,4 (5,6-17,2)
Astma/COPD	14,6 (8,1-21,2)
Aandoening bewegingsapparaat	19,5 (13,1-25,8)
Kanker	*
Diabetes	17,3 (9,3-25,2)
Neurologische aandoening	32,4 (24,6-40,3)**
Spijsverteringsaandoening	9,7 (0,4-19,1)
Overige chronische aandoeningen	16,2 (10,2-22,1)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	13,4 (8,8-18,0)
Twee	18,9 (14,1-23,7)
Drie of meer	19,8 (14,8-24,9)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	12,6 (8,8-16,4)
Matige of ernstige beperkingen	24,9 (20,2-29,5)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

** Er is een significant verschil (p<.01) tussen mensen met een neurologische aandoening en mensen met overige chronische aandoeningen

Tabel B3.10 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een medisch specialist, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	75 (70-79)
Geslacht	
Man (ref)	76 (70-81)
Vrouw	74 (69-79)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	61 (44-76)
40-64 jaar	73 (66-78)
65-74 jaar	80 (75-85)
75 jaar en ouder	79 (73-84)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	75 (68-81)
Midden	76 (71-81)
Hoog (HBO en WO)	72 (64-78)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	73 (66-80)
Astma/COPD	69 (60-77)
Aandoening bewegingsapparaat	75 (64-83)
Kanker	78 (64-88)
Diabetes	81 (71-88)
Neurologische aandoening	72 (59-83)
Spijverteringsaandoening	84 (73-92)
Overige chronische aandoeningen	71 (62-78)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	71 (64-76)
Twee	74 (68-80)
Drie of meer	82 (76-87)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	67 (62-72)
Matige of ernstige beperkingen	87 (81-91)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.11 Gemiddeld aantal contacten van mensen die in 2018 de medisch specialist bezochten, 2018

	Gemiddeld aantal contacten (95%-BI)
Totale groep	4,4 (3,9-4,9)
Geslacht	
Man (ref)	4,2 (3,5-4,9)
Vrouw	4,5 (3,9-5,2)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,0 (3,7-8,2)
40-64 jaar	4,1 (3,3-4,8)
65-74 jaar	4,1 (3,4-4,8)
75 jaar en ouder	4,2 (3,5-4,9)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	4,1 (3,3-4,9)
Midden	4,5 (3,8-5,2)
Hoog (HBO en WO)	4,6 (3,7-5,4)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	3,5 (2,6-4,4)
Astma/COPD	4,3 (3,2-5,3)
Aandoening bewegingsapparaat	5,0 (3,8-6,1)
Kanker	4,0 (2,3-5,6)
Diabetes	5,0 (3,8-6,2)
Neurologische aandoening	3,8 (2,3-5,2)
Spijverteringsaandoening	4,3 (2,8-5,8)
Overige chronische aandoeningen	4,6 (3,6-5,7)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	4,1 (3,4-4,9)
Twee	4,2 (3,4-5,0)
Drie of meer	5,1 (4,3-5,9)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	3,8 (3,3-4,4)
Matige of ernstige beperkingen	5,5 (4,7-6,3)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.12 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een gespecialiseerd verpleegkundige, 2016

	% (95%-BI)
Totale groep	45 (41-49)
Geslacht	
Man (ref)	46 (41-52)
Vrouw	44 (39-49)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	42 (27-58)
40-64 jaar	47 (41-52)
65-74 jaar	47 (41-52)
75 jaar en ouder	42 (35-49)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	49 (43-55)
Midden	45 (40-50)
Hoog (HBO en WO)	39 (33-46)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	37 (31-43)
Astma/COPD	44 (37-51)*
Aandoening bewegingsapparaat	30 (23-39)
Kanker	50 (38-63)**
Diabetes	78 (71-84)†
Neurologische aandoening	24 (16-36)
Spijverteringsaandoening	47 (35-60)††
Overige chronische aandoeningen	27 (20-34)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	37 (31-42)
Twee	48 (42-54)
Drie of meer	57 (50-63)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	40 (35-44)
Matige of ernstige beperkingen	56 (50-62)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met astma en mensen met overige chronische aandoeningen

** Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met kanker en mensen met overige chronische aandoeningen

† Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met diabetes en mensen met overige chronische aandoeningen

†† Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met een spijsverteringsaandoening en mensen met overige chronische aandoeningen

Tabel B3.13 Percentage mensen met een chronische ziekte dat in het ziekenhuis is opgenomen voor minstens één nacht, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	11 (8-14)
Geslacht	
Man (ref)	15 (11-20)
Vrouw	8 (6-12)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	8 (2-22)
40-64 jaar	9 (6-13)
65-74 jaar	14 (10-19)
75 jaar en ouder	15 (11-20)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	15 (11-21)
Midden	10 (7-14)
Hoog (HBO en WO)	8 (5-12)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	10 (7-15)
Astma/COPD	13 (8-20)
Aandoening bewegingsapparaat	15 (9-23)
Kanker	12 (6-24)
Diabetes	8 (4-14)
Neurologische aandoening	4 (1-12)
Spijverteringsaandoening	20 (11-34)
Overige chronische aandoeningen	14 (9-21)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	11 (7-15)
Twee	12 (8-16)
Drie of meer	11 (8-16)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	9 (7-13)
Matige of ernstige beperkingen	15 (10-21)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.14 Percentage mensen met een chronische ziekte dat in de 14 dagen voorafgaand aan de meting medicijnen gebruikte met of zonder recept, 2018

	Medicatie met recept	Medicatie zonder recept
	% (95%-BI)	% (95%-BI)
Totale groep	94 (91-96)	31 (27-35)
Geslacht		
Man (ref)	94 (91-96)	22 (17-27)
Vrouw	93 (90-95)	39 (34-45)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	94 (84-98)	40 (26-57)
40-64 jaar	90 (85-94)	34 (28-40)*
65-74 jaar	96 (93-98)	29 (24-35)
75 jaar en ouder	94 (90-97)	24 (19-30)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	93 (88-96)	28 (22-34)
Midden	94 (90-96)	30 (25-36)
Hoog (HBO en WO)	95 (91-97)	39 (32-46)
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	95 (91-97)	24 (19-31)
Astma/COPD	93 (88-96)	29 (21-37)
Aandoening bewegingsapparaat	86 (76-92)	34 (25-44)
Kanker	71 (55-83)**	33 (21-48)
Diabetes	98 (92-99)	31 (22-42)
Neurologische aandoening	93 (84-97)	29 (19-41)
Spijsverteringsaandoening	89 (78-95)	31 (20-45)
Overige chronische aandoeningen	92 (87-95)	39 (31-48)
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	91 (86-94)	30 (24-36)
Twee	93 (89-96)	30 (24-36)
Drie of meer	97 (94-98)	36 (29-43)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	93 (90-95)	27 (23-31)
Matige of ernstige beperkingen	95 (91-97)	41 (34-48)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen uit de leeftijdscategorie 40-64 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder

** Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met kanker en mensen met overige chronische aandoeningen

Tabel B3.15 Percentage mensen met een chronische ziekte dat contact had met een bedrijfsarts, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	18 (10-30)
Geslacht	
Man (ref)	18 (10-31)
Vrouw	18 (9-32)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	7 (2-26)
40-64 jaar	22 (14-33)
65-74 jaar	*
75 jaar en ouder	*
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	30 (14-52)
Midden	15 (8-28)
Hoog (HBO en WO)	11 (5-22)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8 (3-20)
Astma/COPD	20 (9-39)
Aandoening bewegingsapparaat	*
Kanker	*
Diabetes	*
Neurologische aandoening	32 (14-57)
Spijverteringsaandoening	31 (13-58)
Overige chronische aandoeningen	14 (6-28)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	12 (6-23)
Twee	23 (11-41)
Drie of meer	27 (14-47)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	25 (15-37)
Matige of ernstige beperkingen	9 (3-26)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

Tabel B3.16 Percentage mensen met een chronische ziekte dat informele zorg ontving, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	31 (27-36)
Geslacht	
Man (ref)	22 (17-27)
Vrouw	39 (34-45)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	36 (21-55)
40-64 jaar	32 (26-39)
65-74 jaar	29 (23-35)
75 jaar en ouder	29 (23-36)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	26 (20-33)
Midden	35 (29-41)
Hoog (HBO en WO)	32 (25-40)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	32 (25-40)
Astma/COPD	28 (20-37)
Aandoening bewegingsapparaat	29 (21-40)
Kanker	37 (23-53)
Diabetes	39 (28-51)
Neurologische aandoening	26 (16-40)
Spijverteringsaandoening	33 (20-48)
Overige chronische aandoeningen	27 (19-35)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	30 (25-37)
Twee	30 (24-37)
Drie of meer	34 (27-41)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	20 (16-24)
Matige of ernstige beperkingen	61 (53-68)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B3.17 Percentage mensen met een chronische ziekte dat behoefte had aan meer zorg dan ze kregen van professionele zorgverleners of mensen uit hun omgeving, 2018

	% (95%-BI)
Totale groep	15 (12-18)
Geslacht	
Man (ref)	10 (7-14)
Vrouw	19 (15-24)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	17 (7-36)
40-64 jaar	14 (10-19)
65-74 jaar	11 (7-15)
75 jaar en ouder	20 (16-26)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	15 (10-20)
Midden	18 (13-24)
Hoog (HBO en WO)	10 (7-15)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	14 (10-20)
Astma/COPD	17 (10-27)
Aandoening bewegingsapparaat	22 (13-34)
Kanker	8 (3-19)
Diabetes	12 (7-21)
Neurologische aandoening	8 (4-16)
Spijverteringsaandoening	14 (6-31)
Overige chronische aandoeningen	17 (11-26)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	14 (9-20)
Twee	11 (8-17)
Drie of meer	22 (17-28)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	8 (6-11)
Matige of ernstige beperkingen	29 (23-37)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

4 Ervaringen met de zorg

Tabel B4.1 Mate waarin mensen met een chronische ziekte vinden dat er voldoende aandacht is voor hen zelf als persoon en dat er voldoende besproken wordt wat voor hen belangrijk is, 2017 (gemiddelde, range 0-3, P3CEQ*)

	Aandacht voor mij als persoon M (SD)	Besproken wat belangrijk voor mij is M (SD)
Totale groep	1,7 (1,0)	1,3 (1,0)
Geslacht		
Man (ref)	1,7 (1,0)	1,2 (1,0)
Vrouw	1,7 (0,9)	1,3 (0,9)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	1,6 (0,9)	1,3 (1,0)
40-64 jaar	1,8 (0,9)	1,3 (1,0)
65-74 jaar	1,7 (1,0)	1,2 (0,9)
75 jaar en ouder	1,6 (1,0)	1,2 (0,9)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	1,7 (1,0)	1,2 (0,9)
Midden	1,7 (0,9)	1,3 (0,9)
Hoog (HBO en WO)	1,8 (0,9)	1,4 (1,0)
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	1,6 (1,0)	1,1 (0,9)
Astma/COPD	1,7 (1,0)	1,3 (1,0)
Aandoening bewegingsapparaat	1,7 (0,9)	1,3 (0,9)
Kanker	1,8 (1,0)	1,1 (1,0)
Diabetes	1,7 (0,9)	1,4 (0,9)
Neurologische aandoening	1,8 (1,0)	1,4 (1,0)
Spijverteringsaandoening	1,4 (0,7)	1,5 (1,0)
Overige chronische aandoeningen	1,8 (1,0)	1,2 (1,0)
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	1,6 (0,9)	1,2 (1,0)
Twee	1,8 (0,9)	1,3 (1,0)
Drie of meer	1,7 (1,0)	1,3 (0,9)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	1,7 (1,0)	1,2 (1,0)
Matige of ernstige beperkingen	1,7 (0,9)	1,4 (0,9)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Verschillen zijn getoetst met gemiddelden. Voor de duiding is in de Zorgmonitor de verdeling tussen de antwoordpercentages 'nooit', 'soms', 'vaak' en 'altijd' beschreven

Tabel B4.2 Mate waarin mensen met een chronische ziekte zich betrokken voelen bij beslissingen en waarin zij een vast aanspreekpunt hebben, 2017 (gemiddelde, range 0-3, P3CEQ*)

	Betrokken bij beslissingen	Aanspreekpunt beschikbaar
	M (SD)	M (SD)
Totale groep	2,1 (0,9)	1,7 (1,0)
Geslacht		
Man (ref)	2,0 (1,0)	1,8 (1,1)
Vrouw	2,1 (0,9)	1,6 (0,9)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	2,2 (0,9)	1,4 (0,8)
40-64 jaar	2,1 (0,9)	1,6 (1,0)
65-74 jaar	2,0 (1,0)	1,7 (1,0)
75 jaar en ouder	1,9 (1,0)	2,0 (1,2)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	1,9 (1,0)	1,8 (1,1)
Midden	2,1 (0,9)	1,6 (1,0)
Hoog (HBO en WO)	2,2 (0,9)	1,5 (0,9)
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	1,9 (1,0)	1,6 (1,0)
Astma/COPD	2,1 (0,9)	1,7 (1,1)
Aandoening bewegingsapparaat	2,1 (0,8)	1,6 (1,0)
Kanker	2,2 (1,0)	1,6 (1,0)
Diabetes	2,1 (0,9)	2,0 (1,1)
Neurologische aandoening	2,2 (0,9)	1,5 (1,0)
Spijverteringsaandoening	2,2 (0,9)	1,8 (1,0)
Overige chronische aandoeningen	2,0 (1,0)	1,5 (0,9)
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	2,1 (0,9)	1,6 (1,0)
Twee	2,0 (1,0)	1,7 (1,0)
Drie of meer	2,0 (0,9)	1,7 (1,1)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	2,1 (1,0)	1,6 (1,0)
Matige of ernstige beperkingen	2,0 (0,9)	1,7 (1,0)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Verschillen zijn getoetst met gemiddelden. Voor de duiding is in de Zorgmonitor de verdeling tussen de antwoordpercentages 'nooit', 'soms', 'vaak' en 'altijd' beschreven

Tabel B4.3 Mate waarin mensen met een chronische ziekte vinden dat zorgverleners overleggen over hun zorg (gemiddelde, range 0-3) en het percentage mensen met een chronische ziekte dat zegt een individueel zorgplan te hebben, 2017, P3CEQ*

	Afstemming tussen zorgverleners M (SD)	Individueel zorgplan % (95%-BI)
Totale groep	1,1 (0,9)	6 (4-8)
Geslacht		
Man (ref)	1,2 (0,9)	6 (4-10)
Vrouw	1,1 (0,9)	5 (3-8)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	1,0 (0,7)	†
40-64 jaar	1,1 (0,9)	†
65-74 jaar	1,2 (0,9)	†
75 jaar en ouder	1,3 (1,0)	8 (5-12)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	1,3 (1,0)	†
Midden	1,1 (0,9)**	5 (4-8)
Hoog (HBO en WO)	0,9 (0,8)	†
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	1,1 (0,9)	6 (4-10)
Astma/COPD	1,1 (0,9)	†
Aandoening bewegingsapparaat	1,1 (0,9)	†
Kanker	1,2 (1,0)	†
Diabetes	1,3 (0,9)	†
Neurologische aandoening	1,0 (0,8)	†
Spijverteringsaandoening	1,1 (0,7)	†
Overige chronische aandoeningen	1,1 (0,9)	†
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	1,1 (0,8)	†
Twee	1,1 (1,0)	†
Drie of meer	1,2 (0,9)	6 (4-10)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	1,1 (0,9)	4 (3-7)
Matige of ernstige beperkingen	1,1 (0,9)	8 (6-12)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Verschillen zijn getoetst met gemiddelden. Voor de duiding is in de Zorgmonitor de verdeling tussen de antwoordpercentages 'nooit', 'soms', 'vaak' en 'altijd' beschreven

** Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met een middelbaar opleidingsniveau en mensen met een hoog opleidingsniveau

† Er zitten te weinig mensen in deze categorie ($n < 20$) om resultaten weer te geven

Tabel B4.4 Aantal zorgverleners waarmee mensen met een chronische ziekte contact hebben
(gemiddelde, range 0-16)

	M (95%-BI)
Totale groep	4,5 (4,4-4,7)
Geslacht	
Man (ref)	4,6 (4,4-4,8)
Vrouw	4,5 (4,3-4,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	3,4 (2,8-4,0)
40-64 jaar	4,5 (4,3-4,8)
65-74 jaar	4,8 (4,6-5,0)
75 jaar en ouder	5,0 (4,7-5,3)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	4,9 (4,6-5,2)
Midden	4,5 (4,3-4,7)
Hoog (HBO en WO)	4,1 (3,8-4,4)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	4,7 (4,5-5,0)
Astma/COPD	4,4 (4,0-4,8)
Aandoening bewegingsapparaat	4,7 (4,3-5,2)
Kanker	4,4 (3,8-4,9)
Diabetes	5,5 (5,1-6,0)
Neurologische aandoening	4,0 (3,5-4,5)
Spijverteringsaandoening	3,6 (3,0-4,2)
Overige chronische aandoeningen	4,1 (3,7-4,5)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	3,8 (3,6-4,1)
Twee	4,6 (4,4-4,9)*
Drie of meer	5,7 (5,4-6,0)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,0 (3,8-4,2)
Matige of ernstige beperkingen	5,7 (5,4-5,9)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met twee chronische ziektes en mensen met drie of meer chronische ziektes

Tabel B4.5 Rapportcijfer dat mensen met een chronische ziekte geven aan de totale zorg die zij ontvangen, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,8 (7,7-7,9)
Geslacht	
Man (ref)	7,8 (7,7-7,9)
Vrouw	7,8 (7,7-7,9)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	7,5 (7,2-7,8)
40-64 jaar	7,7 (7,6-7,9)
65-74 jaar	7,9 (7,8-8,0)
75 jaar en ouder	7,9 (7,8-8,1)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,7 (7,6-7,8)
Midden	7,8 (7,7-7,9)
Hoog (HBO en WO)	7,8 (7,7-8,0)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,8 (7,6-7,9)
Astma/COPD	7,8 (7,6-8,0)
Aandoening bewegingsapparaat	7,9 (7,7-8,1)
Kanker	7,7 (7,4-8,0)
Diabetes	7,8 (7,6-8,0)
Neurologische aandoening	7,8 (7,5-8,0)
Spijverteringsaandoening	7,6 (7,3-7,8)
Overige chronische aandoeningen	7,8 (7,7-8,0)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,8 (7,7-7,9)
Twee	7,8 (7,7-7,9)
Drie of meer	7,8 (7,6-7,9)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,9 (7,8-8,0)
Matige of ernstige beperkingen	7,6 (7,4-7,7)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.6 Vertrouwen dat mensen met een chronische ziekte hebben in de huidige gezondheidszorg, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 1-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,4 (7,3-7,5)
Geslacht	
Man (ref)	7,5 (7,3-7,6)
Vrouw	7,3 (7,2-7,4)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	7,2 (6,8-7,5)
40-64 jaar	7,4 (7,2-7,5)
65-74 jaar	7,4 (7,3-7,6)
75 jaar en ouder	7,5 (7,4-7,7)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,3 (7,1-7,4)
Midden	7,4 (7,3-7,5)
Hoog (HBO en WO)	7,4 (7,3-7,6)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,4 (7,3-7,6)
Astma/COPD	7,4 (7,2-7,6)
Aandoening bewegingsapparaat	7,4 (7,2-7,6)
Kanker	7,1 (6,8-7,5)
Diabetes	7,4 (7,2-7,6)
Neurologische aandoening	7,3 (7,6-7,3)
Spijverteringsaandoening	7,2 (6,9-7,5)
Overige chronische aandoeningen	7,4 (7,3-7,6)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,4 (7,2-7,5)
Twee	7,4 (7,2-7,5)
Drie of meer	7,4 (7,3-7,6)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,5 (7,4-7,6)
Matige of ernstige beperkingen	7,2 (7,0-7,3)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.7 Vertrouwen dat mensen met een chronische ziekte hebben in de huidige medische mogelijkheden, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 1-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,5 (7,4-7,6)
Geslacht	
Man (ref)	7,6 (7,5-7,8)
Vrouw	7,4 (7,3-7,5)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	7,4 (7,1-7,8)
40-64 jaar	7,5 (7,4-7,6)
65-74 jaar	7,5 (7,3-7,6)
75 jaar en ouder	7,7 (7,6-7,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,4 (7,2-7,5)
Midden	7,6 (7,5-7,7)
Hoog (HBO en WO)	7,6 (7,5-7,8)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,5 (7,4-7,7)
Astma/COPD	7,6 (7,4-7,7)
Aandoening bewegingsapparaat	7,7 (7,5-7,9)
Kanker	7,4 (7,1-7,7)
Diabetes	7,5 (7,3-7,7)
Neurologische aandoening	7,5 (7,2-7,8)
Spijverteringsaandoening	7,5 (7,1-7,6)
Overige chronische aandoeningen	7,5 (7,4-7,7)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,5 (7,3-7,6)
Twee	7,5 (7,4-7,6)
Drie of meer	7,6 (7,5-7,8)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,6 (7,5-7,7)
Matige of ernstige beperkingen	7,3 (7,1-7,4)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.8 Vertrouwen dat mensen met een chronische ziekte hebben in de toekomst van de gezondheidszorg, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 1-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	6,6 (6,5-6,7)
Geslacht	
Man (ref)	6,7 (6,6-6,9)
Vrouw	6,5 (6,4-6,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,7 (6,3-7,1)
40-64 jaar	6,5 (6,3-6,7)*
65-74 jaar	6,6 (6,4-6,7)*
75 jaar en ouder	6,9 (6,7-7,0)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6,5 (6,3-6,7)
Midden	6,6 (6,5-6,8)
Hoog (HBO en WO)	6,8 (6,6-7,0)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	6,7 (6,5-6,9)
Astma/COPD	6,6 (6,4-6,8)
Aandoening bewegingsapparaat	6,6 (6,4-6,9)
Kanker	6,5 (6,1-6,9)
Diabetes	6,6 (6,4-6,9)
Neurologische aandoening	6,4 (6,1-6,8)
Spijverteringsaandoening	6,6 (6,2-6,9)
Overige chronische aandoeningen	6,7 (6,5-6,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	6,6 (6,5-6,8)
Twee	6,6 (6,5-6,8)
Drie of meer	6,6 (6,4-6,8)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	6,7 (6,6-6,9)
Matige of ernstige beperkingen	6,4 (6,2-6,6)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen uit de leeftijdscategorie 40-64 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 75 en ouder, en tussen mensen uit de leeftijdscategorie 65-74 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 75 en ouder

Tabel B4.9 Beoordeling van de huisarts door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,7 (7,6-7,8)
Geslacht	
Man (ref)	7,7 (7,5-7,8)
Vrouw	7,7 (7,6-7,9)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	7,3 (6,9-7,7)
40-64 jaar	7,7 (7,5-7,8)
65-74 jaar	8,0 (7,8-8,2)
75 jaar en ouder	7,8 (7,6-7,9)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,7 (7,5-7,9)
Midden	7,7 (7,6-7,9)
Hoog (HBO en WO)	7,7 (7,5-7,9)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,7 (7,5-7,9)
Astma/COPD	7,8 (7,6-8,1)
Aandoening bewegingsapparaat	7,7 (7,5-8,0)
Kanker	7,2 (6,9-7,6)
Diabetes	7,6 (7,4-7,9)
Neurologische aandoening	7,9 (7,5-8,2)
Spijverteringsaandoening	7,6 (7,3-8,0)
Overige chronische aandoeningen	7,7 (7,5-7,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,7 (7,5-7,8)
Twee	7,7 (7,5-7,9)
Drie of meer	7,8 (7,6-8,0)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,8 (7,6-7,9)
Matige of ernstige beperkingen	7,6 (7,4-7,8)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.10 Beoordeling van de medisch specialist door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,8 (7,6-7,9)
Geslacht	
Man (ref)	7,8 (7,6-8,0)
Vrouw	7,7 (7,5-7,9)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	7,4 (6,9-7,9)
40-64 jaar	7,6 (7,4-7,8)
65-74 jaar	8,1 (7,9-8,3)
75 jaar en ouder	7,8 (7,6-8,0)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,6 (7,4-7,8)
Midden	7,8 (7,6-8,0)
Hoog (HBO en WO)	7,9 (7,7-8,1)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,7 (7,4-7,9)
Astma/COPD	7,8 (7,5-8,1)
Aandoening bewegingsapparaat	7,7 (7,4-8,0)
Kanker	7,9 (7,5-8,3)
Diabetes	7,7 (7,4-8,0)
Neurologische aandoening	8,0 (7,6-8,5)
Spijverteringsaandoening	7,7 (7,3-8,1)
Overige chronische aandoeningen	7,7 (7,4-7,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,9 (7,7-8,1)
Twee	7,6 (7,4-7,8)
Drie of meer	7,7 (7,5-7,9)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,8 (7,6-7,9)
Matige of ernstige beperkingen	7,8 (7,5-8,0)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.11 Beoordeling van de praktijkondersteuner door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,7 (7,5-7,9)
Geslacht	
Man (ref)	7,6 (7,4-7,9)
Vrouw	7,7 (7,5-7,9)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	*
40-64 jaar	7,7 (7,5-7,9)
65-74 jaar	7,9 (7,7-8,1)
75 jaar en ouder	7,8 (7,6-8,0)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,7 (7,4-7,9)
Midden	7,7 (7,4-7,9)
Hoog (HBO en WO)	7,8 (7,5-8,0)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,6 (7,4-7,9)
Astma/COPD	7,7 (7,5-8,0)
Aandoening bewegingsapparaat	7,6 (7,3-8,0)
Kanker	7,6 (7,1-8,2)
Diabetes	7,8 (7,5-8,1)
Neurologische aandoening	*
Spijverteringsaandoening	7,6 (7,1-8,1)
Overige chronische aandoeningen	7,6 (7,3-7,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,7 (7,5-7,9)
Twee	7,6 (7,4-7,8)
Drie of meer	7,8 (7,5-8,0)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,8 (7,6-8,0)
Matige of ernstige beperkingen	7,5 (7,3-7,7)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

Tabel B4.12 Beoordeling van de wijkverpleegkundige door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,4 (6,6-8,3)
Geslacht	
Man (ref)	*
Vrouw	7,3 (6,4-8,3)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	*
40-64 jaar	*
65-74 jaar	*
75 jaar en ouder	7,4 (6,1-8,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	*
Midden	7,3 (6,3-8,4)
Hoog (HBO en WO)	*
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	*
Astma/COPD	*
Aandoening bewegingsapparaat	*
Kanker	*
Diabetes	*
Neurologische aandoening	*
Spijverteringsaandoening	*
Overige chronische aandoeningen	*
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	*
Twee	*
Drie of meer	8,1 (7,0-9,2)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	*
Matige of ernstige beperkingen	7,7 (6,7-8,8)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

Tabel B4.13 Beoordeling van de gespecialiseerd verpleegkundige door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	8,0 (7,7-8,2)
Geslacht	
Man (ref)	8,0 (7,7-8,3)
Vrouw	8,0 (7,7-8,2)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	*
40-64 jaar	7,8 (7,4-8,1)
65-74 jaar	8,3 (8,0-8,6)**
75 jaar en ouder	7,7 (7,4-8,1)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	8,1 (7,8-8,5)
Midden	7,8 (7,5-8,1)
Hoog (HBO en WO)	8,0 (7,7-8,4)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8,0 (7,6-8,4)
Astma/COPD	8,1 (7,7-8,6)
Aandoening bewegingsapparaat	7,9 (7,3-8,4)
Kanker	*
Diabetes	7,9 (7,4-8,4)
Neurologische aandoening	*
Spijverteringsaandoening	*
Overige chronische aandoeningen	7,7 (7,3-8,2)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	8,0 (7,7-8,3)
Twee	7,8 (7,4-8,1)
Drie of meer	8,2 (7,8-8,5)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,9 (7,7-8,2)
Matige of ernstige beperkingen	8,0 (7,7-8,4)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

** Er is een significant verschil (p<.01) tussen mensen uit de leeftijdscategorie 65-74 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder

Tabel B4.14 Beoordeling van de fysiotherapeut door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	8,1 (7,9-8,2)
Geslacht	
Man (ref)	8,0 (7,8-8,2)
Vrouw	8,1 (7,9-8,3)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	8,0 (7,5-8,6)
40-64 jaar	8,2 (8,0-8,4)
65-74 jaar	8,0 (7,7-8,2)
75 jaar en ouder	8,0 (7,8-8,2)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,9 (7,7-8,2)
Midden	8,1 (7,9-8,3)
Hoog (HBO en WO)	8,2 (8,0-8,5)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8,0 (7,7-8,2)
Astma/COPD	8,2 (7,9-8,5)
Aandoening bewegingsapparaat	8,1 (7,8-8,5)
Kanker	*
Diabetes	7,8 (7,5-8,2)
Neurologische aandoening	8,7 (8,3-9,0)
Spijverteringsaandoening	*
Overige chronische aandoeningen	8,0 (7,7-8,2)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,9 (7,7-8,2)
Twee	8,0 (7,7-8,2)**
Drie of meer	8,4 (8,1-8,6)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	8,1 (7,9-8,3)
Matige of ernstige beperkingen	7,9 (7,7-8,2)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

* Er zitten te weinig mensen in deze categorie (n<20) om resultaten weer te geven

** Er is ook een significant verschil (p<.01) tussen mensen met twee chronische ziektes en mensen met drie of meer chronische ziektes

Tabel B4.15 Beoordeling van de apotheker door mensen met een chronische ziekte, uitgedrukt in een rapportcijfer, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (95%-BI)
Totale groep	7,3 (7,2-7,5)
Geslacht	
Man (ref)	7,4 (7,2-7,5)
Vrouw	7,3 (7,1-7,5)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,8 (6,4-7,2)
40-64 jaar	7,3 (7,1-7,5)
65-74 jaar	7,5 (7,3-7,7)
75 jaar en ouder	7,6 (7,4-7,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	7,3 (7,1-7,5)
Midden	7,4 (7,2-7,6)
Hoog (HBO en WO)	7,3 (7,1-7,5)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,3 (7,0-7,5)
Astma/COPD	7,3 (7,1-7,6)
Aandoening bewegingsapparaat	7,4 (7,1-7,7)
Kanker	6,9 (6,5-7,3)
Diabetes	7,3 (7,0-7,6)
Neurologische aandoening	7,4 (7,0-7,8)
Spijverteringsaandoening	7,4 (7,0-7,8)
Overige chronische aandoeningen	7,5 (7,3-7,7)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,3 (7,1-7,5)
Twee	7,4 (7,2-7,6)
Drie of meer	7,3 (7,1-7,5)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,4 (7,2-7,5)
Matige of ernstige beperkingen	7,2 (7,0-7,4)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.16 Mate waarin mensen met een chronische ziekte tevreden zijn over de kwaliteit van de bejegening en voorlichting van zorgverleners, 2018 (gemiddelde, range 1-5, PREM Chronische Zorg)

	Kwaliteit van bejegening	Kwaliteit van voorlichting
	M (SD)	M (SD)
Totale groep	4,4 (0,7)	4,3 (0,7)
Geslacht		
Man (ref)	4,4 (0,8)	4,3 (0,8)
Vrouw	4,4 (0,7)	4,4 (0,7)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	4,6 (0,7)	4,5 (0,8)
40-64 jaar	4,4 (0,8)	4,3 (0,7)
65-74 jaar	4,4 (0,7)	4,3 (0,7)
75 jaar en ouder	4,3 (0,7)	4,3 (0,7)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	4,3 (0,8)	4,2 (0,7)
Midden	4,5 (0,7)	4,4 (0,7)
Hoog (HBO en WO)	4,5 (0,7)	4,4 (0,8)
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	4,3 (0,8)	4,3 (0,8)
Astma/COPD	4,5 (0,6)	4,4 (0,7)
Aandoening bewegingsapparaat	4,4 (0,7)	4,4 (0,7)
Kanker	4,6 (0,6)	4,4 (0,8)
Diabetes	4,3 (0,8)	4,3 (0,7)
Neurologische aandoening	4,5 (0,9)	4,3 (0,9)
Spijverteringsaandoening	4,6 (0,6)	4,4 (0,6)
Overige chronische aandoeningen	4,4 (0,7)	4,3 (0,7)
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	4,5 (0,7)	4,4 (0,1)
Twee	4,4 (0,7)	4,3 (0,8)
Drie of meer	4,4 (0,8)	4,3 (0,8)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,5 (0,6)	4,4 (0,7)
Matige of ernstige beperkingen	4,2 (0,9)	4,2 (0,9)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.17 Mate waarin mensen met een chronische ziekte tevreden zijn over de kwaliteit van de deskundigheid van zorgverleners en over de kwaliteit van de gezamenlijke besluitvorming, 2018 (gemiddelde, range 1-5, PREM Chronische Zorg)

	Kwaliteit van deskundigheid M (SD)	Kwaliteit van gezamenlijke besluitvorming M (SD)
Totale groep	4,3 (0,8)	3,7 (1,1)
Geslacht		
Man (ref)	4,3 (0,7)	3,9 (1,0)
Vrouw	4,2 (0,8)	3,6 (1,2)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	4,1 (1,0)	3,3 (1,3)
40-64 jaar	4,3 (0,7)	3,7 (1,1)
65-74 jaar	4,3 (0,7)	3,9 (1,0)
75 jaar en ouder	4,3 (0,7)	3,8 (1,0)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	4,2 (0,8)	3,8 (0,9)
Midden	4,3 (0,7)	3,8 (1,1)
Hoog (HBO en WO)	4,3 (0,9)	3,5 (1,3)
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	4,3 (0,8)	3,7 (1,1)
Astma/COPD	4,3 (0,8)	3,9 (1,1)
Aandoening bewegingsapparaat	4,4 (0,6)	3,7 (1,1)
Kanker	4,3 (0,9)	3,4 (1,4)
Diabetes	4,3 (0,7)	4,0 (0,9)
Neurologische aandoening	4,0 (1,0)	3,5 (1,1)
Spijsverteringsaandoening	4,2 (0,6)	3,3 (1,3)
Overige chronische aandoeningen	4,2 (0,8)	3,7 (1,1)
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	4,3 (0,8)	3,8 (1,0)
Twee	4,2 (0,8)	3,6 (1,1)
Drie of meer	4,2 (0,8)	3,8 (1,1)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,3 (0,7)	3,8 (1,1)
Matige of ernstige beperkingen	4,1 (0,9)	3,6 (1,1)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B4.18 Mate waarin mensen met een chronische ziekte tevreden zijn over de kwaliteit van de afstemming van de behandeling tussen verschillende zorgverleners en over de kwaliteit van de organisatie van zorg, 2018 (gemiddelde, range 1-5, PREM Chronische Zorg)

	Kwaliteit van afstemming	Kwaliteit van organisatie zorg
	M (SD)	M (SD)
Totale groep	3,7 (1,0)	4,2 (0,9)
Geslacht		
Man (ref)	3,8 (1,0)	4,2 (0,9)
Vrouw	3,7 (1,0)	4,1 (0,9)
Leeftijd		
15-39 jaar (ref)	3,8 (1,2)	3,9 (1,2)
40-64 jaar	3,7 (1,0)	4,2 (0,9)
65-74 jaar	3,8 (0,9)	4,2 (0,8)
75 jaar en ouder	3,7 (0,9)	4,1 (0,9)
Opleidingsniveau		
Laag (t/m LBO) (ref)	3,8 (1,0)	4,1 (0,8)
Midden	3,7 (1,0)	4,2 (0,9)
Hoog (HBO en WO)	3,8 (1,0)	4,2 (1,0)
Diagnose (indexziekte)		
Hart- en vaatziekten (ref)	3,7 (1,0)	4,1 (0,8)
Astma/COPD	3,9 (1,0)	4,2 (0,9)
Aandoening bewegingsapparaat	3,7 (0,9)	4,2 (0,8)
Kanker	3,6 (1,0)	4,2 (1,1)
Diabetes	3,9 (0,9)	4,2 (0,9)
Neurologische aandoening	3,7 (1,1)	3,9 (1,1)
Spijverteringsaandoening	3,5 (1,1)	4,1 (0,8)
Overige chronische aandoeningen	3,7 (1,1)	4,1 (0,9)
Aantal chronische aandoeningen		
Eén (ref)	3,8 (1,0)	4,2 (0,9)
Twee	3,8 (1,0)	4,1 (1,0)
Drie of meer	3,7 (0,9)	4,2 (0,8)
Mate van beperking		
Geen of lichte beperkingen (ref)	3,8 (1,0)	4,2 (0,8)
Matige of ernstige beperkingen	3,6 (1,0)	4,0 (1,1)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

5 Eigen regie en zelfmanagement

Tabel B5.1 Mate waarin mensen met een chronische ziekte zich over het algemeen in staat voelen om de regie over hun eigen zorg te houden, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (SD)
Totale groep	8,7 (1,7)
Geslacht	
Man (ref)	8,7 (1,9)
Vrouw	8,8 (1,5)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	8,8 (1,2)
40-64 jaar	8,8 (1,5)
65-74 jaar	8,8 (1,8)
75 jaar en ouder	8,4 (2,1)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	8,3 (2,1)
Midden	8,8 (1,5)
Hoog (HBO en WO)	9,1 (1,3)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8,6 (2,0)
Astma/COPD	8,6 (1,8)
Aandoening bewegingsapparaat	8,5 (1,6)
Kanker	9,2 (1,1)
Diabetes	9,0 (1,5)
Neurologische aandoening	8,7 (1,5)
Spijverteringsaandoening	8,6 (1,7)
Overige chronische aandoeningen	8,9 (1,6)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	8,8 (1,7)
Twee	8,7 (1,7)
Drie of meer	8,6 (1,7)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	8,9 (1,7)
Matige of ernstige beperkingen	8,3 (1,6)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.2 Mate waarin mensen met een chronische ziekte het belangrijk vinden om de regie over hun eigen zorg in eigen hand te houden, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (SD)
Totale groep	9,1 (1,3)
Geslacht	
Man (ref)	9,0 (1,4)
Vrouw	9,2 (1,1)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	8,9 (1,2)
40-64 jaar	9,2 (1,3)
65-74 jaar	9,2 (1,2)
75 jaar en ouder	8,9 (1,4)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	8,9 (1,3)
Midden	9,1 (1,3)
Hoog (HBO en WO)	9,3 (1,2)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8,9 (1,6)
Astma/COPD	9,1 (1,1)
Aandoening bewegingsapparaat	9,0 (1,1)
Kanker	9,3 (0,9)
Diabetes	9,3 (1,3)
Neurologische aandoening	9,1 (1,2)
Spijverteringsaandoening	9,1 (1,4)
Overige chronische aandoeningen	9,2 (1,2)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	9,1 (1,2)
Twee	9,2 (1,3)
Drie of meer	9,0 (1,4)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	9,2 (1,3)
Matige of ernstige beperkingen	8,8 (1,2)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.3 Persoon/personen op wie de regie van de eigen zorg van mensen met een chronische ziekte grotendeels neerkomt, 2018 (percentage)

	Mijzelf % (95%-BI)	Mijn naaste(n) % (95%-BI)	Mijzelf en naaste(n), beiden evenveel % (95%-BI)
Totale groep	78 (74-81)	3 (2-5)	19 (16-22)
Geslacht			
Man (ref)	71 (65-76)	5 (3-7)	25 (20-30)
Vrouw	83 (79-86)	3 (2-5)	15 (11-19)
Leeftijd			
15-39 jaar (ref)	81 (66-91)	*	19 (9-34)
40-64 jaar	83 (77-87)	1 (0-4)	16 (11-22)
65-74 jaar	72 (67-78)	5 (3-8)	23 (18-28)
75 jaar en ouder	74 (67-79)	8 (5-12)	19 (14-24)
Opleidingsniveau			
Laag (t/m LBO) (ref)	70 (63-76)	7 (5-11)	23 (17-30)
Midden	77 (72-82)	3 (1-5)	20 (16-25)**
Hoog (HBO en WO)	89 (85-93)	*	11 (7-16)
Diagnose (indexziekte)			
Hart- en vaatziekten (ref)	74 (68-80)	6 (3-9)	20 (15-26)
Astma/COPD	80 (71-87)	2 (0-7)	17 (11-26)
Aandoening bewegingsapparaat	82 (72-88)	4 (2-9)	15 (8-24)
Kanker	77 (62-87)	2 (0-10)	22 (12-36)
Diabetes	77 (67-85)	3 (1-11)	19 (12-30)
Neurologische aandoening	61 (44-76)	4 (1-13)	34 (20-53)
Spijverteringsaandoening	78 (58-90)	*	22 (10-42)
Overige chronische aandoeningen	84 (77-90)	3 (1-8)	13 (8-20)
Aantal chronische aandoeningen			
Eén (ref)	83 (77-88)	2 (0-4)	15 (11-21)
Twee	74 (68-80)	5 (3-8)	21 (16-28)
Drie of meer	73 (67-78)	5 (3-9)	22 (17-28)
Mate van beperking			
Geen of lichte beperkingen (ref)	83 (80-87)	2 (0-3)	15 (12-19)
Matige of ernstige beperkingen	66 (59-72)	7 (5-11)	27 (21-33)

NB. Multinomiale logistische regressie met 'mijzelf' als basisuitkomst. De vetgedrukte waarden geven aan welke achtergrondkenmerken een significante invloed hebben op welke persoon/personen de regie over de zorg hebben

* Geen observaties

** Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen van een middelbaar opleidingsniveau en mensen met een hoog opleidingsniveau

Tabel B5.4 Mate waarin mensen met een chronische ziekte vinden dat zij over het algemeen genoeg steun krijgen van naasten bij hun gezondheidstoestand of zorgsituatie, 2018 (gemiddelde, range 0-10)

	M (SD)
Totale groep	8,4 (2,1)
Geslacht	
Man (ref)	8,5 (2,3)
Vrouw	8,3 (2,0)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	8,2 (2,3)
40-64 jaar	8,5 (2,0)
65-74 jaar	8,6 (2,0)
75 jaar en ouder	8,1 (2,4)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	8,2 (2,3)
Midden	8,4 (2,1)
Hoog (HBO en WO)	8,6 (2,0)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	8,1 (2,5)
Astma/COPD	8,3 (2,2)
Aandoening bewegingsapparaat	7,6 (2,7)
Kanker	8,9 (1,7)
Diabetes	8,9 (1,6)
Neurologische aandoening	8,7 (1,5)
Spijverteringsaandoening	8,5 (1,9)
Overige chronische aandoeningen	8,5 (1,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	8,4 (2,2)
Twee	8,6 (1,9)
Drie of meer	8,1 (2,3)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	8,7 (1,9)
Matige of ernstige beperkingen	7,7 (2,4)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.5 Mate van regie die mensen met een chronische ziekte ervaren over de zorg en de mogelijkheden die zij ervaren, gemiddelde van de 25 onderwerp-specifieke vragen van de Ervaren Regie vragenlijst, 2018 (gemiddelde, range 1-5).

	M (SD)
Totale groep	4,0 (0,6)
Geslacht	
Man (ref)	4,0 (0,7)
Vrouw	3,9 (0,5)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	4,0 (0,5)
40-64 jaar	4,0 (0,7)
65-74 jaar	4,0 (0,6)*
75 jaar en ouder	3,8 (0,5)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	3,8 (0,6)
Midden	4,0 (0,6)
Hoog (HBO en WO)	4,1 (0,5)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	3,9 (0,7)
Astma/COPD	3,9 (0,5)
Aandoening bewegingsapparaat	3,8 (0,6)
Kanker	4,0 (0,5)
Diabetes	4,1 (0,5)
Neurologische aandoening	3,9 (0,6)
Spijverteringsaandoening	4,1 (0,7)
Overige chronische aandoeningen	4,0 (0,6)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	4,0 (0,5)
Twee	4,0 (0,6)
Drie of meer	3,8 (0,6)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,1 (0,5)
Matige of ernstige beperkingen	3,8 (0,6)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

*Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen uit de leeftijdscategorie 65-74 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder

Tabel B5.6 Mate van regie die mensen met een chronische ziekte ervaren over het organiseren van professionele zorg, 2018 (gemiddelde, range 1-5).

	M (SD)
Totale groep	4,2 (0,6)
Geslacht	
Man (ref)	4,3 (0,7)
Vrouw	4,1 (0,6)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	4,3 (0,5)
40-64 jaar	4,2 (0,7)
65-74 jaar	4,2 (0,6)
75 jaar en ouder	4,0 (0,6)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	4,0 (0,6)
Midden	4,2 (0,6)
Hoog (HBO en WO)	4,4 (0,6)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	4,1 (0,7)
Astma/COPD	4,2 (0,6)
Aandoening bewegingsapparaat	3,9 (0,6)
Kanker	4,2 (0,6)
Diabetes	4,4 (0,6)
Neurologische aandoening	4,0 (0,6)
Spijverteringsaandoening	4,4 (0,7)
Overige chronische aandoeningen	4,2 (0,6)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	4,2 (0,6)
Twee	4,2 (0,7)
Drie of meer	4,1 (0,7)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,3 (0,6)
Matige of ernstige beperkingen	3,9 (0,6)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.7 Mate van regie die mensen met een chronische ziekte ervaren over het contact met professionele zorgverleners, 2018 (gemiddelde, range 1-5).

	M (SD)
Totale groep	4,1 (0,8)
Geslacht	
Man (ref)	4,2 (0,8)
Vrouw	4,1 (0,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	4,2 (0,7)
40-64 jaar	4,2 (0,8)
65-74 jaar	4,2 (0,7)
75 jaar en ouder	4,0 (0,7)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	4,0 (0,9)
Midden	4,2 (0,7)
Hoog (HBO en WO)	4,3 (0,6)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	4,1 (0,8)
Astma/COPD	4,0 (0,8)
Aandoening bewegingsapparaat	4,0 (0,8)
Kanker	4,1 (0,7)
Diabetes	4,4 (0,6)
Neurologische aandoening	4,2 (0,8)
Spijverteringsaandoening	4,3 (0,7)
Overige chronische aandoeningen	4,2 (0,8)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	4,2 (0,7)
Twee	4,2 (0,8)
Drie of meer	4,0 (0,8)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,2 (0,7)
Matige of ernstige beperkingen	4,0 (0,8)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.8 Mate van regie die mensen met een chronische ziekte ervaren over het voor zichzelf zorgen in de thuissituatie, 2018 (gemiddelde, range 1-5).

	M (SD)
Totale groep	4,1 (0,7)
Geslacht	
Man (ref)	4,1 (0,8)
Vrouw	4,2 (0,6)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	4,3 (0,6)
40-64 jaar	4,1 (0,7)
65-74 jaar	4,2 (0,6)
75 jaar en ouder	4,0 (0,7)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	4,1 (0,8)
Midden	4,1 (0,6)
Hoog (HBO en WO)	4,2 (0,6)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	4,1 (0,7)
Astma/COPD	4,1 (0,7)
Aandoening bewegingsapparaat	3,9 (0,7)
Kanker	4,1 (0,5)
Diabetes	4,3 (0,7)
Neurologische aandoening	4,1 (0,7)
Spijverteringsaandoening	4,3 (0,7)
Overige chronische aandoeningen	4,2 (0,6)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	4,1 (0,6)
Twee	4,2 (0,6)*
Drie of meer	4,0 (0,7)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	4,3 (0,6)
Matige of ernstige beperkingen	3,9 (0,7)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

*Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen met twee chronische aandoeningen en mensen met drie of meer chronische aandoeningen

Tabel B5.9 Mate van regie die mensen met een chronische ziekte ervaren over het vooruit zien naar intensievere zorg in de toekomst, 2018 (gemiddelde, range 1-5).

	M (SD)
Totale groep	3,7 (0,8)
Geslacht	
Man (ref)	3,7 (0,8)
Vrouw	3,7 (0,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	3,8 (0,8)
40-64 jaar	3,7 (0,8)
65-74 jaar	3,7 (0,8)
75 jaar en ouder	3,5 (0,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	3,5 (0,8)
Midden	3,7 (0,8)
Hoog (HBO en WO)	3,8 (0,8)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	3,6 (0,9)
Astma/COPD	3,6 (0,7)
Aandoening bewegingsapparaat	3,6 (0,7)
Kanker	3,7 (0,6)
Diabetes	3,8 (0,7)
Neurologische aandoening	3,7 (0,9)
Spijverteringsaandoening	3,9 (0,8)
Overige chronische aandoeningen	3,7 (0,8)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	3,7 (0,8)
Twee	3,7 (0,8)
Drie of meer	3,6 (0,8)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	3,8 (0,8)
Matige of ernstige beperkingen	3,5 (0,7)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.10 Mate van regie die mensen met een chronische ziekte ervaren over de ondersteuning die zij krijgen van naasten, 2018 (gemiddelde, range 1-5).

	M (SD)
Totale groep	3,7 (0,9)
Geslacht	
Man (ref)	3,8 (0,9)
Vrouw	3,7 (0,8)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	4,0 (0,8)
40-64 jaar	3,8 (0,9)
65-74 jaar	3,8 (0,8)
75 jaar en ouder	3,6 (0,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	3,7 (0,9)
Midden	3,8 (0,9)
Hoog (HBO en WO)	3,7 (0,9)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	3,7 (0,9)
Astma/COPD	3,7 (0,8)
Aandoening bewegingsapparaat	3,7 (0,9)
Kanker	3,9 (0,6)
Diabetes	3,8 (0,9)
Neurologische aandoening	3,6 (0,8)
Spijverteringsaandoening	3,8 (1,2)
Overige chronische aandoeningen	3,9 (0,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	3,7 (0,9)
Twee	3,9 (0,8)
Drie of meer	3,6 (0,9)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	3,8 (0,9)
Matige of ernstige beperkingen	3,6 (0,9)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.11 Mate waarin mensen met een chronische ziekte bereid en in staat zijn om via zelfmanagement een actieve bijdrage te leveren aan zijn eigen gezondheid en zorg, 2017 (gemiddelde, range 0-100, PAM)

	M (SD)
Totale groep	60,8 (14,9)
Geslacht	
Man (ref)	61,8 (15,0)
Vrouw	60,1 (14,9)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	64,7 (17,1)
40-64 jaar	61,4 (14,6)
65-74 jaar	60,3 (15,2)
75 jaar en ouder	57,9 (13,2)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	58,6 (14,8)
Midden	60,8 (14,6)
Hoog (HBO en WO)	64,0 (15,4)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	59,8 (13,8)
Astma/COPD	64,4 (16,3)
Aandoening bewegingsapparaat	59,1 (14,4)
Kanker	59,6 (12,9)
Diabetes	60,3 (14,6)
Neurologische aandoening	60,8 (16,7)
Spijverteringsaandoening	58,4 (12,7)
Overige chronische aandoeningen	60,6 (15,5)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	61,9 (15,0)
Twee	60,9 (15,3)
Drie of meer	58,9 (14,2)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	62,5 (14,9)
Matige of ernstige beperkingen	57,6 (14,4)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.12 Activatieniveau van mensen met een chronische ziekte, op basis van PAM score 0-100, 2017 (percentage)

	Niveau 1 Score ≤ 45,2 % (95%-BI)	Niveau 2 Score ≥ 45,3 en ≤ 52,9 % (95%-BI)	Niveau 3 Score ≥ 53,0 en ≤ 66,0 % (95%-BI)	Niveau 4 Score ≥ 66,1 % (95%-BI)
Totale groep	15 (13-18)	22 (19-25)	33 (29-36)	30 (27-34)
Geslacht				
Man (ref)	15 (11-19)	20 (16-25)	29 (25-34)	36 (31-41)
Vrouw	16 (13-20)	23 (19-27)	35 (30-40)	26 (22-31)
Leeftijd				
15-39 jaar (ref)	15 (7-30)	19 (10-33)	26 (15-41)	39 (26-54)
40-64 jaar	14 (11-19)	20 (16-25)	32 (27-37)	34 (29-39)
65-74 jaar	15 (12-20)	23 (19-28)	34 (28-40)	28 (23-33)
75 jaar en ouder	18 (13-23)	26 (21-31)	36 (31-42)	21 (16-26)
Opleidingsniveau				
Laag (t/m LBO) (ref)	20 (15-25)	21 (16-26)	36 (30-42)	24 (19-30)
Midden	14 (11-18)	23 (19-28)	32 (27-37)	31 (26-36)
Hoog (HBO en WO)	12 (8-18)	21 (16-27)	29 (23-36)	38 (31-46)
Diagnose (indexziekte)				
Hart- en vaatziekten (ref)	16 (12-22)	21 (16-27)	33 (28-40)	29 (24-35)
Astma/COPD	12 (7-20)	19 (13-27)	32 (24-40)	37 (28-46)
Aandoening bewegingsapparaat	14 (8-22)	27 (19-37)	34 (25-44)	25 (18-35)
Kanker	14 (7-26)	18 (10-32)	39 (27-54)	28 (17-42)
Diabetes	14 (8-23)	22 (15-31)	37 (27-47)	28 (20-37)
Neurologische aandoening	22 (12-37)	17 (9-29)	31 (18-47)	31 (19-46)
Spijsverteringsaandoening	19 (10-35)	29 (16-45)	24 (12-41)	28 (15-46)
Overige chronische aandoeningen	17 (11-25)	24 (17-33)	29 (22-37)	30 (22-38)
Aantal chronische aandoeningen				
Eén (ref)	14 (10-19)	19 (15-24)	35 (30-41)	32 (26-38)
Twee	16 (12-22)	22 (17-27)	32 (26-38)	30 (25-36)
Drie of meer	17 (13-22)	27 (22-32)	28 (23-34)	27 (22-33)
Mate van beperking				
Geen of lichte beperkingen (ref)	12 (10-15)	21 (17-25)	33 (29-37)	34 (30-38)
Matige of ernstige beperkingen	21 (17-27)	24 (19-29)	31 (26-37)	23 (18-29)

NB. Multinomiale logistische regressie met 'niveau 3' als basisuitkomst. De vetgedrukte waarden geven aan welke achtergrondkenmerken een significante invloed hebben op het activatieniveau

Tabel B5.13 Gezondheidsvaardigheden van mensen met een chronische ziekte, 2017 (percentage, HLS-EU-Q16)

	Onvoldoende % (95%-BI)	Beperkt % (95%-BI)	Voldoende % (95%-BI)
Totale groep	10 (8-13)	23 (19-26)	67 (63-71)
Geslacht			
Man (ref)	10 (7-14)	22 (17-27)	68 (62-74)
Vrouw	10 (7-13)	23 (19-29)	67 (61-72)
Leeftijd			
15-39 jaar (ref)	10 (4-24)	33 (21-49)	57 (42-71)
40-64 jaar	6 (4-9)*	16 (13-21)*	78 (72-82)
65-74 jaar	8 (5-12)**	23 (18-29)	69 (63-75)
75 jaar en ouder	23 (18-31)	27 (21-34)	49 (42-57)
Opleidingsniveau			
Laag (t/m LBO) (ref)	14 (10-20)	22 (16-29)	64 (56-71)
Midden	11 (8-16) [†]	21 (17-27)	67 (61-73)
Hoog (HBO en WO)	3 (1-6)	25 (19-33)	72 (64-78)
Diagnose (indexziekte)			
Hart- en vaatziekten (ref)	14 (9-19)	24 (19-31)	62 (55-69)
Astma/COPD	7 (3-14)	29 (20-40)	64 (53-74)
Aandoening bewegingsapparaat	9 (4-17)	26 (16-38)	65 (53-76)
Kanker	12 (5-25)	17 (9-31)	71 (56-82)
Diabetes	9 (5-18)	14 (8-23)	76 (66-84)
Neurologische aandoening	3 (0-11)	31 (17-50)	66 (47-80)
Spijverteringsaandoening	17 (7-37)	17 (8-32)	66 (48-80)
Overige chronische aandoeningen	10 (5-19)	18 (12-26)	72 (63-80)
Aantal chronische aandoeningen			
Eén (ref)	8 (5-12)	25 (20-32)	67 (60-73)
Twee	11 (8-16)	17 (13-23)	72 (65-77)
Drie of meer	13 (9-18)	24 (19-30)	63 (56-69)
Mate van beperking			
Geen of lichte beperkingen (ref)	6 (4-9)	22 (18-27)	71 (67-76)
Matige of ernstige beperkingen	18 (13-24)	23 (18-30)	59 (52-66)

NB. Multinomiale logistische regressie met 'voldoende' als basisuitkomst. De vetgedrukte waarden geven aan welke achtergrondkenmerken een significante invloed hebben op het activatieniveau

*Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen van de leeftijdscategorie 40-64 jaar en mensen van 75 jaar en ouder

** Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen van de leeftijdscategorie 65-74 jaar en mensen van 75 jaar en ouder

[†]Er is ook een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen van een middelbaar opleidingsniveau en mensen met een hoog opleidingsniveau

Tabel B5.14 Mate waarin mensen met een chronische ziekte aan zelfmanagement doen in hun dagelijks leven, 2018 (gemiddelde, range 0-8, PiH schaal)

	M (SD)
Totale groep	6,7 (1,0)
Geslacht	
Man (ref)	6,7 (1,0)
Vrouw	6,6 (1,0)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,3 (1,2)
40-64 jaar	6,7 (1,0)
65-74 jaar	6,8 (1,0)
75 jaar en ouder	6,6 (1,0)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6,4 (1,2)
Midden	6,8 (1,0)
Hoog (HBO en WO)	6,7 (0,9)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	6,7 (1,1)
Astma/COPD	6,7 (1,0)
Aandoening bewegingsapparaat	6,6 (1,0)
Kanker	6,6 (0,9)
Diabetes	6,9 (0,9)
Neurologische aandoening	6,6 (1,0)
Spijverteringsaandoening	6,5 (1,0)
Overige chronische aandoeningen	6,5 (1,2)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	6,7 (1,1)
Twee	6,6 (1,0)
Drie of meer	6,7 (1,0)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	6,8 (1,0)
Matige of ernstige beperkingen	6,4 (1,1)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.15 Mate waarin mensen met een chronische ziekte therapietrouw zijn, 2018 (gemiddelde, range 0-8, PiH schaal)

	M (SD)
Totale groep	7,1 (1,2)
Geslacht	
Man (ref)	7,1 (1,2)
Vrouw	7,1 (1,2)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,9 (1,1)
40-64 jaar	7,1 (1,2)
65-74 jaar	7,2 (1,3)
75 jaar en ouder	7,1 (1,2)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6,9 (1,3)
Midden	7,2 (1,2)
Hoog (HBO en WO)	7,1 (1,1)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	7,1 (1,3)
Astma/COPD	7,1 (1,0)
Aandoening bewegingsapparaat	6,9 (1,4)
Kanker	7,0 (1,3)
Diabetes	7,4 (1,0)
Neurologische aandoening	7,2 (1,0)
Spijverteringsaandoening	6,9 (1,4)
Overige chronische aandoeningen	6,9 (1,4)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	7,0 (1,3)
Twee	7,0 (1,3)
Drie of meer	7,3 (1,0)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	7,1 (1,3)
Matige of ernstige beperkingen	7,1 (1,1)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.16 Mate waarin mensen met een chronische ziekte kunnen omgaan met de gevolgen van hun aandoening(en) (coping), 2018 (gemiddelde, range 0-8, PiH schaal)

	M (SD)
Totale groep	6,2 (1,6)
Geslacht	
Man (ref)	6,4 (1,5)
Vrouw	6,1 (1,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	5,7 (1,9)
40-64 jaar	6,2 (1,6)*
65-74 jaar	6,5 (1,5)
75 jaar en ouder	6,2 (1,6)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6,0 (1,8)
Midden	6,4 (1,5)
Hoog (HBO en WO)	6,4 (1,4)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	6,4 (1,5)
Astma/COPD	6,2 (1,6)
Aandoening bewegingsapparaat	6,2 (1,6)
Kanker	6,4 (1,6)
Diabetes	6,6 (1,6)
Neurologische aandoening	5,7 (1,7)
Spijverteringsaandoening	6,1 (1,5)
Overige chronische aandoeningen	6,1 (1,9)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	6,3 (1,7)
Twee	6,2 (1,5)
Drie of meer	6,1 (1,6)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	6,6 (1,4)
Matige of ernstige beperkingen	5,5 (1,8)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

*Er is een significant verschil ($p < .01$) tussen mensen uit de leeftijdscategorie 40-64 jaar en mensen uit de leeftijdscategorie 64-74 jaar

Tabel B5.17 Mate waarin mensen met een chronische ziekte kunnen omgaan met de symptomen van hun aandoening(en), 2018 (gemiddelde, range 0-8, PiH schaal)

	M (SD)
Totale groep	6,6 (1,7)
Geslacht	
Man (ref)	6,5 (1,7)
Vrouw	6,7 (1,7)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,1 (1,9)
40-64 jaar	6,7 (1,6)
65-74 jaar	6,8 (1,5)
75 jaar en ouder	6,5 (1,8)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6,4 (1,9)
Midden	6,8 (1,6)
Hoog (HBO en WO)	6,7 (1,5)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	6,5 (1,9)
Astma/COPD	6,6 (1,6)
Aandoening bewegingsapparaat	6,6 (1,6)
Kanker	6,5 (1,6)
Diabetes	6,8 (1,5)
Neurologische aandoening	6,8 (1,6)
Spijverteringsaandoening	6,6 (1,6)
Overige chronische aandoeningen	6,6 (1,6)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	6,6 (1,7)
Twee	6,6 (1,7)
Drie of meer	6,8 (1,7)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	6,6 (1,7)
Matige of ernstige beperkingen	6,7 (1,7)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep

Tabel B5.18 Mate waarin mensen met een chronische ziekte kennis hebben van hun aandoening(en), 2018 (gemiddelde, range 0-8, PiH schaal)

	M (SD)
Totale groep	6,7 (1,3)
Geslacht	
Man (ref)	6,6 (1,3)
Vrouw	6,8 (1,3)
Leeftijd	
15-39 jaar (ref)	6,3 (1,6)
40-64 jaar	6,8 (1,2)
65-74 jaar	6,8 (1,2)
75 jaar en ouder	6,6 (1,4)
Opleidingsniveau	
Laag (t/m LBO) (ref)	6,5 (1,4)
Midden	6,8 (1,3)
Hoog (HBO en WO)	6,7 (1,1)
Diagnose (indexziekte)	
Hart- en vaatziekten (ref)	6,7 (1,2)
Astma/COPD	6,8 (1,0)
Aandoening bewegingsapparaat	6,4 (1,7)
Kanker	6,7 (1,2)
Diabetes	6,8 (1,3)
Neurologische aandoening	7,0 (0,9)
Spijverteringsaandoening	6,7 (1,1)
Overige chronische aandoeningen	6,5 (1,5)
Aantal chronische aandoeningen	
Eén (ref)	6,7 (1,3)
Twee	6,7 (1,3)
Drie of meer	6,8 (1,2)
Mate van beperking	
Geen of lichte beperkingen (ref)	6,8 (1,2)
Matige of ernstige beperkingen	6,6 (1,4)

NB. Vetgedrukte waarden verschillen significant van de waarde van de referentiegroep