

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 4e gegevensrapportage volwassenen (oktober-december 2022)

Mark Bosmans, Christos Baliatsas, Mariëtte Hooiveld, Tessa Magnée,
Babet Kanis, Michel Dückers

In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De data waarop de cijfers in dit cijferoverzicht betrekking hebben komen uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Nivel Zorgregistraties) en richt zich op volwassenen (25 jaar en ouder). Daarnaast worden vragenlijsten uitgezet in representatieve panels. Beide datastromen worden ook gepresenteerd op een RIVM-website: www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19.

Actuele cijfers gebruik huisartsenzorg

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de Nederlandse volwassenen, zowel direct als indirect. Om deze in kaart te brengen heeft het Nivel cijfers omtrent huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende gezondheidsproblemen op een rijtje gezet, met gebruikmaking van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We richten ons op een aantal 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat om zowel gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, en symptomen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Sinds 2022 zijn daar ook cijfers rondom suïcide(pogingen/gedachten) aan toegevoegd. De cijfers van oktober tot en met december (2022) worden vergeleken met die van dezelfde maanden in eerdere jaren (2019, 2020 en 2021). Hierbij is onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75+), geslacht en provincies.

NB: het gaat bij de kort-cyclische monitoring altijd om momentopnames: het geeft een beeld van het welzijn en de problemen van (doelgroepen binnen) de Nederlandse bevolking op een bepaald punt in de tijd. Tijdens de coronapandemie veranderen de omstandigheden met betrekking tot de virussituatie en de genomen maatregelen voortdurend. Het is mogelijk dat deze inmiddels anders zijn dan tijdens de periode waar de cijfers van de meest actuele ronde van kort-cyclische monitoring op zijn gebaseerd. Deze rapportage richt zich op oktober tot en met december 2022.

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van gezondheidsproblemen die zeer weinig voorkomen (zoals in dit cijferoverzicht bijvoorbeeld het geval is bij suïcide(pogingen)). Hierbij kunnen kleine verschillen al tot grote schommelingen leiden.


Wat valt op in de periode oktober-december:

Veel klachten op niveau van voor de coronapandemie

- Zoals al te zien was in eerdere cijferoverzichten, lag ook in het laatste kwartaal van 2022 de prevalentie van contact met de huisarts voor veel klachten en gezondheidsproblemen op een vergelijkbaarniveau met dezelfde periode in 2019. De klachten waarvoor dat niet zo is worden hieronder besproken.

Slaapproblemen


- Het aantal contacten met de huisarts voor slaapproblemen lag in het laatste kwartaal van 2022 iets hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dit was vooral zo bij de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). Deze groep komt veel vaker hiervoor bij de huisarts kwam dan de andere groepen, en vrouwen wat vaker dan mannen.



Figuur 1 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen(25 jaar en ouder).

Geheugen- en concentratieproblemen


- De zorgprevalentie voor geheugen- en concentratieproblemen lag in het laatste kwartaal wat hoger dan voor corona (2019). Het ging hierbij vrijwel uitsluitend om de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). De jongste twee leeftijdsgroepen (25-44 en 45-64 jaar) kwamen hiervoor nauwelijks bij de huisarts, en vrouwen in het laatste kwartaal van 2022 wat vaker dan mannen.



Figuur 2 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Spierpijn

- De frequentie van contacten met de huisarts voor spierpijn was in het laatste kwartaal van 2022 iets lager dan voor de coronaperiode, maar wel vergelijkbaar met 2021. De prevalentie van consulten voor spierpijn lag steeds veel hoger bij vrouwen dan bij mannen. De jongste leeftijdsgroep (25-44) bezocht hiervoor wat minder vaak de huisarts.




Figuur 3 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Suicide(pogingen/gedachten)

- Het aantal huisartscontacten rondom suicide(pogingen/gedachten) in absolute zin is laag. In het vierde kwartaal van 2022 is wel een korte piek in het zorggebruik te zien, hoewel dit geen groot verschil is (ca. 8 t.o.v. ca. 6 per 100.000). Onder de jongste leeftijdsgroep (25-44 jaar) is het

aantal contacten in het vierde kwartaal in 2022 hoger in vergelijking met dit kwartaal in voorgaande jaren. De prevalentie is hoger bij vrouwen. Ook hebben vrouwen dit vierde kwartaal meer contacten ten opzichte van voorgaande jaren, en ten opzichte van het vorige kwartaal.



Figuur 4 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Verschillen tussen mannen en vrouwen

- Over het algemeen liggen zorgprevalenties (in alle jaren) bij vrouwen hoger bij verschillende gezondheidsproblemen. Dit was met name het geval bij een aantal psychische problemen (angst, depressie en stress/crisis), maar ook bij misselijkheid, spierpijn, hartkloppingen, moeheid, duizeligheid en hoofdpijn). Bij andere klachten en gezondheidsproblemen zijn er geen of kleine verschillen.
- Bij een aantal gezondheidsproblemen is te zien dat wanneer er een verhoging van prevalentie in het vierde kwartaal is, deze verhoging bij vrouwen wat sterker is dan bij mannen (bijv. andere symptomen/klachten luchtwegen en suicide(pogingen/gedachten)).

Verschillen naar leeftijd

- De leeftijdsgroep 75 jaar en ouder ging vaker naar de huisarts dan jongere mensen voor een deel van de in dit cijferoverzicht beschreven gezondheidsproblemen/aandoeningen, vooral voor geheugen- en concentratieproblemen, duizeligheid, benauwdheid en slaapproblemen, maar ook voor pijn en druk/beklemming toegeschreven aan het hart, moeheid en misselijkheid.
- De jongere leeftijdsgroepen gingen juist vaker naar de huisarts voor depressieve klachten, hevige stress of crisis en suicide pogingen/gedachten.

Kerstvakantie

- Voor de meeste onderzochte gezondheidsproblemen is tijdelijk een (lichte) afname in het aantal contacten met de huisarts te zien in de kerstvakantieperiode. Dit is een jaarlijks terugkerend patroon en hangt samen met het feit dat veel mensen in die periode op vakantie gaan huisartsenpraktijken soms een deel van de week gesloten zijn vanwege de feestdagen.

Over de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De surveillance cijfers van Nivel Zorgregistraties zijn bedoeld voor de signalering van (infectie-) ziekten en andere klachten in de algemene bevolking, maar kunnen ook gebruikt worden voor de monitoring van andere acute klachten. Er zijn wekelijkse cijfers beschikbaar over gezondheidsproblemen en aandoeningen in de Nederlandse bevolking op basis van – geanonimiseerde – gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken.

De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde gezondheidsproblemen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (cijfer van prevalentie van contact met de huisarts). Verschillen in weekcijfers worden niet op significantie getoetst. De gegevens zijn afkomstig van ca. 390 deelnemende huisartsenpraktijken met ongeveer 1,6 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). De gegevens over de door huisartsen geregistreerde gezondheidsproblemen en aandoeningen worden routinematig vastgelegd gebruikmakend van de ICPC (International Classification of Primary Care, versie 1). Dit classificatiesysteem wordt in Nederland door alle huisartsen gebruikt.

Acute gezondheidsproblemen/condities die mogelijk (direct of indirect) gerelateerd zijn aan de coronapandemie, zoals gepresenteerd aan huisartsen, zijn in kaart gebracht. We richten ons op een aantal 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat om zowel gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, en gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen worden door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Een directe link is echter niet te maken: besmetting wordt niet geregistreerd in deze data. Zie onderstaande tabel voor de geïncludeerde gezondheidsproblemen en ICPC codes:

Tabel 1

Lijst met 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen en overeenkomende ICPC-1 codes

<i>Gezondheidsproblemen</i>	<i>ICPC code (naam code)</i>
Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)*	R02 (Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen) R03 (Piepende ademhaling) R04 (Andere problemen ademhaling) R29 (Andere symptomen/klachten luchtwegen)
Moeheid*	A04 (Moeheid/zwakte)
Spierpijn*	L18
Misselijkheid	D09
Pijn of druk op de borst*	K01 (Pijn toegeschreven aan hart) K02 (Druk/beklemming toegeschreven aan hart) K03 (Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel)
Hartkloppingen*	K04 (Hartkloppingen/bewust van hartslag)
Angstig/nerveus/gespannen gevoel	P01
Plotselinge (hevige) stress of crisis	P02 (Crisis/voorbijgaande stressreactie)
Depressief gevoel*	P03 (Down/depressief gevoel)
Suicide(pogingen) en suïcidale gedachten	P77 (Suicide(poging))
Slaapproblemen	P06 (Slapeloosheid/andere slaapproblemen)
Hoofdpijn*	N01 N02 (Spanningshoofdpijn)

Duizeligheid of licht in het hoofd	N17
Geheugen- concentratieproblemen*	of P20 (Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen)
Andere afwijking(en) reuk/smaak*	N16

* Relevant voor 'Long covid' volgens de RIVM-lijst:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/langdurige-klachten-na-corona>

Deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel Zorgregistraties, onder nummer NZR-00321.036.

Meer weten?

Meer informatie over de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is te vinden op <https://www.nivel.nl/nl/project/integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-gor-covid-fysieke-en-psychische-gezondheidseffecten>.

U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties. Meer informatie over de surveillance staat op: www.nivel.nl/surveillance. Gegevens van Nivel Zorgregistraties zijn op aanvraag beschikbaar: www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel.

Titelgegevens van deze publicatie

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magneé, T., Kanis, B., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 4e gegevensrapportage volwassenen (oktober-december 2022). KORT-CYCLISCHE NIVEL ZORGREGISTRATIES RAPPORTAGE. Utrecht: Nivel, 2023.

1 Wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor gezondheidsproblemen en aandoeningen

1.1 Ademhalingsproblemen




Fig. 1.1 Weekcijfers huisartsconsulten van benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.2 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.3 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.4 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.5 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.6 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.7 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.8 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.9 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over geslacht.




Fig. 1.10 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.11 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.12 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.2 Moeheid




Fig. 1.13 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.14 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.15 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen, verdeeld over geslacht.

1.3 Spierpijn




Fig. 1.16 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.17 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.18 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.4 Misselijkheid




Fig. 1.19 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.20 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.21 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen, verdeeld over geslacht.

1.5 Pijn of druk op de borst




Fig. 1.22 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.23 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan hart onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.24 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.25 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.26 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan hart onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.27 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.28 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan het hart onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.29 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan het hart onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.30 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.6 Hartkloppingen




Fig. 1.31 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.32 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.33 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.7 Angstig, nerveus, gespannen




Fig. 1.34 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.35 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.36 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.8 Plotselinge (hevige) stress of crisis




Fig. 1.37 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.38 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.39 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.9 Depressieve gevoelens




Fig. 1.40 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.41 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.42 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.10 Suïcide(pogingen/gedachten)




Fig. 1.43 Weekcijfers huisartsconsulten van suïcide(pogingen/gedachten) onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.44 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.45 Weekcijfers huisartsconsulten van suïcide(pogingen/gedachten) onder volwassenen, verdeeld over geslacht.

1.11 Slaapproblemen




Fig. 1.46 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.47 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.48 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.12 Hoofdpijn




Fig. 1.49 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.50 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.51 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.52 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.53 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.54 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.13 Duizeligheid of licht in het hoofd




Fig. 1.55 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.56 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.57 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.14 Geheugen- of concentratieproblemen




Fig. 1.58 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.59 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.60 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.15 Afwijkingen in reuk of smaak




Fig. 1.61 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.62 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.63 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen verdeeld over geslacht.

2 Bijlage. provinciale specificering wekelijkse zorgprevalenties van symptomen en aandoeningen



Fig. 1.64 Weekcijfers huisartsconsulten dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen per provincie.




Fig. 1.65 Weekcijfers huisartsconsulten piepende ademhaling per provincie.




Fig. 1.66 Weekcijfers huisartsconsulten andere problemen ademhaling per provincie.



Fig. 1.67 Weekcijfers huisartsconsulten andere symptomen/klachten luchtwegen per provincie.




Fig. 1.68 Weekcijfers huisartsconsulten moeheid naar provincie




Fig. 1.69 Weekcijfers huisartsconsulten spierpijn per provincie.



Fig. 1.70 Weekcijfers huisartsconsulten misselijkheid naar provincie




Fig. 1.71 Weekcijfers huisartsconsulten pijn toegeschreven aan het hart per provincie




Fig. 1.72 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan het hart per provincie.




Fig. 1.73 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel per provincie.




Fig. 1.74 Weekcijfers huisartsconsulten hartkloppingen per provincie.




Fig. 1.75 Weekcijfers huisartsconsulten angstige, nerveuze of gespannen gevoelens per provincie.



Fig. 1.76 Weekcijfers huisartsconsulten plotselinge (hevige) stress of crisis per provincie.




Fig. 1.77 Weekcijfers huisartsconsulten depressieve gevoelens per provincie.




Fig. 1.78 Weekcijfers huisartsenconsulten suicide(pogingen/gedachten) per provincie.




Fig. 1.79 Weekcijfers huisartsconsulten slaapproblemen per provincie.




Fig. 1.80 Weekcijfers huisartsconsulten hoofdpijn per provincie.




Fig. 1.81 Weekcijfers huisartsconsulten spanningshoofdpijn per provincie.




Fig. 1.82 Weekcijfers huisartsconsulten duizelig/licht in het hoofd per provincie.



Fig. 1.83 Weekcijfers huisartsconsulten geheugen- of concentratieproblemen per provincie.




Fig. 1.84 Weekcijfers huisartsconsulten afwijking(en) reuk/smaak per provincie.