


Zorg door de huisarts: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers
2018-2022



Marianne Heins en Julia Bes
Yvette Weesie
Rodrigo Davids
Marcus Winckers
Leontien Korteweg
Marloes Hellwich
Liset van Dijk
Bart Knottnerus
Lucy Overbeek
Jeroen Hasselaar
Karin Hek en Joost Vanhommerig



NIVEL

Kennis voor betere zorg

Zorg door de huisarts: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema's met een groot maatschappelijk belang. 'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat mensen in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Ons onderzoek draait uiteindelijk om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren. Alle onderzoeken publiceert het Nivel openbaar, dat is statutair vastgelegd

Juni 2023

ISBN 978-94-6122-809-3

zorgregistraties@nivel.nl

www.nivel.nl

030 2 729 700

© 2023 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT

Gegevens uit deze uitgave mogen worden overgenomen onder vermelding van Nivel en de naam van de publicatie. Ook het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Voorwoord

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt continu gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Vanuit verschillende zorgdisciplines worden routinematige zorggegevens verzameld. Resultaten worden gepresenteerd op de website www.nivel.nl/zorgregistraties. Deze website geeft onder andere antwoord op de vraag welke gezondheidsproblemen in Nederland voorkomen, welke zorg wordt verleend in de eerste lijn en wat de kwaliteit van deze zorg is.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn wordt uitgevoerd door het Nivel met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een uitgebreide beschrijving van het project vindt u op onze website.

Het rapport dat voor u ligt bevat een selectie van de gegevens gepubliceerd op de website, namelijk de tabellen over de zorg voor patiënten door de huisarts en welke gezondheidsproblemen vóórkomen in de bevolking (incidentie- en prevalentiecijfers van symptomen en ziekten) in het kalenderjaar 2022. Trendcijfers worden (indien beschikbaar) gegeven over de periode 2018-2022. Voor cijfers over andere disciplines en cijfers over multidisciplinaire zorg verwijzen we u naar de website. Het is ook mogelijk een specifieke gegevensaanvraag te doen via <https://www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel>.

Wij danken de deelnemende zorgverleners voor hun inzet en het aanleveren van gegevens.

De auteurs

Inhoud

Voorwoord	3
Kernpunten	5
Introductie	7
Methode	8
Kenmerken van ingeschreven patiënten	12
Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik	13
Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen	21
Cijfers huisartsen - Voorgeschreven geneesmiddelen	26
Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn	33
Bijlage bij Jaarrapport 2022: Zorg door de huisarts	38
Patiëntkenmerken	39
Omvang Zorggebruik	40
Gezondheidsproblemen	52
Prescripties	57
Morbiditeitscijfers	69

Kernpunten

Hoewel begin 2022 de laatste COVID-19 maatregelen vervielen, kunnen de jaarcijfers over morbiditeit en zorggebruik in de huisartsenpraktijk ook in 2022 mogelijk nog worden beïnvloed door gevolgen van (maatregelen rond) de COVID-19 pandemie. Zo kan uitgestelde zorg in ziekenhuizen bijvoorbeeld nog effect hebben hierop. Uit gegevens van 2021 bleek al wel dat de huisartsenzorg in grote lijnen weer op het niveau zat van voor de pandemie. In dit rapport vergelijken we de cijfers van 2022 daarom met het meest recente jaar (2021). Daar waar nog steeds verschillen zijn met voor de pandemie zal dit benoemd worden door een vergelijking te maken met de cijfers van 2019, het meest recente jaar voor de COVID-19 pandemie.

Omvang zorggebruik

- Driekwart (77,6%) van de ingeschreven patiënten bij een huisarts had in 2022 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. Dit percentage is hoger dan in 2021 (76,6%), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (78,2%).
- Patiënten hadden in 2022 gemiddeld 5,0 keer contact met de huisartsenpraktijk. Dit is ongeveer gelijk aan het niveau van 2021 en het niveau van voor de coronapandemie.
- De contacten met de huisartsenpraktijk in 2022 betroffen hoofdzakelijk contacten met de huisarts (83,7%). Consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (resp. gemiddeld 1,3 en 2,2 contacten per patiënt) zijn het meeste gedeclareerd, en kwamen gemiddeld het meest voor bij patiënten van 85 jaar en ouder (resp. gemiddeld 4,2 en 4,7 contacten per patiënt).
- Het aantal consulten bij de POH-GGZ in 2022 was 169 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is 12% hoger dan in 2019 (150) en nagenoeg gelijk aan 2021. De meeste contacten met de POH-GGZ waren consulten van 20 minuten en langer (134 contacten per 1.000 ingeschreven patiënten). Dit past in de trend van meer psychische problematiek tijdens en na corona.
- Het aantal gedeclareerde modernisering en innovatie (M&I)-verrichtingen was 184 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2022; dit is bijna gelijk aan 2021 (187). Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I-verrichting 'Intensieve zorg, dag' het meeste gedeclareerd. Deze verrichting mocht vanaf maart 2020 gebruikt worden voor huisbezoek bij (mogelijke) gevallen van COVID-19.

Gezondheidsproblemen

- Met in de huisartsenpraktijk geregistreerde diagnose-informatie wordt jaarlijks per diagnose het aantal nieuwe (incidentie) en bestaande (prevalentie) personen met de betreffende klacht of aandoening berekend; we noemen dit ziekte-episodes (lees [hier](#) meer over de gehanteerde methode).
- Het totaal aantal ziekte-episodes steeg in 2022 ten opzichte van 2021 met 6,6%. De toename in ziekte-episodes werd verklaard door een toename in acute klachten en aandoeningen. Van 35% van alle acute klachten en aandoeningen is de incidentie in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021.
- De sterkste toename in acute klachten ten opzichte van 2021 vond plaats bij klachten en aandoeningen van de huid (+35,4%) en de luchtwegen (+11,1%).
- Urineweginfectie is de diagnose die het vaakst gesteld wordt in de huisartsenpraktijk. In 2022 zijn er per 1.000 ingeschreven patiënten 149 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle

contacten). Op de tweede en derde plek komen essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,4%) en diabetes mellitus (1,9%).

- De twee meest voorkomende gezondheidsproblemen bij mannen in 2022 zijn hypertensie zonder orgaanschade en diabetes mellitus; bij vrouwen zijn dit urineweginfectie en hypertensie zonder orgaanschade.

Voorgeschreven geneesmiddelen

- Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2022 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,0%). Dit is iets hoger dan in 2021 (66,1%), maar nog steeds iets lager dan in 2019 (69,6%). Er was in 2022 ten opzichte van 2021 een toename van het aantal patiënten tot 18 jaar met een geneesmiddel. Voor de andere leeftijdsgroepen bleef het aantal patiënten met tenminste één voorschrift gelijk aan 2021.
- Het percentage patiënten dat minimaal één antibioticum kreeg voorgeschreven is ten opzichte van 2021 gestegen (van 13,9% in 2021 naar 16,0% in 2022), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (17,2%).
- Maagzuurremmers zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk: 15,0% van de ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk kreeg tenminste één keer dit geneesmiddel in 2022 voorgeschreven.
- Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk worden het meeste voorgeschreven in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Bij 0-17 jarigen staan geneesmiddelen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18-44 jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen.

Verwijzingen naar de tweede lijn

- In 2022 zijn er per 1.000 ingeschreven patiënten 338 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist. Dit is een toename van 3,4 % ten opzichte van 2021 (327) en ook hoger ten opzichte van 2019 (306).
- De grootste stijging in 2022 ten opzichte van 2021 is te zien in de leeftijdsgroep 0-17 jarigen (van 158 naar 172 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten).
- Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist. Dit verschil is met name zichtbaar in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar.
- De meeste verwijzingen vonden in 2022 plaats naar dermatologie, gevolgd door KNO-heelkunde, orthopedie, psychiatrie en oogheelkunde. Voor de meeste specialismen is het aantal verwijzingen hoger dan het voorgaande jaar.
- De stijging in aantal verwijzingen naar psychiatrie houdt sinds 2019 aan (20 per 1.000 ingeschreven patiënten) en zette in 2022 door naar 31 per 1.000 ingeschreven patiënten.

Introductie

Voor de meeste gezondheidsproblemen is in Nederland de huisartsenpraktijk de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. De huisarts heeft een poortwachter functie: voor het raadplegen van specialistische hulp is meestal een verwijzing van een huisarts nodig. Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk (inschrijving op naam).

Bijna alle huisartsen houden hun medische dossiers elektronisch bij. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische testen. Verwijzingen naar de specialistische tweedelijns zorg worden vastgelegd via ZorgDomein. Deze gegevens vormen de basis voor de hier gepresenteerde cijfers.

De cijfers in dit rapport gaan over het rapportagejaar 2022 en zijn gebaseerd op gegevens uit 430 huisartsenpraktijken met in totaal 1.902.017 ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen.

Hoewel begin 2022 de laatste COVID-19 maatregelen vervielen, kunnen de jaarcijfers over morbiditeit en zorggebruik in de huisartsenpraktijk ook in 2022 mogelijk nog worden beïnvloed door gevolgen van (maatregelen rond) de COVID-19 pandemie. Zo kan uitgestelde zorg in ziekenhuizen bijvoorbeeld nog effect hebben hierop. Uit gegevens van 2021 bleek al wel dat de huisartsenzorg in grote lijnen weer op het niveau zat van voor de pandemie. In dit rapport vergelijken we de cijfers van 2022 daarom met het meest recente jaar (2021). Daar waar nog steeds verschillen zijn met voor de pandemie zal dit wel benoemd worden door een vergelijking te maken met de cijfers van 2019, het meest recente jaar voor de COVID-19 pandemie.

Doel van het rapport

Dit rapport geeft inzicht in de populatie die in de huisartsenpraktijken staat ingeschreven, de patiënten die de huisarts bezoeken, de in de praktijk gepresenteerde gezondheidsproblemen en de door de huisarts geleverde zorg aan deze patiënten.

Vraagstellingen


1. Wat zijn kenmerken van patiënten die staan ingeschreven in de huisartsenpraktijk?
2. Wat is de omvang van het zorggebruik van patiënten in 2022 en wat is hiervan de trend over de jaren 2018-2022 wat betreft:
 - aantallen en type contacten met de huisartsenpraktijk;
 - aantallen en aard van voorgeschreven geneesmiddelen (en voor welke indicatie);
 - aantallen patiënten verwezen naar de tweede lijn, naar welke specialismen en voor welke indicatie?

Methode

Omvang gegevensverzameling en geografische spreiding

In 2022 zijn ruim 500 praktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Voorafgaand aan de analyses vinden kwaliteitscontroles plaats op correctheid en volledigheid van de verzamelde gegevens (deze staan verderop in het rapport beschreven onder het kopje “kwaliteitscontrole”). Ook kunnen praktijken uitvallen omdat zij gebruik maken van een ander huisartsinformatiesysteem (HIS) die (nog) niet aan onze database specificaties voldoen of gebruik maken van een externe partij voor het verwerken van inschrijfdeclaraties. Als gevolg van de kwaliteitschecks en de bovengenoemde redenen, wordt er dit jaar gerapporteerd over gegevens uit 430 praktijken met in totaal 1.902.017 ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Zo zijn bijvoorbeeld niet van alle praktijken verwijsgegevens bekend, omdat deze gegevens niet via het eigen HIS wordt geleverd, maar via ZorgDomein. Het onderstaand kaartje laat de geografische spreiding zien van de geïnccludeerde huisartsenpraktijken (Figuur 1).

*Figuur 1 Geografische spreiding aantal deelnemende huisartsenpraktijken, 2022**



** hoe roder, hoe meer deelnemende huisartsenpraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding);
lichtgrijs: geen deelnemende huisartsenpraktijken*

Representativiteit

De huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties zijn niet helemaal representatief voor alle Nederlandse praktijken (<https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/beroepenregistraties-de-gezondheidszorg>). Zoals te zien in tabel 1 is er een ondervertegenwoordiging van duo praktijken. Ook zijn praktijken in niet stedelijke en matig stedelijke gebieden enigszins oververtegenwoordigd, praktijken in weinig stedelijke gebieden en zeer sterk stedelijke gebieden zijn iets ondervertegenwoordigd. De patiënten uit praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties vormen wel een goede afspiegeling van de Nederlandse populatie. Zoals te zien in Tabel 2 komt de leeftijds- en geslachtsverdeling in grote mate overeen.

Om te corrigeren voor eventuele verschillen zijn de gegevens over het zorggebruik, type gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicatie en verwijzingen naar de tweede lijn gestandaardiseerd naar de samenstelling van de Nederlandse populatie op leeftijd, geslacht en stedelijkheid. Tabellen met gegevens per leeftijdscategorie zijn niet gestandaardiseerd.

Tabel 1 *Kenmerken van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, en van alle huisartsenpraktijken in Nederland, naar type praktijk en urbanisatiegraad, 2022*

Characteristics of GP practices participating in Nivel Primary care database and all GP practices in the Netherlands according to practice type and urbanisation level, 2022

in %	Nederland*	Nivel Zorgregistraties
Type praktijk:		
solo praktijk	17,5	22,8
duo praktijk	43,8	33,3
Groepspraktijk	38,7	37,1
Onbekend	-	6,8
Stedelijkheid:		
zeer sterk stedelijke gebieden	25,9	21,7
sterk stedelijke gebieden	29,9	28,9
matig stedelijke gebieden	16,1	18,6
weinig stedelijke gebieden	21,3	17,7
niet stedelijke gebieden	6,9	13,1

*Cijfers type praktijk afkomstig van Batenburg et al. Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken. Een actualisering voor de periode 2020-2022. Nivel. Utrecht, 2023. Cijfers stedelijkheid afkomstig van CBS Statline, verdeling januari 2022.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 2 Demografische kenmerken van de populatie ingeschreven in huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, en van de totale Nederlandse bevolking, 2022

Demographic characteristics of the patient population listed in GP practices participating in Nivel Primary care database and of the total Dutch population, 2022

in %	Nederland	Nivel Zorgregistraties
Aantal personen	17.475.415	1.902.017
Aantal persoonsjaren*	-	1.837.483
Geslacht:		
Mannen	49,7	49,6
Vrouwen	50,3	50,4
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 4 jaar	4,9	4,7
5 t/m 17 jaar	14,0	13,9
18 t/m 44 jaar	33,8	33,6
45 t/m 64 jaar	27,3	27,4
65 t/m 74 jaar	11,1	11,2
75 t/m 84 jaar	6,7	7,0
85 jaar en ouder	2,2	2,3

* Totale tijd dat de patiëntenpopulatie in het rapportagejaar ingeschreven stond in de huisartsenpraktijk

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Aard van de gegevens

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt gegevens die iedere huisarts routinematig, als onderdeel van het zorgproces, vastlegt in zijn elektronisch medisch dossier:

- Contacten en verrichtingen zoals gedeclareerd bij zorgverzekeraars
- Gepresenteerde gezondheidsproblemen (de door de huisarts gestelde diagnose (o.b.v. [ICPC code](#)))
- Voorgeschreven geneesmiddelen met (waar beschikbaar) bijbehorende diagnose
- Verwijzingen naar de tweede lijn (incl. verwijsdiscipline) en bijbehorende diagnose (verwijsindicatie) vastgelegd via ZorgDomein
- Laboratoriumuitslagen en andere zogenaamde meetwaarden
- Patiëntkenmerken: vier cijfers van postcode van het woonadres; geboortjaar; geslacht

Berekening en rapportage van de cijfers

De cijfers over het aantal contacten, verwijzingen, aantal geneesmiddelen en gezondheidsproblemen worden berekend ten opzichte van het aantal ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk of het aantal persoonsjaren (totale tijd dat de patiëntenpopulatie in het jaar ingeschreven stond in de huisartsenpraktijk). De cijfers zijn bovendien gestandaardiseerd op leeftijd, geslacht en stedelijkheid voor die tabellen waarin geen opsplitsing in leeftijdsgroepen wordt weergegeven. Wanneer de cijfers van 2022 worden vergeleken met voorgaande jaren, zal gerapporteerd worden over verschillen in vergelijking tot 2021 en waar nog verschillende ten opzichte van voor de coronapandemie, ook met 2019.

Vergelijkbaarheid van gegevens

Deelnemers aan Nivel Zorgregistraties maken gebruik van verschillende softwarepakketten. In deze rapportage zijn gegevens meegenomen van 4 huisartsinformatiesystemen (HIS), namelijk: Medicom, OmniHis, CGM Huisarts en Promedico ASP.

Het Nivel stelt extractiespecificaties op voor de softwareleveranciers, waarin staat welke gegevens gewenst zijn. De softwareleveranciers vervaardigen vervolgens de extractie-programmatuur en de gegevens komen via een Trusted Third Party (TTP) bij het Nivel binnen. Het vergelijkbaar maken van gegevens (semantische integratie) uit de verschillende gegevensbronnen vindt bij het Nivel plaats.

Kwaliteitscontrole

De gegevens van de deelnemende huisartsenpraktijken zijn niet altijd correct en/of volledig. Het Nivel controleert daarom de volledigheid en correctheid van de gegevens op een aantal punten alvorens deze te gebruiken voor analyses en rapportage. Doordat deze controles per onderdeel gebeuren zijn de resultaten in dit rapport niet altijd gebaseerd op hetzelfde aantal praktijken en ingeschreven patiënten.

Voor cijfers over het zorggebruik in de huisartsenpraktijk wordt er gecontroleerd op goede kwaliteit gegevens van 1) geregistreerde diagnoses in het journaal, 2) gedeclareerde verrichtingen, 3) voorgeschreven geneesmiddelen, en 4) geregistreerde uitslagen. Daarvoor moet ten eerste van minimaal 46 weken gegevens geleverd zijn. Daarnaast moet de kwaliteit van de gegevens voldoende zijn. De precieze criteria verschillen per onderdeel, maar voor de diagnoseregistratie moet bijvoorbeeld bij minimaal 70% van de contacten een geldige ICPC-code geregistreerd zijn; bij de geneesmiddelenregistratie moet bijvoorbeeld bij minimaal 85% van de voorschriften een ATC-code geregistreerd zijn. Dit leverde in 2022 een maximale sample op van 430 praktijken met in totaal 1.902.017 ingeschreven patiënten.

Bij het onderdeel voorgeschreven geneesmiddelen wordt er gerapporteerd over diagnoses bij de geneesmiddelen. Diagnoses bij voorschriften kunnen door meerdere redenen ontbreken, zoals terugkoppeling vanuit de apotheek of het niet verplicht hoeven registreren van een diagnose bij een voorschrift in het HIS. Daarom nemen we een extra filter mee wanneer we kijken naar de diagnoses bij voorschriften. We nemen dan alleen praktijken mee die bij minimaal 50% van de voorschriften een diagnose hebben geregistreerd.

Het aantal praktijken op basis waarvan morbiditeitscijfers (incidentie- en prevalentiecijfers van symptomen en aandoeningen) worden berekend, wordt op een andere wijze bepaald. Hiervoor zijn namelijk kwalitatief goede gegevens nodig over meerdere jaren. Lees [hier](#) meer over de gehanteerde methode. In 2022 resulteerde dat in een sample van 376 praktijken met in totaal 1.678.735 ingeschreven patiënten.

Tenslotte is er een apart filter voor verwijzingen naar de tweede lijn. Boven op de filtercriteria voor het bepalen van het zorggebruik (zie hier boven) moeten er in een praktijk minimaal 150 verwijzingen per 1.000 patiënten zijn geregistreerd en verwijzingen plaatsgevonden hebben in minimaal 11 maanden van het jaar. Verwijzingen worden geleverd via ZorgDomein. Dit is niet bij alle aan Nivel Zorgregistraties deelnemende praktijken mogelijk, waardoor het aantal praktijken dat gebruikt kan worden voor het bepalen van de verwijscijfers, lager uitvalt. De verwijscijfers van 2022 zijn gebaseerd op gegevens uit 297 praktijken met in totaal 1.316.332 ingeschreven patiënten.

Kenmerken van ingeschreven patiënten

Het percentage vrouwen dat in 2022 stond ingeschreven in de huisartsenpraktijk was vrijwel gelijk aan het percentage mannen. De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven patiënten was 42 jaar. Ongeveer een derde deel van de patiënten van de huisartsenpraktijk was tussen de 18 en 44 jaar oud. Meer over representativiteit kunt u vinden in de methode paragraaf.

Tabel 3 *Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijken die deelnamen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2022*

Demographic features of registered patients in general practice in 2022

in %	2022
Geslacht:	
Man	49,6
Vrouw	50,4
Leeftijdscategorie:	
0 t/m 4 jaar	4,7
5 t/m 17 jaar	13,9
18 t/m 44 jaar	33,6
45 t/m 64 jaar	27,4
65 t/m 74 jaar	11,2
75 t/m 84 jaar	7,0
85 jaar en ouder	2,3
Gemiddelde leeftijd	42,3

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Cijfers huisartsen - Omvang zorggebruik

Hoeveel van de ingeschreven patiënten heeft contact met de huisarts in één jaar? Wat is het gemiddelde aantal contacten? Wat is de omvang van het zorggebruik per leeftijdscategorie? En hoe verhoudt zich dit tot andere jaren? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.

Bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Sinds 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie segmenten. Voor meer informatie hierover zie website van de [Nederlandse Zorgautoriteit](#).

Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk:

- Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg, o.a. vaste consulttarieven in de huisartsenpraktijk
- Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg (zgn. ketenzorgprogramma's)
- Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing, o.a. (belonings)afspraken over resultaten van ingezette zorg uit zowel segment 1 en segment 2

De berekeningen van het zorggebruik in de huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op door de zorgverlener gedeclareerde verrichtingen bij de zorgverzekeraar. Geleverde zorg in segment 1 en segment 3 kunnen per verrichting door de zorgverlener gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Geleverde ketenzorg in segment 2 vallen binnen een diagnose-behandelcombinatie (DBC) en zijn derhalve niet af te leiden van de gedeclareerde verrichtingen. Daarom is er in 2019 een methode ontwikkeld om het aantal contacten in het kader van de ketenzorg (segment 2) op een alternatieve wijze te schatten (voor meer informatie: lees [hier](#)). Voor de trend 2018-2022 is deze berekening met terugwerkende kracht toegepast op de cijfers van 2018.

Kernpunten 2022

- Driekwart (77,6%) van de ingeschreven patiënten bij een huisarts had in 2022 minimaal één contact met de huisartsenpraktijk. Dit percentage is hoger dan in 2021 (76,6%), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (78,2%).
- Patiënten hadden in 2022 gemiddeld 5,0 keer contact met de huisartsenpraktijk. Dit is ongeveer gelijk aan het niveau van 2021 en het niveau van voor de coronapandemie.
- De contacten met de huisartsenpraktijk in 2022 betroffen hoofdzakelijk contacten met de huisarts (83,7%). Consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten (resp. gemiddeld 1,3 en 2,2 contacten per patiënt) zijn het meeste gedeclareerd, en kwamen gemiddeld het meest voor bij patiënten van 85 jaar en ouder (resp. gemiddeld 4,2 en 4,7 contacten per patiënt).
- Het aantal consulten bij de POH-GGZ in 2022 was 169 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is 12% hoger dan in 2019 (150) en nagenoeg gelijk aan 2021. De meeste contacten met de POH-GGZ waren consulten van 20 minuten en langer (134 contacten per 1.000 ingeschreven patiënten). Dit past in de trend van meer psychische problematiek tijdens en na corona.
- Het aantal gedeclareerde modernisering en innovatie (M&I)-verrichtingen was 184 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2022; dit is bijna gelijk aan 2021 (187). Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I-verrichting 'Intensieve zorg, dag' het meeste gedeclareerd. Deze verrichting mocht vanaf maart 2020 gebruikt worden voor huisbezoek bij (mogelijke) gevallen van COVID-19.

Aantal patiënten met minimaal één contact met de huisartsenpraktijk

In 2022 had 77,6% van alle ingeschreven patiënten minimaal één gedeclareerd contact met de huisartsenpraktijk (Tabel 4). Bij kinderen van 0 t/m 4 jaar en kinderen van 5 t/m 17 jaar lag het aantal patiënten met minimaal één gedeclareerd contact in 2022 hoger dan in 2021 (79,0% versus 76,1% voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en 67,9% versus 64,1% voor kinderen van 5 t/m 17 jaar). Bij de overige leeftijdsgroepen verschilde het aantal patiënten met minimaal één gedeclareerd contact nauwelijks tussen 2022 en 2021.

Tabel 4 *Percentage ingeschreven patiënten met één of meerdere contacten met de huisartsenpraktijk per jaar naar leeftijdsgroep, 2018-2022*

Percentage of registered patients with one or more consultations with the practice per year by age group, 2018-2022

	2018	2019	2020*	2021*	2022
0 t/m 4 jaar	78,2	78,3	71,0	76,1	79,0
5 t/m 17 jaar	69,7	69,3	63,8	64,1	67,9
18 t/m 44 jaar	72,7	72,9	70,4	71,6	72,7
45 t/m 64 jaar	80,3	80,3	77,8	79,3	78,9
65 t/m 74 jaar	89,0	89,3	87,4	88,3	88,1
75 t/m 84 jaar	94,2	94,3	93,6	93,4	93,4
85 jaar en ouder	95,9	96,5	96,7	96,6	96,5
Totaal	78,1	78,2	75,3	76,6	77,6

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Aantal contacten met de huisartsenpraktijk

Per 1.000 ingeschreven patiënten waren er in 2022 5.049,6 contacten met de huisartsenpraktijk, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 5,0 contacten per persoon (Tabel 5). Dit is vergelijkbaar met het aantal contacten dat patiënten in 2021 en het jaar voor de COVID-19 pandemie (2019) hadden.

Het aantal contacten voor ketenzorg in 2022 was 467 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is een daling t.o.v. 2021, toen het aantal contacten voor ketenzorg op 483 per 1.000 patiënten lag. De grootste daling was te zien bij ketenzorg voor Astma (-12,4%) en COPD (-6,5%). Bij diabetes was er geen daling te zien (+0,6%). Contacten voor ketenzorg wordt geschat op basis van het aantal mensen in een ketenzorgprogramma. Per persoon wordt gerekend met een vast aantal consulten per aandoening waarvoor zij ketenzorg ontvangen (zie [hier](#) uitleg over de gebruikte methode). De daling in 2022 laat dus vooral zien dat er bij minder patiënten ketenzorg geregistreerd was.

Het aantal contacten met de POH-GGZ in 2022 was 169 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit is een lichte daling t.o.v. 2021, toen het aantal contacten met de POH-GGZ op 172 per 1.000 patiënten lag. Dit aantal is nog wel iets hoger dan in 2019 (150), het jaar voor de COVID-19 pandemie.

Tabel 5 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact, 2018-2022

Number of consultations in general practice by type of consultation per 1,000 registered patients, 2018-2022

	2018	2019	2020*	2021*	2022
Huisarts	4.067,0	4.138,2	3.992,1	4.207,8	4.226,2
Ketenzorg**	487,5	522,0	541,7	483,4	467,1
M&I-verrichting	173,8	185,8	165,5	187,1	183,7
POH-GGZ	141,8	150,3	163,3	172,3	168,8
ANW-consulteren	4,1	2,5	1,4	0,7	0,6
Eerstelijns verblijf	0,7	0,9	0,6	0,6	0,7
Keuringen	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3
Stoppen met roken	2,4	2,2	3,0	2,5	2,1
Totaal	4.877,8	5.002,2	4.867,7	5.054,7	5.049,6

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico

Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bij kinderen van 0 t/m 4 jaar en kinderen van 5 t/m 17 jaar lag het aantal contacten met de huisartspraktijk in 2022 iets hoger dan in 2021 (Tabel 6). Bij de overige leeftijdsgroepen verschilde het aantal contacten met de huisartspraktijk nauwelijks tussen 2022 en 2021. Net zoals in voorgaande jaren hadden patiënten van 85+ jaar het vaakst (gemiddeld 15,2 keer) en kinderen van 5-17 jaar het minst vaak (gemiddeld 2,3 keer) contact met de praktijk in 2022 (Tabel 6 en 7). Opvallend was de stijging in eerstelijns verblijf bij patiënten van 85 jaar en ouder, van 7,6 per 1.000 patiënten in 2021 naar 13,1 per 1.000 patiënten in 2022.

Tabel 6 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven patiënten naar leeftijd, 2018-2022

Number of consultations in general practice by age per 1,000 registered patients, 2018-2022

	2018	2019	2020*	2021*	2022
0 t/m 4 jaar	3.392,8	3.357,7	2.709,0	3.418,2	3.657,9
5 t/m 17 jaar	2.338,4	2.340,4	2.044,4	2.106,2	2.335,3
18 t/m 44 jaar	3.634,0	3.753,0	3.705,8	3.870,0	3.887,4
45 t/m 64 jaar	5.054,5	5.235,6	5.127,8	5.280,0	5.131,6
65 t/m 74 jaar	7.320,8	7.594,7	7.366,3	7.476,4	7.360,7
75 t/m 84 jaar	10.363,5	10.542,6	10.491,4	10.304,4	10.081,0
85 jaar en ouder	14.712,5	15.122,0	15.369,2	15.474,6	15.170,3
Totaal	4.877,8	5.002,2	4.867,7	5.054,7	5.049,6

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 7 Aantal contacten met de huisartsenpraktijk per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022

Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2022

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 Jaar	65-74 Jaar	75-84 jaar	85+ jaar	Totaal
Huisarts	3.642,0	2.236,4	3.470,3	4.166,3	5.619,5	7.844,3	12.296,8	4.226,2
Ketenzorg*	0,4	6,7	72,7	584,6	1.285,8	1.592,8	1.617,6	467,1
M&I- verrichting	11,3	26,8	96,1	184,2	327,9	520,1	1.127,2	183,7
POH-GGZ	3,1	64,9	244,9	191,8	123,3	117,4	112,2	168,8
ANW- consulten	1,0	0,4	0,5	0,5	0,7	1,0	2,5	0,6
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	0,8	2,8	13,1	0,7
Keuringen	-	-	0,2	0,2	0,4	1,9	0,6	0,3
Stoppen met roken	-	-	2,5	3,5	2,4	0,8	0,2	2,1
Totaal	3.657,9	2.335,3	3.887,4	5.131,6	7.360,7	10.081,0	15.170,3	5.049,6

* Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Type contacten met de huisarts

Zoals gebruikelijk betroffen de contacten met de huisartsenpraktijk in 2022 voornamelijk contacten met de huisarts (83,7%). Dit waren voornamelijk consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten, respectievelijk gemiddeld 1,3 en 2,2 contacten per patiënt (Tabel 8). Bij jongeren van 5-17 jaar ligt dit type contact het laagste (resp. 0,6 en 1,4 contacten per patiënt) en bij ouderen van 85 jaar en ouder) het hoogste (resp. 4,2 en 4,7 contacten per patiënt).

Tabel 8 aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022

Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1,000 registered

2021	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1.002,1	581,9	1.081,9	1.245,8	1.678,9	2.381,0	4.154,5	1.276,8
Consult 5-20 min.	2.286,9	1.402,7	1.892,6	2.214,4	2.908,0	3.763,3	4.714,0	2.231,5
Consult 20 min. en langer	348,8	249,5	485,0	668,5	874,7	1.125,6	1.174,5	596,0
Visite kort	2,7	1,2	5,0	15,4	66,1	255,8	1.062,4	54,8
Visite lang	1,5	1,0	5,0	21,5	91,1	317,7	1.190,6	66,4
Vaccinatie	<0,1	0,1	0,9	0,7	0,6	1,0	0,7	0,7
Totaal	3.642,0	2.236,4	3.470,3	4.166,3	5.619,5	7.844,3	12.296,8	4.226,2

patients, 2022

*Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

In 2022 was het totaal aantal consulten met de huisarts nagenoeg gelijk aan 2021 (Tabel 9). Bij de meeste type contacten was een lichte daling te zien. Alleen het aantal consulten van 5 tot 20 minuten steeg licht, van 2,1 per patiënt in 2021 tot 2,2 per patiënt in 2022.

Tabel 9 Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact, 2019-2022

Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2019-2022

	2019	2020*	2021*	2022
Consult < 5 minuten	1.177,7	1.341,1	1.358,9	1.276,8
Consult 5-20 minuten	2.195,6	1.962,7	2.114,5	2.231,5
Consult 20 minuten en langer	604,5	563,6	606,0	596,0
Visite kort	83,7	59,5	58,1	54,8
Visite lang	75,0	63,9	69,5	66,4
Vaccinatie	1,8	1,2	0,7	0,7
Totaal	4.138,2	3.992,1	4.207,8	4.226,2

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Daarom kunnen er alleen trends over de periode 2019-2021 beschreven worden.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Type contacten met de POH-GGZ

De meeste contacten met de POH-GGZ in 2022 waren consulten van 20 minuten en langer (79,3%). Het aantal consulten lag het hoogste in de groep 18-44 jaar (Tabel 10). Naarmate de leeftijd van de patiënt oploopt, daalt het aantal consulten van 20 minuten en langer en stijgt het aantal visites van de POH-GGZ.

Tabel 10 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022

Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2022

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,4	6,3	19,4	11,8	7,1	7,4	8,8	12,2
Consult 5-20 min.	0,9	9,6	28,1	18,6	11,3	12,4	13,9	18,5
Consult 20 min. en langer	1,7	48,7	196,4	159,1	97,7	78,1	42,5	133,8
Groepsconsult	<0,1	0,1	0,5	0,4	0,7	0,3	0,2	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Visite lang	<0,1	0,1	0,5	1,8	6,4	18,9	45,7	3,7
Totaal	3,1	64,9	244,9	191,8	123,3	117,4	112,2	168,8

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Ten opzichte van 2021 zijn er geen grote verschillen in het aantal consulten met de POH-GGZ (Tabel 11). Er was een lichte daling in het aantal consulten van korter dan 5 minuten, van 13,7 naar 12,2 contacten per 1.000 patiënten.

Tabel 11 Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact, 2019-2022

Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation per 1,000 registered patients, 2019-2022

	2019	2020*	2021*	2022
Consult < 5 minuten	10,4	13,8	13,7	12,2
Consult 5-20 minuten	10,8	19,6	18,5	18,5
Consult 20 minuten en langer	124,0	125,6	135,7	133,8
Groepsconsult	0,9	0,4	0,4	0,4
Visite kort	0,2	0,1	0,1	0,1
Visite lang	4,1	3,8	3,9	3,7
Totaal	150,3	163,3	172,3	168,8

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Daarom kunnen er alleen trends over de periode 2019-2021 beschreven worden.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Modernisering & Innovatie (M&I): aantal verrichtingen

M&I-verrichtingen zijn verrichtingen die plaatsvinden in de huisartsenpraktijk met als doel modernisering en innovatie te stimuleren. Tot 2015 vielen deze verrichtingen onder segment 1 en werden deze verrichtingen via een apart tarief bekostigd. Sinds 2015 valt dit onderdeel van het zorggebruik nog deels onder 'zijn oude' segment 1 'Basiszorg huisartsenzorg' met een vast tarief en deels onder zijn nieuwe segment 3 'Resultaatbeloning en zorgvernieuwing' met een vrij tarief.

Het aantal gedeclareerde M&I-verrichtingen was 184 per 1.000 ingeschreven patiënten in 2022. Dit is bijna gelijk aan de 187 per 1.000 in 2021 en 186 voor de COVID-19 pandemie in 2019 (Tabel 5). Voor vrouwen werden meer M&I-verrichtingen gedeclareerd dan voor mannen. Bij zowel mannen als vrouwen werd de M&I verrichting 'Intensieve zorg, dag' het meeste gedeclareerd, gevolgd door 'Chirurgie' (Tabel 12). De verrichting 'Intensieve zorg, dag' mocht in 2020 en 2021 gebruikt worden voor bezoek aan huis bij (mogelijke) gevallen van COVID-19, waarbij de huisarts in volledige bescherming moest verschijnen.

Tabel 12 Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Number and percentage declared M&I services by sex per 1,000 registered patients, 2022, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Intensieve zorg, dag	29,2	18,9	39,7	18,6	34,5	18,8
Chirurgie	29,1	18,9	33,6	15,8	31,4	17,1
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	19,9	12,9	22,5	10,6	21,2	11,6
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,5	8,8	23,1	10,8	18,3	10,0
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	15,0	9,8	16,7	7,8	15,9	8,6
Longfunctiemeting (= spirometrie)	8,5	5,5	10,7	5,0	9,6	5,2
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	14,1	6,6	7,1	3,9
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	4,3	2,8	6,6	3,1	5,4	3
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,6	3	4,7	2,2	4,7	2,6
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	4,6	3	4,4	2,1	4,5	2,5
Diabetes begeleiding per jaar	4,9	3,2	4,0	1,9	4,5	2,4
Polyfarmacie	3,1	2	4,6	2,1	3,8	2,1
Uitstrijkje	-	-	6,9	3,2	3,5	1,9
Cognitieve functietest (MMSE)	2,9	1,9	4,3	2,0	3,6	1,9
Hartritmestoornissen	1,5	1	2,8	1,3	2,2	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,3	1,5	2,0	1,0	2,2	1,2
Teledermatologie	1,7	1,1	2,3	1,1	2,0	1,1
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,9	1,2	2,1	1,0	2,0	1,1
Module Abdominale echografie	1,2	0,8	3,0	1,4	2,1	1,1
Spleetlamponderzoek	1,2	0,8	1,3	0,6	1,3	0,7
Intensieve zorg, ANW	1,1	0,7	0,9	0,4	1,0	0,5
Audiometrie	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Oogboring	0,9	0,6	<0,1	<0,1	0,5	0,3
Tympanometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2
Euthanasie	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Reizigersadvisering	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	153,9	100%	213,1	100%	183,7	100%

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen

Dit onderdeel bestaat uit twee delen: a) incidentie- en prevalentiecijfers van klachten en aandoeningen in de huisartsenpraktijk, en b) de meest gepresenteerde gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ.

Kernpunten 2022

- Met in de huisartsenpraktijk geregistreerde diagnose-informatie wordt jaarlijks per diagnose het aantal nieuwe (incidentie) en bestaande (prevalentie) personen met de betreffende klacht of aandoening berekend; we noemen dit ziekte-episodes (lees [hier](#) meer over de gehanteerde methode).
- Het totaal aantal ziekte-episodes steeg in 2022 ten opzichte van 2021 met 6,6%. De toename in ziekte-episodes werd verklaard door een toename in acute klachten en aandoeningen. Van 35% van alle acute klachten en aandoeningen is de incidentie in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021.
- De sterkste toename in acute klachten ten opzichte van 2021 vond plaats bij klachten en aandoeningen van de huid (+35,4%) en de luchtwegen (+11,1%).
- Urineweginfectie is de diagnose die het vaakst gesteld wordt in de huisartsenpraktijk. In 2022 zijn er per 1.000 ingeschreven patiënten 149 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten). Op de tweede en derde plek komen essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,4%) en diabetes mellitus (1,9%).
- De twee meest voorkomende gezondheidsproblemen bij mannen in 2022 zijn hypertensie zonder orgaanschade en diabetes mellitus; bij vrouwen zijn dit urineweginfectie en hypertensie zonder orgaanschade.

Incidentie- en prevalentiecijfers van klachten en aandoeningen

Met in de huisartsenpraktijk geregistreerde diagnose-informatie wordt jaarlijks per diagnose het aantal nieuwe (incidentie) en bestaande (prevalentie) personen met de betreffende klacht of aandoeningen berekend (lees [hier](#) meer over de gehanteerde methode). Bijlage E bevat per ICPC-diagnosecode de incidentie en (jaar)prevalentie in de periode 2018-2022 voor mannen, vrouwen en totaal. De incidentie is het aantal nieuwe episodes van de betreffende klacht of aandoeningen in het jaar. Bij acuutere problemen (zoals bijvoorbeeld griep, hoofdpijn of snijwonden) is het mogelijk dat een persoon meerdere keren per jaar 'incident' is. De (jaar)prevalentie is het aantal personen dat gedurende het jaar minimaal een keer de betreffende klacht of aandoeningen heeft gehad. Bij de vergelijking tussen 2021 en 2022 valt op dat bij een groot aantal klachten en aandoeningen de incidentie en/of de prevalentie is gestegen, ook ten opzichte van 2019, het jaar voor de start van de COVID-19 pandemie.

Deze cijfers zijn gebaseerd op zogenaamde ziekte-episodes (oftewel de periode tussen de diagnosedatum en de (geschatte) datum van herstel). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen acute, langdurige en chronische ziekte-episodes. Bij acute ziekte-episodes wordt iemand als hersteld beschouwd als deze de huisarts een aantal weken (afhankelijk van de aandoening; 4, 8 of 16 weken) niet voor de betreffende aandoening heeft bezocht, bij langdurige ziekte-episodes is dit 1 jaar en bij chronische ziekte-episodes wordt iemand nooit als hersteld beschouwd.

Het aantal acute ziekte-episodes lag in 2022 hoger dan in 2021 (+12,5%). Opvallend is dat vooral in de groep 5-17 jarigen en de groep van 18 tot 44 jarigen het aantal acute ziekte-episodes in 2022 hoger lag dan in 2021 (Tabel 13). Ook ten opzichte van het niveau van voor de COVID-19 pandemie in 2019 lag het niveau in 2022 hoger (+11,3%), waarbij dezelfde leeftijdsgroepen opvielen.

Het aantal langdurige ziekte-episodes lag in 2022 is weer ongeveer gelijk ten opzichte van 2021 (+1,1%). Een lichte stijging was te zien in bijna alle leeftijdsgroepen, met voornamelijk een uitzondering van mannen uit groep van 5 t/m 17 jaar (-1,7%) en vrouwen uit de groep 18 t/m 44 jaar (-0,7%) (Tabel 13). Het aantal langdurige aandoeningen in 2022 ten opzichte van voor de COVID-19 pandemie ligt, met uitzondering van 0 t/m 4 jarigen, nog bij alle leeftijden niet op het oude niveau.

Het aantal chronische ziekte-episodes lag in 2022 was ongeveer ook weer gelijk aan het aantal in 2021. Een daling was voornamelijk zichtbaar in de groep 0 t/m 4 jaar (bij mannen -3,0%, bij vrouwen -4,7%), die zich vanaf voorgaande jaren steeds doorgezet (Tabel 13). Ten opzichte van 2019 is het aantal chronische aandoeningen onder 18 t/m 44 jarigen het meeste toegenomen in 2022 (bij mannen +10,6% en bij vrouwen +7,6%).

Tabel 13 Aantal ziekte-episodes per 1.000 ingeschreven patiënten naar verwachte duur van aandoening, leeftijd en geslacht, 2019-2022**

Number of episodes of illness by age and sex per 1,000 registered patients, 2019-2022

in jaar	Acuut				Langdurig				Chronisch			
	2019	2020*	2021*	2022	2019	2020*	2021*	2022	2019	2020*	2021*	2022
Mannen												
0 t/m 4	3.315,8	2.764,7	3.329,3	3.740,2	589,3	555,8	582,3	589,5	459,5	432,3	424,5	411,7
5 t/m 17	1.564,3	1.361,8	1.444,9	2.004,8	654,3	613,7	628,8	618,0	725,6	739,4	747,0	735,2
18 t/m 44	1.637,4	1.559,0	1.672,3	2.009,5	686,9	657,4	671,0	680,0	567,9	592,3	616,2	628,0
45 t/m 64	2.206,2	2.096,8	2.206,2	2.427,7	997,4	943,4	955,6	969,3	1323,0	1.340,1	1.352,0	1.356,3
65 t/m 74	3.021,1	2.837,6	2.957,7	3.171,2	1.500,2	1.425,0	1.442,9	1.461,2	2799,9	2.817,1	2.835,3	2.808,6
75 t/m 84	3.896,9	3.721,3	3.714,0	3.949,8	2.148,1	2.059,8	2.032,6	2.057,1	3973,0	4.025,6	4.039,5	3.999,8
85 en ouder	5.354,9	5.248,2	5.184,4	5.390,9	3.026,4	2.948,9	2.957,9	2.968,5	5088,9	5.204,2	5.243,7	5.232,1
Vrouwen												
0 t/m 4	3.077,4	2.565,9	3.074,9	3.463,1	497,5	479,7	497,0	495,5	399,1	387,2	378,9	361,1
5 t/m 17	1.862,2	1.608,5	1.691,1	2.244,0	723,4	685,3	698,5	696,0	691,8	704,9	708,6	692,8
18 t/m 44	2.898,8	2.780,2	2.957,9	3.346,4	1.746,4	1.691,2	1.735,1	1.722,3	741,6	771,1	793,0	798,2
45 t/m 64	3.239,1	3.037,8	3.205,0	3.448,9	1.576,5	1.485,9	1.517,3	1.530,6	1.597,1	1.617,4	1.640,7	1.640,1
65 t/m 74	3.783,7	3.515,7	3.647,3	3.862,0	1.715,0	1.612,3	1.630,2	1.656,4	3.069,6	3.101,0	3.130,6	3.108,6
75 t/m 84	4.640,8	4.446,7	4.400,9	4.553,9	2.348,0	2.242,8	2.219,5	2.245,0	4.285,8	4.351,3	4.364,5	4.335,9
85 en ouder	5.859,3	5.753,0	5.768,7	5.887,0	3.192,3	3.055,4	3.031,4	3.102,4	5.366,7	5.489,4	5.566,5	5.586,9
Totaal	2.681,0	2.512,4	2.652,9	2.985,1	1.277,8	1.220,9	1.244,3	1.257,6	1.446,3	1.478,0	1.505,0	1.515,9

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** de ziekteperiode vanaf de diagnosedatum tot de (geschatte) datum van herstel

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het totaal aantal ziekte-episodes lag in 2022 6,6% boven het niveau van 2021. De cijfers laten zien dat dit weer gelijk aan het niveau van 2019 is, na een eerdere daling in 2020 (t.o.v. 2019). De sterkste toename ten opzichte van 2021 vond plaats bij klachten en aandoeningen van de huid (+35,4%) en de luchtwegen (+11,1%). De grootste stijgers hierbij waren respectievelijk scabiës (schurftmijt)/andere aandoeningen door mijten (+94%) en influenza (het griepvirus; +200%). Een afname ten opzichte van 2021 vond enkel plaats bij klachten en aandoeningen rondom zwangerschap, bevalling en geboorteregeling (-2,0%), en klachten en aandoeningen van geslachtsorganen van de vrouw (-0,9%) (Tabel 14).

Tabel 14 Aantal ziekte-episodes per 1.000 ingeschreven patiënten naar ICPC-hoofdstuk, 2019-2022**

Number of episodes of illness by ICPC chapter per 1,000 registered patients, 2019-2022

	2019	2020*	2021*	2022	% verschil 2022 met 2021
A: Algemeen	177,5	188,8	187,6	192,0	+2,3
B: Bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel	245,2	232,0	253,1	259,1	+2,4
D: Spijsverteringsorganen	282,9	270,6	291,1	295,0	+1,4
F: Oog	231,5	219,3	228,8	235,4	+2,8
H: Oor	233,7	223,2	230,8	241,3	+4,5
K: Cardiovasculair stelsel	252,2	227,4	235,9	252,1	+6,8
L: Bewegingsapparaat	823,8	775,8	796,2	802,1	+0,7
N: Zenuwstelsel	513,5	496,6	503,1	513,0	+2,0
P: Psychische problemen	254,5	245,9	255,7	257,1	+0,5
R: Luchtwegen	292,4	281,5	268,8	298,7	+11,1
S: Huid	615,2	605,7	675,3	914,1	+35,4
T: Endocriene klieren, stofwisseling en voeding	565,9	544,1	562,2	585,7	+4,2
U: Urinewegen	357,1	350,6	361,0	364,4	+0,9
W: Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling	210,3	206,0	204,9	200,8	-2,0
X: Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten	126,8	124,5	129,4	128,2	-0,9
Y: Geslachtsorganen man, inclusief borsten	119,9	117,7	120,3	120,7	+0,4
Z: Sociale problemen	102,7	101,2	98,2	98,9	+0,7
Totaal	5405,1	5210,8	5402,3	5758,6	+6,6

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

** de ziekteperiode vanaf de diagnosedatum tot de (geschatte) datum van herstel

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Van 35% van alle acute klachten en aandoeningen nam de incidentie in 2022 toe ten opzichte van 2021 (Zie bijlage E). Een grote toename was te zien voor 'Influenza (R80)' dat tijdens de COVID-19 pandemie minder voorkwam en nu steeg van 1,9 per 1.000 in 2021 naar 5,2 per 1.000 in 2022 (+200%). Daarnaast waren er nog twee minder vaak voorkomende aandoeningen met een grote toename: 'Andere symptomen/klachten bloed/lymfestelsel (B29)' was een stijging te zien van 250% van en 'Angst voor ziekte oog (F27)' een stijging van 150% van 0,3 in 2021 naar 0,6 in 2022. Deze relatieve stijgingen vallen waarschijnlijk vooral hoog uit doordat deze aandoeningen weinig voorkomen. Wanneer we kijken naar absolute verschillen zijn de grootste stijgers, ten opzichte van 2021: 'Andere infectie(s) luchtwegen' (waar, naast difterie, o.a. Sars-Cov-2/COVID-19 en Langdurige COVID-19 onder vallen; prevalentie +151/1.000 personen), hoesten (+15,8/1.000 personen) en acute infectie van de bovenste luchtwegen (+13,1/1.000 personen). De grootste dalers in 2022 ten opzichte

van 2021 waren codes die in het begin van de COVID-19 pandemie gebruikt werden om (zorgen rond) COVID-19 te registreren: 'Angst voor andere ziekte (A27)' daalde met 81,6% en 'Angst voor andere ziekte luchtwegen (R27)' daalde met 85%.

Meest gepresenteerde gezondheidsproblemen in de huisartsenpraktijk

Uit de combinatie van de gedeclareerde contacten met de huisarts of de praktijkondersteuner GGZ (consulten en visites) en de geregistreeerde diagnoses, blijkt dat urineweginfectie de meest voorkomende reden is om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk (Tabel 15). In 2022 waren er per 1.000 ingeschreven patiënten 149 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten), dit is gelijk aan 2021. Daarna waren essentiële hypertensie zonder orgaanschade (2,4%) en diabetes mellitus (1,9%) de meest voorkomende gezondheidsklachten.

Er is verschil in gepresenteerde gezondheidsproblemen tussen mannen en vrouwen. In 2022 waren, net als in 2021, bij mannen de meeste gepresenteerde klacht essentiële hypertensie zonder orgaanschade en diabetes mellitus. Bij vrouwen staan urineweginfecties op nummer 1 van de meest voorkomende gezondheidsproblemen waarvoor een contact met de huisartsenpraktijk gedeclareerd werd.

Een deel van de contacten van patiënten met een gezondheidsprobleem die ook onder de integrale bekostiging vallen (segment 2) wordt niet meer apart gedeclareerd door de huisarts. Hierdoor is bijvoorbeeld het aantal diabetes gerelateerde contacten, zoals in de onderstaande tabel weergegeven, een onderschatting.

Tabel 15 Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten, 2022*, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Most frequent health problems during consultation with the general practitioner or practice nurse mental health per 1,000 registered patients, 2022, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	148,5	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	110,4	2,5	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	250,2	3,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	136,6	2,4	T90	Diabetes mellitus	107,8	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	162,5	2,3
T90	Diabetes mellitus	105,6	1,9	H81	Overmatig cerumen	77,9	1,7	A04	Moeheid/zwakte	118,1	1,7
R05	Hoesten	92,1	1,6	R05	Hoesten	76,6	1,7	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	111,0	1,6
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	88,8	1,5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	68,1	1,5	R05	Hoesten	107,4	1,5
A04	Moeheid/zwakte	87,1	1,5	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	66,3	1,5	T90	Diabetes mellitus	103,4	1,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	77,4	1,4	A04	Moeheid/zwakte	55,8	1,3	P76	Depressie	89,2	1,3
H81	Overmatig cerumen	73,4	1,3	S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	49,6	1,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	86,6	1,3
P76	Depressie	67,4	1,2	S03	Wratten	48,4	1,1	P74	Angststoornis/angsttoestand	80,1	1,1
S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	60,0	1,0	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	45,7	1,0	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	77,1	1,1
Totaal in top 10		16,4		Totaal in top 10		15,8		Totaal in top 10		17,1	

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Cijfers huisartsen - Voorgeschreven geneesmiddelen

Cijfers over geneesmiddelen die zijn voorgeschreven in de huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op codes uit het [Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatiesysteem](#) (ATC), die worden geregistreerd in de huisartsenpraktijk.

Kernpunten 2022

- Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2022 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,0%). Dit is iets hoger dan in 2021 (66,1%), maar nog steeds iets lager dan in 2019 (69,6%). Er was in 2022 ten opzichte van 2021 een toename van het aantal patiënten tot 18 jaar met een geneesmiddel. Voor de andere leeftijdsgroepen bleef het aantal patiënten met tenminste één voorschrift gelijk aan 2021.
- Het percentage patiënten dat minimaal één antibioticum kreeg voorgeschreven is ten opzichte van 2021 gestegen (van 13,9% in 2021 naar 16,0% in 2022), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (17,2%).
- Maagzuurremmers zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk: 15,0% van de ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk kreeg tenminste één keer dit geneesmiddel in 2022 voorgeschreven.
- Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk worden het meeste voorgeschreven in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder. Bij 0-17 jarigen staan geneesmiddelen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18-44 jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen.

Aantal patiënten met één of meer geneesmiddelvoorschriften

Twee derde van de bij de huisarts ingeschreven patiënten kreeg in 2022 één of meer geneesmiddelvoorschriften (67,0%). Het aantal patiënten met tenminste één geneesmiddelvoorschrift stijgt naarmate patiënten ouder worden (Tabel 16). Bijna de helft van de kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, ongeveer twee derde van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar en ruim 90% van de 65-plussers kregen minimaal één voorschrift van de huisarts in 2022. Dit percentage loopt in de alleroudste leeftijdsgroep, 85 jaar en ouder, op tot 96%.

In 2022 lag het percentage bij de huisarts ingeschreven patiënten dat één of meer voorschriften heeft gekregen iets hoger dan in 2021 (66,1%), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (69,6%). In 2022 steeg alleen het aantal patiënten onder 18 jaar met tenminste één voorschrift ten opzichte van 2021. Het voorschrijven in de andere groepen bleef gelijk.

Tabel 16 *Percentage patiënten met minimaal één voorschrift bij de huisarts per jaar, naar leeftijdsgroep, 2018-2022*

Percentage of patients with at least one drug prescription per year, 2018-2022

in %	2018	2019	2020*	2021*	2022
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 4 jaar	55,3	57,5	46,8	51,2	55,5
5 t/m 17 jaar	50,0	49,2	44,1	43,8	46,1
18 t/m 44 jaar	63,1	63,9	60,0	59,3	59,8
45 t/m 64 jaar	75,3	74,9	72,6	72,0	72,4
65 t/m 74 jaar	88,3	88,2	86,8	86,3	86,3
75 t/m 84 jaar	94,4	94,2	93,7	93,1	93,1
85 jaar en ouder	95,9	96,3	96,1	95,8	95,8
Totaal	69,2	69,6	66,3	66,1	67,0

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Voor antibiotica, benzodiazepines, maagmiddelen en cholesterolverlagers is apart berekend aan hoeveel van de ingeschreven patiënten deze voorgeschreven werden in 2018-2022 (Tabel 17 t/m 20). Na een daling in antibiotica voorschrijven van 17,2% patiënten met een voorschrift naar 14,3% in 2020 en 13,9% in 2021, was er een stijging in 2022 naar 16,0%.

Het percentage patiënten dat een benzodiazepine kreeg voorgeschreven neemt al jaren af. In 2022 was dit percentage ongeveer gelijk aan 2020 en 2021 (3,9%). Maagmiddelen, waaronder de maagzuurremmende middelen, worden zeer frequent voorgeschreven. Het totale percentage lag redelijk stabiel rond 16,0%, maar is sinds 2019 afgenomen tot 15,2% in 2022. Het percentage patiënten dat een cholesterolremmer kreeg voorgeschreven bleef in 2022 gelijk ten opzichte van voorgaande jaren.

Tabel 17 *Percentage patiënten met minimaal één voorschrift voor een antibioticum (ATC-code J01) per jaar bij de huisarts, naar leeftijdsgroep, 2018-2022*

Percentage of patients with at least one antibiotic (ATC-code J01) prescription in general practice, by age group, 2018-2022

in %	2018	2019	2020*	2021*	2022
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	11,8	12,0	8,1	8,7	11,8
18 t/m 44 jaar	14,4	14,6	12,2	11,8	13,4
45 t/m 64 jaar	17,7	17,2	14,9	14,2	15,8
65 t/m 74 jaar	23,9	23,4	19,7	19,0	21,2
75 jaar en ouder	32,8	31,9	28,0	26,1	28,3
Totaal	17,2	17,2	14,3	13,9	16,0

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 18 Percentage patiënten met minimaal één voorschrift van een benzodiazepine (ATC-code N05BA) per jaar bij de huisarts, naar leeftijdsgroep, 2018-2022

Percentage of patients with at least one benzodiazepine (ATC-code N05BA) prescription per year in general practice by age group, 2018-2022

in %	2018	2019	2020*	2021*	2022
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
18 t/m 44 jaar	3,2	3,2	2,8	2,8	2,8
45 t/m 64 jaar	6,1	5,9	5,6	5,4	5,3
65 t/m 74 jaar	7,7	7,4	7,1	6,8	6,7
75 jaar en ouder	9,4	9,0	8,8	8,4	8,2
Totaal	4,5	4,3	4,0	4,0	3,9

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 19 Percentage patiënten met minimaal één voorschrift van een maagmiddel (ATC-code A02) per jaar bij de huisarts, naar leeftijdsgroep, 2018-2022

Percentage of patients with at least one prescription for an acid related disorder (ATC-code A02) per year, by age group, 2018-2022

in %	2018	2019	2020*	2021*	2022
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
18 t/m 44 jaar	7,2	7,3	6,9	6,7	6,4
45 t/m 64 jaar	19,9	19,8	19,4	18,9	18,5
65 t/m 74 jaar	35,3	35,2	34,4	33,8	33,3
75 jaar en ouder	50,8	49,8	48,8	47,7	47,0
Totaal	16,1	16,1	15,7	15,5	15,2

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 20 Percentage patiënten met minimaal één voorschrift van een cholesterolverlager (ATC-code C10A) bij de huisarts per jaar, naar leeftijdsgroep, 2018-2022

Percentage of patients with at least one prescription of a cholesterol lowering drug (ATC-code C10A) per year, by age group, 2018-2022

in %	2018	2019	2020*	2021*	2022
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1
18 t/m 44 jaar	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7
45 t/m 64 jaar	14,1	13,8	13,3	13,1	13,3
65 t/m 74 jaar	37,2	36,5	35,2	34,4	34,6
75 jaar en ouder	42,5	41,7	40,5	40,4	41,0
Totaal	11,8	11,5	11,2	11,2	11,3

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd

De top-10 van geneesmiddelvoorschriften is gebaseerd op “niveau 3” van de [ATC-codering](#) (therapeutische/farmacologische subgroep).

In 2022 kreeg 15,0% van de patiënten ingeschreven in een huisartsenpraktijk een maagzuurremmer voorgeschreven (Tabel 21). Maagzuurremmers zijn daarmee het meest voorgeschreven middel in de huisartsenpraktijk. Ook in de jaren 2019-2021 waren maagzuurremmers één van de meest voorgeschreven middelen. Naast maagzuurremmers, staan ook NSAIDs (ontstekingsremmende pijnstillers) en cholesterolverlagers (antilipaemica) elk jaar in de top-5 van meest voorgeschreven geneesmiddelen (zie ook [Aantal patiënten met één of meer prescripties](#)).

Tabel 21 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Top-10 of drug prescriptions, 2022, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,0
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,3
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	10,5
B01A	Antithrombotica	9,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,3
A06A	Laxantia	8,5
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5
C07A	Beta-blokkers	8,0
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,5

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Per leeftijdsgroep is er wel verschil te zien in de meest voorgeschreven geneesmiddelen. Zo werden in 2022 aan kinderen naast antibiotica, regelmatig corticosteroiden en middelen bij allergie (antihistaminica) voorgeschreven. Bij jong volwassenen staan hormonale anticonceptiva op nummer 1 van meest voorgeschreven geneesmiddelen. Voor patiënten vanaf 45 jaar maakt deze plaats voor maagzuurremmende middelen en geneesmiddelen voor het hart- en vaatstelsel (Tabel 22).

Tabel 22 Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2022

Top-10 of drug prescriptions by age, 2022

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	13,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	18,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	46,6
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,3	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,0	B01A	Antithrombotica	46,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,3	B01A	Antithrombotica	26,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,1	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,9	C07A	Beta-blokkers	21,0	C07A	Beta-blokkers	33,6
D06A	Antibiotica, lokale	6,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8	C09A	Ace-remmers	16,3	A06A	Laxantia	24,5
D02A	Emollientia en protectiva	6,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,5	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,0	A06A	Laxantia	15,4	C09A	Ace-remmers	21,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,1	B01A	Antithrombotica	8,9	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	15,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	21,0
A06A	Laxantia	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	4,9	N06A	Antidepressiva	8,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,4	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	16,7
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	N06A	Antidepressiva	4,6	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	16,0
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	A06A	Laxantia	4,6	A06A	Laxantia	8,4	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	11,7	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	15,0

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Indicaties voor geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Om de cijfers over indicaties voor geneesmiddelen te berekenen zijn er 221 huisartsenpraktijken geselecteerd die voldoende diagnoses bij prescripties registreren. In totaal was bij 78% van de voorschriften uit die praktijken een diagnose geregistreerd.

Tabel 23 bevat informatie per leeftijdsgroep over de meest voorkomende gezondheidsproblemen waarvoor een geneesmiddel werd voorgeschreven in 2022. Voor patiënten in de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder staan geneesmiddelen voor hoge bloeddruk op nummer 1. Ook medicatie voor diabetes wordt aan veel patiënten in deze leeftijdsgroep voorgeschreven. Bij jongeren worden logischerwijs voor andere indicaties geneesmiddelen voorgeschreven. Bij 0-17 jarigen staan geneesmiddelen voor eczeem, impetigo en oorontsteking bovenaan, bij 18 tot 45 jarigen anticonceptie- en hooikoortsmiddelen. Door de jaren heen is de top 2 heel stabiel voor alle leeftijdsgroepen.

Tabel 23 Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2022

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2022

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,1
S84	Impetigo/impetiginisatie	3,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,3	T90	Diabetes mellitus	11,8	T90	Diabetes mellitus	15,3
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,7	R96	Astma	2,9	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	11,2
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,6	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	2,8	R96	Astma	4,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,4
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,2	S74	Dermatomycose(n)	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,7	R05	Hoesten	4,6	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,6
D12	Obstipatie	2,5	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,6	R05	Hoesten	3,6	R96	Astma	4,6	D12	Obstipatie	7,6
D05	Hoesten	1,8	R05	Hoesten	2,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,5	R95	Emfyseem/COPD	4,6	L95	Osteoporose	6,1
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	S87	Constitutioneel eczeem	1,9	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,4	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,3	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	5,7
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,5	P76	Depressie	2,8	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,1	R95	Emfyseem/COPD	5,5
R96	Astma	1,5	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	1,4	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	2,7	D02	Maagpijn	3,9	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	5,4

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Cijfers huisartsen - Verwijzingen naar de tweede lijn

De cijfers over verwijzingen naar de tweede lijn zijn gebaseerd op verwijsgegevens van huisartsenpraktijken die gebruik maken van [ZorgDomein](#) bij verwijzingen. De grootte van de onderzoekspopulatie wijkt daarom af van de andere analyses:

2018: 102 huisartsenpraktijken met 427.702 ingeschreven patiënten.
2019: 145 huisartsenpraktijken met 625.111 ingeschreven patiënten.
2020: 214 huisartsenpraktijken met 927.964 ingeschreven patiënten.
2021: 270 huisartsenpraktijken met 1.192.115 ingeschreven patiënten.
2022: 297 huisartsenpraktijken met 1.316.332 ingeschreven patiënten.

Meer informatie over de gehanteerde methoden is te lezen op de [website](#) van Nivel Zorgregistraties.

Kernpunten 2022

- In 2022 zijn er per 1.000 ingeschreven patiënten 338 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist. Dit is een toename van 3,4 % ten opzichte van 2021 (327) en ook hoger ten opzichte van 2019 (306).
- De grootste stijging in 2022 ten opzichte van 2021 is te zien in de leeftijdsgroep 0-17 jarigen (van 158 naar 172 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten).
- Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist. Dit verschil is met name zichtbaar in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar.
- De meeste verwijzingen vonden in 2022 plaats naar dermatologie, gevolgd door KNO-heelkunde, orthopedie, psychiatrie en oogheelkunde. Voor de meeste specialismen is het aantal verwijzingen hoger dan het voorgaande jaar.
- De stijging in aantal verwijzingen naar psychiatrie houdt sinds 2019 aan (20 per 1.000 ingeschreven patiënten) en zette in 2022 door naar 31 per 1.000 ingeschreven patiënten.

Aantal verwijzingen naar de tweede lijn

In 2022 zijn, per 1.000 ingeschreven patiënten, 338 verwijzingen uitgeschreven voor een medisch specialist (Tabel 24). Ten opzichte van 2021 is dit een gemiddelde toename van 3,4%. Er worden meer vrouwen dan mannen verwezen naar een medisch specialist, respectievelijk 386 en 293 per 1.000 ingeschreven patiënten. Dit jaar is een iets grotere stijging te zien voor mannen (+4,2%) dan voor vrouwen (+2,4%) in vergelijking tot 2021. Met name in de leeftijdsgroep van 18-64 jaar is het verschil tussen vrouwen en mannen zichtbaar, respectievelijk 395 en 261 per 1.000 ingeschreven patiënten. In 2022 is de grootste stijging in het aantal verwijzingen te zien in de leeftijdsgroep 0-17 jarige ten opzichte van 2021. Het aantal verwijzingen loopt op met de leeftijd, zowel bij mannen als vrouwen (Tabel 25).

Tabel 24 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist per 1.000 ingeschreven patiënten per jaar, 2018-2022

Number of referrals from general practice to medical specialists (per 1,000 registered patients) per year, 2018-2022

	2018	2019	2020*	2021*	2022
Geslacht:					
Mannen	265,6	265,8	215,3	281,4	293,3
Vrouwen	352,4	354,4	284,8	376,4	385,6
Leeftijdscategorie:					
0 t/m 17 jaar	150,0	146,5	115,8	157,8	171,7
18 t/m 64 jaar	297,3	302,4	247,5	321,2	327,8
65 t/m 74 jaar	461,3	470,2	362,4	469,7	484,9
75 jaar en ouder	550,2	546,7	428,1	561,3	571,2
Totaal	310,3	305,7	247,7	327,1	338,3

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. de COVID-19 pandemie.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 25 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist, naar geslacht en leeftijdsgroep (per 1.000 ingeschreven patiënten), 2022

Number of referrals from general practice to medical specialists by sex and age group (per 1,000 registered patients), 2022

	Mannen	Vrouwen
Leeftijdscategorie:		
0 t/m 17 jaar	170,8	172,7
18 t/m 64 jaar	260,9	394,8
65 t/m 74 jaar	460,7	508,6
75 jaar en ouder	578,0	565,7
Totaal	293,3	385,6

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Verwijzingen per specialisme

De meeste verwijzingen in 2022 zijn naar dermatologie, orthopedie, KNO-heelkunde, psychiatrie en oogheelkunde. De top-4, met uitzondering van psychiatrie, is de afgelopen jaren stabiel (Tabel 26). Voor deze specialismen is het aantal verwijzingen gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Tussen 2020 en 2021 was er een stijging in het aantal verwijzingen naar psychiatrie (van 20,6 per 1.000 ingeschreven patiënten naar 28,1) en dit hield ook in 2022 aan (30,4 per 1.000 ingeschreven patiënten).

Tabel 26 Aantal verwijzingen van de huisarts naar de medisch specialist (per 1.000 ingeschreven patiënten) per jaar, 2018-2022

Number of referrals from general practice to medical specialists per year (per 1,000 registered patients) , 2018-2022

Specialisme	2018	2019	2020*	2021*	2022
Dermatologie	32,4	31,3	23,8	32,8	34,2
Orthopedie	30,4	30,0	23,3	29,0	31,3
KNO-heelkunde	31,0	30,0	22,8	28,9	31,3
Psychiatrie	20,2	19,7	20,6	28,1	30,7
Oogheelkunde	32,4	31,1	23,1	30,3	30,4

Vervolg tabel 26

Specialisme	2018	2019	2020*	2021*	2022
Heelkunde	25,8	25,0	20,3	26,7	28,0
Neurologie	22,9	23,1	18,1	24,0	24,5
Gynaecologie/verloskunde	19,4	19,2	16,5	22,3	21,6
Cardiologie	15,3	15,7	13,5	17,3	17,3
Interne geneeskunde	14,3	14,3	10,9	14,0	13,9
Urologie	11,8	12,0	9,8	12,8	13,2
Plastische chirurgie	9,7	9,9	7,7	10,6	10,9
Maag-darm-leverziekten	9,4	9,7	8,6	10,9	10,4
Kindergeneeskunde	9,0	8,2	6,5	9,7	10,4
Longziekten	7,8	7,9	7,2	9,1	9,5
Reumatologie	5,2	5,1	4,1	5,2	5,2
Geriatric	3,0	2,8	2,1	3,2	3,5
Anaesthesiologie	2,6	2,5	1,9	2,6	2,8
Revalidatiegeneeskunde	2,6	2,4	2,1	2,7	2,7
Sportgeneeskunde	1,3	1,6	1,2	1,7	1,7
Mondziekten en kaakchirurgie	1,8	1,8	1,2	1,6	1,6
Multidisciplinaire en speciale poli	0,1	0,3	0,5	0,9	1,2
Allergologie	1,0	1,0	1,2	1,4	1,0
Klinische genetica	0,9	0,9	0,7	1,0	0,9
Medische psychologie	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Totaal	310,3	305,7	247,7	327,1	338,3

* In dit jaar kunnen de aantallen mogelijk afwijken van eerdere jaren i.v.m. COVID-19 pandemie.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Indicaties voor verwijzingen

In de tabellen 27 t/m 31 worden de top-5 indicaties weergegeven voor de vijf specialismen waarnaar in 2022 weer het meest verwezen is, namelijk dermatologie, orthopedie, KNO-heelkunde, psychiatrie en oogheelkunde. Omdat er niet altijd een indicatie wordt genoteerd, zijn de percentages van de verwijzingen met een bekende indicatie berekend. De top-5 indicaties zijn nauwelijks veranderd ten opzichte van 2021.

Tabel 27 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar dermatologie, 2022*

Top-5 indications (ICPC code) for referrals to dermatology, 2022

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
S99	Andere ziekte huid/subcutis	10,8
S82	Naevus/moedervlek	9,3
S77	Maligniteit huid/subcutis	8,2
S04	Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis	5,5
K95	Varices benen [ex. S97]	5,5
% in top 5:		39,2

* % van verwijzingen met bekende indicatie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 28 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar oogheelkunde, 2022*

Top-5 indications (ICPC code) for referrals to ophthalmology, 2022

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
F05	Andere visussymptomen/-klachten	24,6
F92	Cataract/Staar	16,0
F91	Refractie afwijking	7,6
F04	Mouches volantes/flitsen/flikkeringen	7,3
F13	Afwijkend gevoel aan oog	4,7
% in top 5:		60,1

* % van verwijzingen met bekende indicatie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 29 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar orthopedie, 2022*

Top-5 indications (ICPC code) for referrals to orthopaedics, 2022

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
L15	Knie symptomen/klachten	20,7
L08	Schouder symptomen/klachten	10,0
L90	Gonartrose	9,1
L17	Voet/teen symptomen/klachten	5,8
L89	Coxartrose	5,5
% in top 5:		51,1

* % van verwijzingen met bekende indicatie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 30 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar KNO-heelkunde, 2022*

Top-5 indications (ICPC code) for referrals to ENT-surgery, 2022

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
H02	Gehoorklachten	9,5
R21	Symptomen/klachten keel	5,9
H03	Oorsuizen/tinnitus	4,7
H86	Doofheid/slechthorendheid	4,7
R06	Epistaxis/neusbloeding	4,7
% in top 5:		29,5

* % van verwijzingen met bekende indicatie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Tabel 31 Top-5 indicaties (ICPC code) voor verwijzingen naar Psychiatrie, 2022*

Top-5 indications (ICPC code) for referrals to psychiatry, 2022

ICPC	Diagnose	% verwijzingen
P76	Depressie	11,0
P74	Angststoornis/angsttoestand	9,7
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	7,9
P03	Down/depressief gevoel	7,3
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	6,9
% in top 5:		42,7

* % van verwijzingen met bekende indicatie

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bijlage bij Jaarrapport 2022: Zorg door de huisarts

“Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022”

Bijlage A Patiëntkenmerken	39
Bijlage B Omvang Zorggebruik	40
B.1 Contacten huisartsenpraktijk	40
B.2 Type contacten met de huisarts	42
B.3 Type contacten met de praktijkondersteuner GGZ	44
B.4 Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen	46
Bijlage C Gezondheidsproblemen	52
Bijlage D Prescripties	57
D.1 Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd	57
D.2 Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd	64
Bijlage E Morbiditeitscijfers	69

Patiëntkenmerken

Demografische kenmerken van ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk in 2018-2022

Demographic features of registered patients in general practice in 2018-2022

in %	2018	2019	2020	2021	2022
Geslacht					
Man	49,5	49,5	49,4	49,4	49,6
Vrouw	50,5	50,5	50,6	50,6	50,4
Leeftijdscategorie					
0 t/m 4 jaar	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7
5 t/m 17 jaar	15,0	14,5	14,4	14,1	13,9
18 t/m 44 jaar	32,7	33,3	33,3	33,6	33,6
45 t/m 64 jaar	29,1	28,2	28,0	27,6	27,4
65 t/m 74 jaar	11,1	11	11,3	11,2	11,2
75 t/m 84 jaar	5,9	6	6,1	6,5	7,0
85 jaar en ouder	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3
Gemiddelde leeftijd	41,6	41,7	41,9	42,0	42,3

Omvang Zorggebruik

Contacten huisartsenpraktijk

Aantal contacten **met de huisartsenpraktijk** per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2018

Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2018

	0-4 Jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 Jaar	75-84 Jaar	85+ jaar	Totaal
Huisarts	3.367,6	2.247,9	3.251,1	4.058,0	5.541,6	8.088,4	11.982,4	4.067,0
Ketenzorg*	1,8	14,6	82,9	628,7	1.351,0	1.651,4	1.605,4	487,5
M&I verrichting	8,3	29,0	97,1	185,3	319,0	501,8	992,1	173,8
POH-GGZ	3,0	43,4	195,8	174,6	101,9	105,3	104,4	141,8
ANW-consulten	12,0	3,5	4,3	3,6	3,8	6,7	9,3	4,1
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,3	0,7	3,8	16,5	0,7
Keuringen	-	-	0,1	0,1	0,7	5,5	2,3	0,5
Stoppen met roken	-	-	2,7	4,0	2,1	0,6	0,1	2,4
Totaal	3.392,8	2.338,4	3.634,0	5.054,5	7.320,8	10.363,5	14.712,5	4.877,8

* Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Aantal contacten **met de huisartsenpraktijk** per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019

Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2019

	0-4 Jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 Jaar	75-84 Jaar	85+ jaar	Totaal
Huisarts	3.334,8	2.244,7	3.342,2	4.155,9	5.681,9	8.126,0	12.182,2	4.138,2
Ketenzorg*	1,1	15,0	90,0	688,8	1.459,4	1.772,5	1.746,6	522,0
M&I verrichting	9,8	29,3	102,1	198,0	336,0	525,4	1.059,7	185,8
POH-GGZ	2,3	48,8	213,0	186,5	111,8	109,5	110,4	150,3
ANW-consulten	9,7	2,5	2,9	1,9	1,8	3,0	6,1	2,5
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	1,2	3,5	16,1	0,9
Keuringen	-	-	<00	0,1	0,3	2,1	0,9	0,2
Stoppen met roken	-	-	2,7	3,8	2,3	0,7	0,1	2,2
Totaal	3.357,7	2.340,4	3.753,0	5.235,6	7.594,7	10.542,6	15.122,0	5.002,2

* Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Aantal contacten **met de huisartsenpraktijk** per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2020

Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2020

	0-4 Jaar	5-17 Jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 Jaar	85+ jaar	Totaal
Huisarts	2 691,0	1 956,6	3 288,9	4 054,9	5 442,1	8 003,5	12 274,2	3 992,1
Ketenzorg*	0,3	11,9	91,1	706,6	1 507,7	1 851,4	1 829,7	541,7
M&I verrichting	11,5	22,1	85,5	161,1	290,2	501,0	1 109,8	165,5
POH-GGZ	3,2	52,7	234,8	198,3	121,4	128,7	141,4	163,3
ANW-consulten	3,0	1,1	1,3	1,3	1,3	2,2	5,6	1,4
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	0,8	2,4	7,6	0,6
Keuringen	-	-	0,0	0,0	0,2	1,3	0,8	0,2
Stoppen met roken	-	-	4,0	5,2	2,6	0,9	0,0	3,0
Totaal	2.709,0	2.044,4	3.705,8	5.127,8	7.366,3	10.491,4	15.369,2	4.867,7

* Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

Aantal contacten **met de huisartsenpraktijk** per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2021

Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2021

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85+ jaar	Totaal
Huisarts	3.400,6	2.006,5	3.440,7	4.272,9	5.686,6	8.000,8	12.532,9	4.207,8
Ketenzorg*	0,5	9,0	78,1	614,0	1.329,2	1.630,1	1.656,3	483,4
M&I verrichting	12,8	23,9	95,2	187,8	339,3	547,2	1.158,1	187,1
POH-GGZ	2,9	66,4	252,1	199,8	117,1	120,1	116,0	172,3
ANW-consulten	1,4	0,4	0,5	0,5	0,8	1,4	3,1	0,7
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,6	0,7	2,6	7,6	0,6
Keuringen	-	-	0,2	0,3	0,3	1,3	0,6	0,3
Stoppen met roken	-	-	3,1	4,1	2,4	0,9	0,0	2,5
Totaal	3.418,2	2.106,2	3.870,0	5.280,0	7.476,4	10.304,4	15.474,6	5.054,7

* Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Aantal contacten **met de huisartsenpraktijk** per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022

Number of consultations in general practice by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2022

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85+ jaar	Totaal
Huisarts	3642,0	2236,4	3470,3	4166,3	5619,5	7844,3	12296,8	4226,2
Ketenzorg*	0,4	6,7	72,7	584,6	1285,8	1592,8	1617,6	467,1
M&I verrichting	11,3	26,8	96,1	184,2	327,9	520,1	1127,2	183,7
POH-GGZ	3,1	64,9	244,9	191,8	123,3	117,4	112,2	168,8
ANW-consulten	1,0	0,4	0,5	0,5	0,7	1,0	2,5	0,6
Eerstelijns verblijf	-	-	0,1	0,5	0,8	2,8	13,1	0,7
Keuringen	-	-	0,2	0,2	0,4	1,9	0,6	0,3
Stoppen met roken	-	-	2,5	3,5	2,4	0,8	0,2	2,1
Totaal	3657,9	2335,3	3887,4	5131,6	7360,7	10081,0	15170,3	5049,6

* Schatting op basis van het aantal patiënten in ketenzorg voor Diabetes mellitus, Cardiovasculair Risico Management, COPD en Astma. Voor de overige cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Type contacten met de huisarts

Aantal contacten **met de huisarts** per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019*

Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2019

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min	787,2	519,4	977,5	1.159,1	1.602,4	2.433,8	4.318,7	1.177,7
Consult 5-20 min	2.300,9	1.490,4	1.835,3	2.234,4	2.950,8	3.752,2	3.864,0	2.195,6
Consult 20 min en langer	240,7	231,3	511,3	708,5	913,4	1.153,2	1.027,3	604,5
Visite kort	4,3	1,7	9,2	24,0	102,6	409,3	1.649,7	83,7
Visite lang	1,3	1,3	6,9	27,7	110,4	375,4	1.320,5	75,0
Vaccinatie	0,4	0,6	2,1	2,2	2,2	2,0	1,9	1,8
Totaal	3.334,8	2.244,7	3.342,2	4.155,9	5.681,9	8.126,0	12.182,2	4.138,2

*Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

*Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2020**

Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2020

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min	861,1	588,6	1.125,7	1.349,7	1.812,3	2.701,9	4.562,7	1.341,1
Consult 5-20 min	1.583,8	1.151,8	1.676,2	2.014,7	2.628,5	3.571,3	4.362,8	1.962,7
Consult 20 min en langer	241,4	213,7	474,3	647,6	836,0	1.112,5	1.093,8	563,6
Visite kort	3,0	1,2	5,7	17,6	72,0	290,1	1.154,8	59,5
Visite lang	1,7	1,1	5,7	23,6	91,3	325,7	1.099,1	63,9
Vaccinatie	0,1	0,2	1,3	1,7	1,9	2,0	1,1	1,2
Totaal	2.691,0	1.956,6	3.288,9	4.054,9	5.442,1	8.003,5	12.274,2	3.992,1

*Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

*Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2021**

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1.008,9	566,3	1.132,9	1.381,7	1.826,7	2.568,5	4.485,9	1.358,9
Consult 5-20 min.	1.994,8	1.207,3	1.797,4	2.160,8	2.800,2	3.664,7	4.587,8	2.114,5
Consult 20 min. en langer	391,6	230,4	498,1	688,4	888,9	1.146,9	1.137,3	606,0
Visite kort	2,8	1,2	5,4	16,3	71,9	278,5	1.118,7	58,1
Visite lang	2,5	1,1	6,1	24,7	98,0	341,3	1.202,6	69,5
Vaccinatie	<0,1	0,1	0,9	0,9	0,8	0,9	0,6	0,7
Totaal	3.400,6	2.006,5	3.440,7	4.272,9	5.686,6	8.000,8	12.532,9	4.207,8

Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2021

*Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

Aantal contacten met de huisarts per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022*

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	1.002,1	581,9	1.081,9	1.245,8	1.678,9	2.381,0	4.154,5	1.276,8
Consult 5-20 min.	2.286,9	1.402,7	1.892,6	2.214,4	2.908,0	3.763,3	4.714,0	2.231,5
Consult 20 min. en langer	348,8	249,5	485,0	668,5	874,7	1.125,6	1.174,5	596,0
Visite kort	2,7	1,2	5,0	15,4	66,1	255,8	1.062,4	54,8
Visite lang	1,5	1,0	5,0	21,5	91,1	317,7	1.190,6	66,4
Vaccinatie	<0,1	0,1	0,9	0,7	0,6	1,0	0,7	0,7
Totaal	3.642,0	2.236,4	3.470,3	4.166,3	5.619,5	7.844,3	12.296,8	4.226,2

Number of consultations with the general practitioner by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2022

*Voor deze cijfers worden de verrichtingen conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

Type contacten met de praktijkondersteuner GGZ

Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2019*

Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2019

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min	0,4	4,5	15,8	10,5	7,1	9,5	12,4	10,4
Consult 5-20 min	0,3	4,2	16,3	12,0	6,6	7,9	10,1	10,8
Consult 20 min en langer	1,5	39,8	179,2	160,2	89,8	70,2	36,3	124,0
Groepsconsult	<0,1	<0,1	1,0	1,3	1,1	0,5	0,4	0,9
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,6	2,0	0,2
Visite lang	0,1	0,3	0,7	2,3	6,9	20,9	49,3	4,1
Totaal	2,3	48,8	213	186,5	111,8	109,5	110,4	150,3

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

*Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2020**

Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2020

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 minuten	0,5	6,0	21,4	15,1	9,2	10,8	13,9	13,8
Consult 5-20 minuten	0,5	7,0	29,0	22,0	14,0	16,4	23,5	19,6
Consult 20 minuten en langer	2,1	39,5	183,0	158,8	91,6	80,7	53,3	125,6
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,5	0,4	0,8	0,5	0,5	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,7	1,8	0,1
Visite lang	<0,1	0,2	0,8	1,9	5,7	19,7	48,3	3,8
Totaal	3,2	52,7	234,8	198,3	121,4	128,7	141,4	163,3

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

*Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2021**

Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2021

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,7	7,4	21,8	13,8	7,3	8,4	10,0	13,7
Consult 5-20 min.	0,7	9,0	28,8	19,5	10,4	11,8	14,2	18,5
Consult 20 min. en langer	1,6	49,8	200,5	164,0	92,7	79,0	43,3	135,7
Groepsconsult	<0,1	<0,1	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,4	1,0	0,1
Visite lang	<0,1	0,1	0,7	2,1	6,0	20,1	47,1	3,9
Totaal	2,9	66,4	252,1	199,8	117,1	120,1	116,0	172,3

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

*Aantal contacten met de praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten naar type contact en leeftijdsgroep, 2022**

Number of consultations with the practice nurse mental health by type of consultation and age group per 1,000 registered patients, 2022

	0-4 jaar	5-17 jaar	18-44 jaar	45-64 jaar	65-74 jaar	75-84 jaar	85 jaar en ouder	Totaal
Consult < 5 min.	0,4	6,3	19,4	11,8	7,1	7,4	8,8	12,2
Consult 5-20 min.	0,9	9,6	28,1	18,6	11,3	12,4	13,9	18,5
Consult 20 min. en langer	1,7	48,7	196,4	159,1	97,7	78,1	42,5	133,8
Groepsconsult	<0,1	0,1	0,5	0,4	0,7	0,3	0,2	0,4
Visite kort	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,4	1,3	0,1
Visite lang	<0,1	0,1	0,5	1,8	6,4	18,9	45,7	3,7
Totaal	3,1	64,9	244,9	191,8	123,3	117,4	112,2	168,8

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten conform de [tarievenlijst huisartsenzorg](#) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Per 1 januari 2019 zijn de declaratiecodes in de huisartszorg drastisch veranderd. Waar in het verleden bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt tussen consulten op de praktijk, telefonische consulten en emailconsulten, wordt vanaf 2019 een consult op tijd gedeclareerd. Daarom worden er geen trends over de periode 2017-2018 weergegeven voor het type contacten met de huisarts of de POH-GGZ.

Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2018, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Number and percentage declared M&I services by sex per 1,000 registered patients, 2018, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Chirurgie	29,5	20,8	34,4	16,7	31,9	18,4
Intensieve zorg, dag	22,3	15,7	30,4	14,8	26,4	15,2
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,6	9,6	23,8	11,6	18,7	10,8
Longfunctiemeting (= spirometrie)	13,8	9,8	17,6	8,6	15,8	9,1
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	14,5	10,2	16,7	8,1	15,6	9,0
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	13,2	9,3	14,4	7,0	13,8	7,9
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen	-	-	15,0	7,3	-7,6	4,4
etnogestrel implantatiestaafje	-	-	15,0	7,3	-7,6	4,4
Diagnostiek met behulp van Doppler	5,0	3,5	5,3	2,6	5,2	3,0

- tabel gaat verder op de volgende pagina -

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
Uitstrijkje	-	-	9,8	4,8	4,9	2,8
Polyfarmacie	4,1	2,9	5,8	2,8	4,9	2,8
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	2,1	1,5	5,6	2,7	3,9	2,2
Cognitieve functietest (MMSE)	2,4	1,7	3,9	1,9	3,2	1,8
Diabetes begeleiding per jaar	3,2	2,3	3,0	1,5	3,1	1,8
Diabetes – instellen op insuline	2,8	2,0	2,7	1,3	2,7	1,6
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,5	1,8	2,6	1,3	2,5	1,5
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	2,4	1,7	2,0	1,0	2,2	1,3
Spleetlamponderzoek	1,8	1,2	2,0	1,0	1,9	1,1
Teledermatologie	1,4	1,0	1,8	0,9	1,6	0,9
Module Abdominale echografie	0,7	0,5	2,1	1,0	1,4	0,8
Hartritmestoornissen	0,9	0,6	1,7	0,8	1,3	0,7
Intensieve zorg, ANW	1,3	0,9	1,3	0,6	1,3	0,7
Audiometrie	0,9	0,6	0,9	0,4	0,9	0,5
Tympanometrie	0,6	0,4	0,7	0,3	0,7	0,4
Oogboring	0,9	0,6	<0,1	<0,1	0,5	0,3
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
MRSA-screening	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3
Euthanasie	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
Reizigersadvisering	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Palliatieve consultatie, visite	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	141,9	100,0	205,2	100,0	173,8	100,0

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2019, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Number and percentage declared M&I services by sex per 1,000 registered patients, 2019, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Chirurgie	29,8	19,6	35,1	16,0	32,5	17,5
Intensieve zorg, dag	26,2	17,2	36,0	16,4	31,1	16,7
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,8	9,1	24,7	11,3	19,3	10,4
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	16,7	11,0	19,0	8,7	17,9	9,6
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	15,5	10,2	18,0	8,2	16,7	9,0
Longfunctiemeting (= spirometrie)	13,6	8,9	17,2	7,9	15,4	8,3
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	15,7	7,1	7,9	4,3
Diagnostiek met behulp van Doppler	5,1	3,3	5,1	2,3	5,1	2,7
Uitstrijkje	-	-	9,7	4,4	4,9	2,7
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	4,8	3,1	4,8	2,2	4,8	2,6
Polyfarmacie	3,4	2,3	5,0	2,3	4,2	2,3
Cognitieve functietest (MMSE)	2,6	1,7	4,0	1,8	3,3	1,8
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	1,7	1,1	4,6	2,1	3,2	1,7
Diabetes begeleiding per jaar	2,9	1,9	2,5	1,2	2,7	1,5
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,3	1,5	2,6	1,2	2,5	1,3
Spleetlamponderzoek	2,1	1,4	2,3	1,1	2,2	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,0	1,3	1,9	0,9	1,9	1,0
Module Abdominale echografie	1,0	0,6	2,6	1,2	1,8	1,0
Teledermatologie	1,4	0,9	1,9	0,9	1,7	0,9
Intensieve zorg, ANW	1,5	1,0	1,4	0,6	1,4	0,8
Hartritmestoornissen	0,9	0,6	1,8	0,8	1,3	0,7
Audiometrie	0,9	0,6	0,9	0,4	0,9	0,5
Oogboring	1,1	0,7	<0,1	<0,1	0,6	0,3
Tympanometrie	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,3
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Reizigersadvisering	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
MRSA-screening	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2
Euthanasie	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Palliatieve consultatie, visite	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	151,8	100,0	219,5	100,0	185,8	100,0

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2020, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Number and percentage declared M&I services by sex per 1,000 registered patients, 2020, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	34,9	25,5	47,2	24,4	41,1	24,8
Chirurgie	25,4	18,5	27,9	14,4	26,6	16,1
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,9	10,1	23,5	12,1	18,7	11,3
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	14,7	10,7	17,1	8,8	15,9	9,6
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	12,6	9,2	14,3	7,4	13,5	8,1
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	15,7	8,1	7,9	4,8
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	4,8	3,5	5,1	2,6	5,0	3,0
Longfunctiemeting (= spirometrie)	4,0	2,9	5,1	2,6	4,6	2,8
Polyfarmacie	3,0	2,2	4,4	2,3	3,7	2,2
Diagnostiek met behulp van Doppler	3,3	2,4	3,4	1,8	3,4	2,0
Cognitieve functietest (MMSE)	2,2	1,6	3,4	1,8	2,8	1,7
Uitstrijkje	-	-	4,8	2,5	2,5	1,5
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	1,3	0,9	3,6	1,8	2,4	1,5
Module Abdominale echografie	1,4	1,0	2,9	1,5	2,2	1,3
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	2,1	1,5	1,9	1,0	2,0	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,1	1,6	2,0	1,0	2,0	1,2
Teledermatologie	1,7	1,2	2,1	1,1	1,9	1,1
Diabetes begeleiding per jaar	2,0	1,4	1,7	0,9	1,9	1,1
Spleetlamponderzoek	1,6	1,1	1,7	0,9	1,6	1,0
Intensieve zorg, ANW	1,6	1,2	1,5	0,8	1,5	0,9
Hartritmestoornissen	1,0	0,7	1,9	1,0	1,4	0,9
Audiometrie	0,5	0,4	0,6	0,3	0,6	0,3
Oogboring	1,1	0,8	<0,1	<0,1	0,6	0,3
Tympanometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,3
Euthanasie	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
MRSA-screening	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Reizigersadvisering	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Totaal	137,0	100,0	193,6	100,0	165,5	100,0

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Number and percentage declared M&I services by sex per 1,000 registered patients, 2021, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	35,4	22,8	46,3	21,1	40,8	21,8
Chirurgie	28,8	18,6	32,9	15,1	30,9	16,5
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	19,5	12,6	22,0	10,0	20,7	11,1
Therapeutische injectie (Cyriax)	14,1	9,1	23,9	10,9	19,1	10,2
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	15,3	9,9	17,6	8,0	16,5	8,8
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	16,3	7,4	8,2	4,4
Diabetes begeleiding per jaar	6,1	3,9	5,2	2,4	5,6	3,0
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	5,4	3,5	5,5	2,5	5,4	2,9
Uitstrijkje	-	-	9,5	4,3	4,8	2,6
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,3	2,7	4,4	2,0	4,3	2,3
Polyfarmacie	3,2	2,1	4,8	2,2	4,0	2,1
Cognitieve functietest (MMSE)	2,6	1,7	4,3	2,0	3,5	1,9
Longfunctiemeting (= spirometrie)	3,0	2,0	3,8	1,7	3,4	1,8
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	1,8	1,2	4,7	2,2	3,3	1,7
Diabetes – instellen op insuline	2,6	1,6	2,2	1,0	2,4	1,3
Module Abdominale echografie	1,2	0,8	3,2	1,5	2,2	1,2
Teledermatologie	1,8	1,2	2,3	1,1	2,1	1,1
Hartritmestoornissen	1,4	0,9	2,4	1,1	1,9	1,0
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,9	1,3	1,7	0,8	1,8	1,0
Spleetlamponderzoek	1,6	1,0	1,7	0,8	1,6	0,9
Intensieve zorg, ANW	1,4	0,9	1,3	0,6	1,4	0,7
Audiometrie	0,6	0,4	0,6	0,3	0,6	0,3
Oogboring	1,0	0,6	<0,1	<0,1	0,5	0,3
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,3
Tympanometrie	0,3	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Euthanasie	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
Besnijdenis	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Reizigersadvisering	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Totaal	155	100,0	218.9	100,0	187.1	100,0

Aantal en percentage gedeclareerde M&I-verrichtingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar geslacht, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Number and percentage declared M&I services by sex per 1,000 registered patients, 2022, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

	Man	%	Vrouw	%	Totaal	%
M&I verrichting						
Intensieve zorg, dag	29,2	18,9	39,7	18,6	34,5	18,8
Chirurgie	29,1	18,9	33,6	15,8	31,4	17,1
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting	19,9	12,9	22,5	10,6	21,2	11,6
Therapeutische injectie (Cyriax)	13,5	8,8	23,1	10,8	18,3	10
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)	15	9,8	16,7	7,8	15,9	8,6
Longfunctiemeting (= spirometrie)	8,5	5,5	10,7	5	9,6	5,2
IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje	-	-	14,1	6,6	7,1	3,9
Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis	4,3	2,8	6,6	3,1	5,4	3
Diagnostiek met behulp van Doppler	4,6	3	4,7	2,2	4,7	2,6
Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang	4,6	3	4,4	2,1	4,5	2,5
Diabetes begeleiding per jaar	4,9	3,2	4	1,9	4,5	2,4
Polyfarmacie	3,1	2	4,6	2,1	3,8	2,1
Uitstrijkje	-	-	6,9	3,2	3,5	1,9
Cognitieve functietest (MMSE)	2,9	1,9	4,3	2	3,6	1,9
Hartritmestoornissen	1,5	1	2,8	1,3	2,2	1,2
Diabetes – instellen op insuline	2,3	1,5	2	1	2,2	1,2
Teledermatologie	1,7	1,1	2,3	1,1	2	1,1
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris	1,9	1,2	2,1	1	2	1,1
Module Abdominale echografie	1,2	0,8	3	1,4	2,1	1,1
Spleetlamponderzoek	1,2	0,8	1,3	0,6	1,3	0,7
Intensieve zorg, ANW	1,1	0,7	0,9	0,4	1	0,5
Audiometrie	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3
Oogboring	0,9	0,6	<0,1	<0,1	0,5	0,3
Tympanometrie	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,2
COPD-gestructureerde zorg per jaar	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
Palliatieve consultatie, telefonisch	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2
Euthanasie	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2
MRSA-screening	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Palliatieve consultatie, visite	0,2	0,1	0,2	<0,1	0,2	0,1
Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chirurgie in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Varices sclerosering in geval van cosmetiek	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Reizigersadvisering	0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Sterilisatie man	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Besnijden	<0,1	<0,1	-	-	<0,1	<0,1
Totaal	153,9	100	213,1	100	183,7	100

Gezondheidsproblemen

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met **de huisarts of praktijkondersteuner GGZ** per 1.000 ingeschreven patiënten, 2018*, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1,000 registered patients, 2018, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	157	2,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	125	2,9	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	251	3,7
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	147	2,6	T90	Diabetes mellitus	102	2,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	189	2,8
T90	Diabetes mellitus	103	1,8	R05	Hoesten	81	1,9	A04	Moeheid/zwakte	124	1,8
R05	Hoesten	97	1,7	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	79	1,8	R05	Hoesten	113	1,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	91	1,6	H81	Overmatig cerumen	75	1,7	T90	Diabetes mellitus	104	1,5
A04	Moeheid/zwakte	90	1,6	S03	Wratten	56	1,3	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	103	1,5
H81	Overmatig cerumen	71	1,3	A04	Moeheid/zwakte	55	1,3	P76	Depressie	94	1,4
P76	Depressie	70	1,3	S74	Dermatomyose(n)	50	1,1	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	73	1,1
S03	Wratten	64	1,1	P76	Depressie	46	1,1	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	73	1,1
R96	Astma	56	1,0	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	45	1,0	S03	Wratten	72	1,0
Totaal in top 10			16,9	Totaal in top 10			16,4	Totaal in top 10			17,5

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met **de huisarts of praktijkondersteuner GGZ** per 1.000 ingeschreven patiënten, 2019*, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1,000 registered patients, 2019, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	161	2,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	127	2,9	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	253	3,7
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	149	2,6	T90	Diabetes mellitus	103	2,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	194	2,8
T90	Diabetes mellitus	103	1,8	R05	Hoesten	79	1,8	A04	Moeheid/zwakte	122	1,8
R05	Hoesten	95	1,7	H81	Overmatig cerumen	77	1,8	R05	Hoesten	110	1,6
A04	Moeheid/zwakte	89	1,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	74	1,7	T90	Diabetes mellitus	103	1,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	86	1,5	A04	Moeheid/zwakte	55	1,3	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	97	1,4
H81	Overmatig cerumen	74	1,3	S03	Wratten	55	1,3	P76	Depressie	93	1,4
P76	Depressie	70	1,2	S74	Dermatomycose(n)	47	1,1	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	76	1,1
S03	Wratten	63	1,1	L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	46	1,1	P74	Angststoornis/angsttoestand	70	1,0
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	56	1,0	P76	Depressie	46	1,0	S03	Wratten	70	1,0
Totaal in top 10			16,7	Totaal in top 10			16,2	Totaal in top 10			17,3

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten, 2020, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid*

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1,000 registered patients, 2020, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	150	2,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	112	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	253	3,9
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	141	2,6	T90	Diabetes mellitus	101	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	170	2,6
T90	Diabetes mellitus	101	1,9	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	74	1,8	A04	Moeheid/zwakte	104	1,6
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	88	1,6	H81	Overmatig cerumen	67	1,6	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	102	1,6
A04	Moeheid/zwakte	76	1,4	R05	Hoesten	64	1,5	T90	Diabetes mellitus	100	1,5
R05	Hoesten	75	1,4	A04	Moeheid/zwakte	47	1,1	P76	Depressie	95	1,5
P76	Depressie	71	1,3	P76	Depressie	46	1,1	R05	Hoesten	85	1,3
H81	Overmatig cerumen	63	1,2	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	45	1,1	P74	Angststoornis/angsttoestand	78	1,2
P74	Angststoornis/angsttoestand	57	1,1	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	42	1,0	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	71	1,1
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	52	1,0	S74	Dermatomyose(n)	41	1,0	R96	Astma	60	0,9
Totaal in top 10			16,3	Totaal in top 10			15,3	Totaal in top 10			17,2

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid*

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1,000 registered patients, 2021, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	148	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	118	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	251	3,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	147	2,6	T90	Diabetes mellitus	107	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	176	2,5
T90	Diabetes mellitus	106	1,9	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	82	1,9	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	112	1,6
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	97	1,7	H81	Overmatig cerumen	75	1,7	A04	Moeheid/zwakte	109	1,6
A04	Moeheid/zwakte	80	1,4	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	54	1,2	T90	Diabetes mellitus	104	1,5
P76	Depressie	71	1,3	R05	Hoesten	54	1,2	P76	Depressie	95	1,4
H81	Overmatig cerumen	71	1,3	A04	Moeheid/zwakte	50	1,1	P74	Angststoornis/angsttoestand	81	1,2
R05	Hoesten	62	1,1	P76	Depressie	47	1,1	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	79	1,1
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	61	1,1	S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	45	1,0	R05	Hoesten	70	1,0
P74	Angststoornis/angsttoestand	58	1,0	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	45	1,0	H81	Overmatig cerumen	67	1,0
Totaal in top 10			15,9	Totaal in top 10			15,4	Totaal in top 10			16,6

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1.000 ingeschreven patiënten, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid*

Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1,000 registered patients, 2022, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

Totaal				Mannen				Vrouwen			
ICPC	Diagnose	Aantal /1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%	ICPC	Diagnose	Aantal/ 1.000	%
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	149	2,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	110	2,5	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	250	3,6
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	137	2,4	T90	Diabetes mellitus	108	2,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	163	2,3
T90	Diabetes mellitus	106	1,9	H81	Overmatig cerumen	78	1,7	A04	Moeheid/zwakte	118	1,7
R05	Hoesten	92	1,6	R05	Hoesten	77	1,7	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	111	1,6
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	89	1,5	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	68	1,5	R05	Hoesten	107	1,5
A04	Moeheid/zwakte	87	1,5	R83	Andere infectie(s) luchtwegen	66	1,5	T90	Diabetes mellitus	103	1,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	77	1,4	A04	Moeheid/zwakte	56	1,3	P76	Depressie	89	1,3
H81	Overmatig cerumen	73	1,3	S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	50	1,1	R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	87	1,3
P76	Depressie	67	1,2	S03	Wratten	48	1,1	P74	Angststoornis/angsttoestand	80	1,1
S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	60	1,0	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	46	1,0	D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	77	1,1
Totaal in top 10			16,4	Totaal in top 10			15,8	Totaal in top 10			17,1

* Bij minder dan 2% van de consulten was de diagnose onbekend.

© Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Prescripties

Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2018, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Top-10 of drug prescriptions, 2018, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	16,1
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	12,9
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,4
B01A	Antithrombotica	10,0
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,8
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,1
C07A	Beta-blokkers	8,7
A06A	Laxantia	8,6
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,1

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2019, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Top-10 of drug prescriptions, 2019, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,8
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	12,1
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,5
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,2
B01A	Antithrombotica	9,9
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,1
C07A	Beta-blokkers	8,5
A06A	Laxantia	8,5
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,9

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2020, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Top-10 of drug prescriptions, 2020, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,4
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	10,7
B01A	Antithrombotica	9,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,5
A06A	Laxantia	8,2
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,2
C07A	Beta-blokkers	8,2
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,7

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2021, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Top-10 of drug prescriptions, 2021, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,2
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,2
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	10,4
B01A	Antithrombotica	9,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
A06A	Laxantia	8,5
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3
C07A	Beta-blokkers	8,1
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,9
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,6

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften, 2022, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

Top-10 of drug prescriptions, 2022, standardized to the Netherlands on age, sex and urbanization

ATC	Omschrijving	% patiënten
A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	15,0
C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	11,3
M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	10,5
B01A	Antithrombotica	9,9
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,3
A06A	Laxantia	8,5
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,5
C07A	Beta-blokkers	8,0
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,5

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2018

Top-10 of drug prescriptions by age , 2018

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,1	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	17,0	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	37,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	50,8
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,3	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	12,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	18,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	35,1	B01A	Antithrombotica	49,3
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,9	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	14,2	B01A	Antithrombotica	28,4	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	43,3
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	7,1	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	9,1	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,5	C07A	Beta-blokkers	23,9	C07A	Beta-blokkers	37,2
D02A	Emollientia en protectiva	6,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,5	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,4	C09A	Ace-remmers	17,1	A06A	Laxantia	25,4
D06A	Antibiotica, lokale	6,4	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	16,6	C09A	Ace-remmers	22,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	6,0	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,2	B01A	Antithrombotica	9,2	A06A	Laxantia	15,1	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	21,6
A06A	Laxantia	4,2	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,1	C07A	Beta-blokkers	9,1	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	14,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	20,3
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	4,0	A06A	Laxantia	4,9	N06A	Antidepressiva	8,8	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	14,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,8
D01A	Antimycotica, lokale	4,0	D01A	Antimycotica, lokale	4,8	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,9

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2019

Top-10 of drug prescriptions by age , 2019

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,2	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	16,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,5	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	36,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	49,3
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,2	M01A	Niet-steroidale anti-inflammatoire en antireumatische midd.	11,8	M01A	Niet-steroidale anti-inflammatoire en antireumatische midd.	17,7	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	34,8	B01A	Antithrombotica	48,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,3	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,8	B01A	Antithrombotica	28,1	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41,7
D02A	Emollientia en protectiva	6,8	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,7	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	10,5	C07A	Beta-blokkers	23,2	C07A	Beta-blokkers	35,9
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,3	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	10,4	C09A	Ace-remmers	17,4	A06A	Laxantia	25,1
D06A	Antibiotica, lokale	6,4	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,4	M01A	Niet-steroidale anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,8	C09A	Ace-remmers	22,2
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	7,0	B01A	Antithrombotica	9,0	A06A	Laxantia	15,3	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	21,0
A06A	Laxantia	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,0	N06A	Antidepressiva	8,8	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	14,5	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	20,3
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,9	A06A	Laxantia	4,8	C07A	Beta-blokkers	8,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,9	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	17,1
D01A	Antimycotica, lokale	3,8	D01A	Antimycotica, lokale	4,6	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,6	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	12,2	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	16,4

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2020

Top-10 of drug prescriptions by age , 2020

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,8	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	15,7	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	19,0	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	35,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	48,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,0	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	10,1	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,9	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	34,0	B01A	Antithrombotica	47,6
D02A	Emollientia en protectiva	6,7	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,3	B01A	Antithrombotica	27,5	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	40,5
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,1	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,7	C07A	Beta-blokkers	22,3	C07A	Beta-blokkers	35,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	5,6	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,7	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,6	C09A	Ace-remmers	16,8	A06A	Laxantia	24,7
D06A	Antibiotica, lokale	5,1	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,6	B01A	Antithrombotica	8,8	A06A	Laxantia	14,8	C09A	Ace-remmers	21,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	4,7	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,0	N06A	Antidepressiva	8,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	14,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	20,5
A06A	Laxantia	3,9	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,0	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,5	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,1	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	19,4
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,5	A06A	Laxantia	4,5	C07A	Beta-blokkers	8,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	16,3
D01A	Antimycotica, lokale	3,3	N06A	Antidepressiva	4,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,3	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	11,5	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	15,4

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2021

Top-10 of drug prescriptions by age, 2021

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	7,9	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	14,5	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	18,6	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	47,3
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,6	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,7	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,4	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,4	B01A	Antithrombotica	46,7
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,7	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,8	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,1	B01A	Antithrombotica	27,1	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	40,4
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	9,8	C07A	Beta-blokkers	21,5	C07A	Beta-blokkers	34,2
D02A	Emollientia en protectiva	6,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	8,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,3	C09A	ACE-remmers	16,6	A06A	Laxantia	24,6
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,2	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,4	B01A	Antithrombotica	8,8	A06A	Laxantia	15,4	C09A	ACE-remmers	21,6
D06A	Antibiotica, lokale	5,0	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	6,0	N06A	Antidepressiva	8,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	14,7	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	20,7
A06A	Laxantia	4,1	A06A	Laxantia	4,7	A06A	Laxantia	8,4	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,1	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	17,9
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,7	C07A	Beta-blokkers	8,1	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	13,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroïden	16,3
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	N06A	Antidepressiva	4,6	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,0	A10B	Bloedglucose verlagende middelen excl. insuline	11,3	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	14,9

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 van geneesmiddelvoorschriften naar leeftijdsgroep, 2022

Top-10 of drug prescriptions by age, 2022

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*	ATC	Omschrijving	%*
J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,7	G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	13,8	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	18,2	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	34,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	46,6
D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	7,9	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	9,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	15,3	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	33,0	B01A	Antithrombotica	46,4
R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	7,0	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	8,3	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	13,3	B01A	Antithrombotica	26,9	C10A	Antilipaemica, enkelvoudig	41,0
R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	6,4	R06A	Antihistaminica voor systemisch gebruik	8,1	R01A	Decongestiva en andere lokale middelen voor nasaal gebruik	9,9	C07A	Beta-blokkers	21,0	C07A	Beta-blokkers	33,6
D06A	Antibiotica, lokale	6,4	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	8,0	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	9,8	C09A	Ace-remmers	16,3	A06A	Laxantia	24,5
D02A	Emollientia en protectiva	6,3	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	7,5	J01C	Betalactam-antibiotica, penicillines	9,0	A06A	Laxantia	15,4	C09A	Ace-remmers	21,3
R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	5,6	A02B	Middelen bij ulcus pepticum en gastro-oesofageale reflux	6,1	B01A	Antithrombotica	8,9	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	15,2	C08C	Selectieve calciumantagonisten met vnl vasculaire werking	21,0
A06A	Laxantia	4,3	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	4,9	N06A	Antidepressiva	8,8	M01A	Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische midd.	14,4	A11C	Vitaminen a en d, inclusief combinaties van deze twee	16,7
G03A	Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik	3,3	N06A	Antidepressiva	4,6	R03A	Sympathicomimetica voor inhalatie	8,5	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	13,2	D07A	Enkelvoudige corticosteroiden	16,0
D01A	Antimycotica, lokale	3,1	A06A	Laxantia	4,6	A06A	Laxantia	8,4	A10B	Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines	11,7	C09C	Angiotensine-ii-antagonisten	15,0

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2018

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2018

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,6	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,5	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	24,6	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	30,2
S84	Impetigo/impetiginisatie	3,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,9	T90	Diabetes mellitus type 2	5,4	T90	Diabetes mellitus type 2	13,2	T90	Diabetes mellitus type 2	17,3
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,8	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,4	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,7	T93	Hypercholesterolemie	10,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	12,0
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,1	R96	Astma	3,3	R96	Astma	4,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,4	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,2
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,8	U71	Cystitis/Urinewegsinfectie	3,3	S8	Contact eczeem/ander eczeem	4,2	R05	Hoesten	5,5	T93	Hypercholesterolemie	10,0
R96	Astma	2,6	S74	Dermatomyose(n)	3,3	R05	Hoesten	4,2	S88	Contact eczeem/ander eczeem	5,2	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	9,0
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,3	R05	Hoesten	2,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,9	R95	Emfyseem/COPD	5,2	D12	Obstipatie	8,6
D12	Obstipatie	2,2	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	2,1	T93	Hypercholesterolemie	3,8	D02	Maagpijn	4,6	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	6,9
S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,2	S87	Constitutioneel eczeem	1,9	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	3,4	R96	Astma	4,6	L95	Osteoporose	6,7
S74	Dermatomyose(n)	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,9	D02	Maagpijn	3,0	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	4,6	S88	Contact eczeem/ander eczeem	6,6

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelloosvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2019

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2019

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,4	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	7,4	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,7
S84	Impetigo/impetiginisatie	3,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,6	T90	Diabetes mellitus	5,2	T90	Diabetes mellitus	12,6	T90	Diabetes mellitus	16,4
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,2	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,8	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,9	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	11,7
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,4	R96	Astma	3,1	R96	Astma	4,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,4	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,2
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,9	R05	Hoesten	5,3	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,4
D12	Obstipatie	2,4	S74	Dermatomycose(n)	3,0	R05	Hoesten	3,9	R95	Emfyseem/COPD	5,1	D12	Obstipatie	8,3
R96	Astma	2,2	R05	Hoesten	2,1	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,8	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,9	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	8,2
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	2,1	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	1,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,6	R96	Astma	4,5	L95	Osteoporose	6,4
S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,0	S87	Constitutioneel eczeem	1,8	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	3,3	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	4,5	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	6,2
R05	Hoesten	1,7	W12	Anticonceptie: IUD	1,8	D02	Maagpijn	2,9	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,2	R95	Emfyseem/COPD	6,2

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2020

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2020

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,2	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,4
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,6	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,9	T90	Diabetes mellitus	5,2	T90	Diabetes mellitus	12,2	T90	Diabetes mellitus	15,9
S84	Impetigo/impetiginisatie	2,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	3,1	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,0	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,9	U71	Cystitis/urine­weginfectie	11,8
D12	Obstipatie	2,3	R96	Astma	3,0	R96	Astma	4,3	U71	Cystitis/urine­weginfectie	6,3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,1
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,0	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,6	U71	Cystitis/urine­weginfectie	3,8	R95	Emfyseem/COPD	4,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	9,3
H71	Otitis media acuta/myringitis	2,0	S74	Dermatomycose(n)	2,5	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,6	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,6	D12	Obstipatie	8,5
R96	Astma	1,9	S87	Constitutioneel eczeem	1,8	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,5	R96	Astma	4,4	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	7,2
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,7	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	3,1	D02	Maagpijn	4,2	P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	6,2
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	1,6	P76	Depressie	2,8	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,1	R95	Emfyseem/COPD	5,9
S74	Dermatomycose(n)	1,3	R05	Hoesten	1,4	D02	Maagpijn	2,8	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	4,0	L95	Osteoporose	5,9

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2021

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2021

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,3	W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,7	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	9,9	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	22,8	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	28,2
S87	Constitutioneel eczeem	4,2	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	6,2	T90	Diabetes mellitus	5,2	T90	Diabetes mellitus	12,1	T90	Diabetes mellitus	15,4
S84	Impetigo/impetiginisatie	2,8	R96	Astma	3,0	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(se n)	9,5	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	11,2
H71	Otitis media acuta/myringitis	2,5	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	2,9	R96	Astma	4,2	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,1	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,4
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	2,5	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,7	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,7	T93	Vetstofwisselingsstoornis(se n)	9,6
D12	Obstipatie	2,4	S74	Dermatomycose(n)	2,5	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,5	R95	Emfyseem/COPD	4,6	D12	Obstipatie	7,8
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,9	S87	Constitutioneel eczeem	1,9	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,5	R96	Astma	4,4	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	6,5
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,8	W12	Anticonceptie: IUD	1,8	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	2,9	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,2	L95	Osteoporose	6,1
R96	Astma	1,6	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	1,5	P76	Depressie	2,8	D02	Maagpijn	4,1	S88	Contact eczeem/ander eczeem	5,7
R05	Hoesten	1,4	S96	Acne	1,4	D02	Maagpijn	2,8	T86	Hypothyreodie/myxoedeem	3,8	P06	Slapeloosheid/andere slaapproblemen	5,7

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Meest frequent voorkomende indicaties voor een geneesmiddelvoorschrift naar leeftijdsgroep (% van ingeschreven patiënten), 2022

Most frequent indications for which drugs are prescribed by age group (% of registered patients), 2022

0-17 jaar			18-44 jaar			45-64 jaar			65-74 jaar			75+ jaar		
ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*	ICPC	Omschrijving	%*
S87	Constitutioneel eczeem	4,3	X11	Anticonceptie: orale anticonceptie	6,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	10,1	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	23,3	K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	29,1
S84	Impetigo/impetiginisatie	3,8	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	5,5	T90	Diabetes mellitus	5,3	T90	Diabetes mellitus	11,8	T90	Diabetes mellitus	15,3
H71	Otitis media acuta/myringitis	3,7	R96	Astma	2,9	R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	4,9	T93	Vetstofwisselingsstoornis(se n)	9,4	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	11,2
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	3,6	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	2,8	R96	Astma	4,3	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	6,3	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	10,4
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	3,2	S74	Dermatomyose(n)	2,7	U71	Cystitis/urinewegsinfectie	3,7	R05	Hoesten	4,6	T93	Vetstofwisselingsstoornis(se n)	9,6
D12	Obstipatie	2,5	S88	Contact eczeem/ander eczeem	2,6	R05	Hoesten	3,6	R96	Astma	4,6	D12	Obstipatie	7,6
R05	Hoesten	1,8	R05	Hoesten	2,1	T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	3,5	R95	Emfyseem/COPD	4,6	L95	Osteoporose	6,1
X11	Anticonceptie: orale anticonceptie	1,8	S87	Constitutioneel eczeem	1,9	S88	Contact eczeem/ander eczeem	3,4	S88	Contact eczeem/ander eczeem	4,3	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	5,7
S88	Contact eczeem/ander eczeem	1,8	X12	Anticonceptie: IUD	1,5	P76	Depressie	2,8	K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	4,1	R95	Emfyseem/COPD	5,5
R96	Astma	1,5	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	1,4	T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	2,7	D02	Maagpijn	3,9	P06	Slapeloosheid/andere slaapproblemen	5,4

*percentage patiënten dat het geneesmiddel voorgeschreven krijgt

Morbiditeitscijfers

Incidentie- en jaarprevalentiecijfers per diagnose in de periode 2018-2022, uitgesplitst naar geslacht (per 1.000 personen)

				Incidentie			Prevalentie		
ICPC	Diagnose omschrijving	Categorie	Jaar	Mannen	Vrouwen	Totaal	Mannen	Vrouwen	Totaal
A01	Gegeneraliseerde pijn	Acuut	2018	3,5	7,6	5,6	4,0	8,6	6,3
			2019	3,0	6,5	4,8	3,4	7,5	5,4
			2020	3,1	6,3	4,7	3,6	7,4	5,5
			2021	3,4	6,7	5,1	3,9	7,9	5,9
			2022	3,1	6,5	4,8	3,7	7,5	5,6
A02	Koude rillingen	Acuut	2018	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2019	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2020	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
			2021	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
			2022	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
A03	Koorts	Acuut	2018	18,5	17,2	17,8	16,3	15,5	15,9
			2019	17,4	16,6	17,0	15,4	14,8	15,1
			2020	19,6	19,4	19,5	17,9	17,7	17,8
			2021	19,1	18,2	18,7	16,3	15,7	16,0
			2022	26,0	25,4	25,7	22,4	22,0	22,2
A04	Moeheid/zwakte	Acuut	2018	32,0	70,6	51,4	29,1	62,0	45,7
			2019	31,7	68,4	50,2	28,7	60,3	44,6
			2020	26,6	57,5	42,1	24,4	50,8	37,7
			2021	27,5	60,2	44,0	24,9	52,9	39,0
			2022	30,9	65,1	48,1	28,1	57,3	42,8
A05	Algehele achteruitgang	Langdurig	2018	3,4	6,0	4,7	6,7	12,5	9,6
			2019	4,0	6,7	5,3	7,6	13,8	10,7
			2020	4,0	6,5	5,2	8,0	14,3	11,2
			2021	3,7	6,1	4,9	7,7	13,9	10,8

			2022	5,0	8,2	6,6	9,2	16,6	13,0
A06	Flauwvallen/syncope	Acuut	2018	8,0	11,5	9,8	7,6	10,9	9,2
			2019	8,1	11,2	9,7	7,6	10,6	9,1
			2020	7,3	10,2	8,7	7,0	9,7	8,3
			2021	7,5	10,3	8,9	7,0	9,8	8,4
			2022	8,3	11,0	9,7	7,9	10,5	9,2
A07	Coma	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A08	Zwelling [ex. K07]	Acuut	2018	2,2	2,8	2,5	2,0	2,5	2,3
			2019	2,1	2,9	2,5	1,9	2,5	2,2
			2020	2,2	2,9	2,6	1,9	2,6	2,3
			2021	2,6	3,4	3,0	2,3	3,0	2,7
			2022	2,6	3,4	3,0	2,3	3,0	2,6
A09	Transpiratieproblemen	Langdurig	2018	2,3	2,9	2,6	3,9	4,9	4,4
			2019	2,1	2,5	2,3	3,6	4,3	3,9
			2020	1,7	2,3	2,0	3,1	4,0	3,5
			2021	1,9	2,7	2,3	3,1	4,3	3,7
			2022	1,8	2,4	2,1	3,2	4,3	3,7
A10	Bloeding	Acuut	2018	1,3	2,6	1,9	1,2	2,4	1,8
			2019	1,3	2,4	1,9	1,2	2,2	1,7
			2020	1,2	2,1	1,7	1,1	1,9	1,5
			2021	1,3	2,6	2,0	1,2	2,3	1,8
			2022	1,3	2,5	1,9	1,2	2,2	1,7
A12	Allergie/allergische reactie	Langdurig	2018	8,7	14,5	11,7	15,3	25,6	20,5
			2019	8,3	14,1	11,2	14,7	24,6	19,7
			2020	7,2	12,0	9,6	13,7	22,9	18,3
			2021	7,7	13,7	10,7	14,1	24,2	19,2
			2022	7,7	12,6	10,2	14,3	24,1	19,2
A13	Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel	Acuut	2018	5,6	8,6	7,1	4,6	7,3	6,0

			2019	5,6	8,5	7,1	4,7	7,2	6,0
			2020	5,8	9,0	7,4	4,7	7,6	6,1
			2021	6,5	10,8	8,6	5,4	9,3	7,4
			2022	5,6	8,6	7,1	4,8	7,5	6,1
A14	Koliek bij zuigeling	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
A15	Overmatig huilende zuigeling	Acuut	2018	1,2	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1
			2019	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
			2020	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2021	1,3	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1
			2022	1,2	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
A16	Prikkelbare/drukke zuigeling	Acuut	2018	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
			2019	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
			2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2021	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
A17	Algemene symptomen/klachten zuigeling	Acuut	2018	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7
			2019	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
			2020	1,2	1,1	1,1	1,0	0,8	0,9
			2021	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,9
			2022	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9
A20	Verzoek/gesprek over euthanasie	Acuut	2018	6,8	9,9	8,4	6,4	9,3	7,8
			2019	9,0	12,9	10,9	8,6	12,1	10,4
			2020	11,2	16,9	14,1	10,6	15,8	13,2
			2021	9,7	13,9	11,8	9,3	13,3	11,3
			2022	11,9	16,7	14,3	11,3	15,9	13,6
A25	Angst voor de dood	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A26	Angst voor kanker	Acuut	2018	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5
			2019	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5
			2020	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2021	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
			2022	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
A27	Angst voor andere ziekte	Acuut	2018	0,8	1,1	0,9	0,7	1,0	0,9
			2019	0,6	0,9	0,8	0,6	0,9	0,8
			2020	16,1	24,1	20,1	15,2	22,6	18,9
			2021	14,1	21,1	17,6	14,2	21,0	17,6
			2022	2,6	4,1	3,4	3,3	5,1	4,2
A28	Functiebeperking/handicap	Chronisch	2018	0,1	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5
			2019	0,2	0,2	0,2	1,8	1,8	1,8
			2020	0,1	0,2	0,2	1,6	1,7	1,7
			2021	0,1	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6
			2022	0,2	0,2	0,2	2,1	2,1	2,1
A29	Andere algemene symptomen/klachten	Acuut	2018	13,8	21,4	17,6	12,0	18,1	15,1
			2019	16,9	24,4	20,7	14,1	20,1	17,1
			2020	13,6	19,1	16,4	11,8	16,4	14,1
			2021	13,0	19,2	16,2	11,0	16,3	13,7
			2022	15,4	22,5	19,0	12,9	18,2	15,6
A70	Gegeneraliseerde tuberculose [ex. R70]	Langdurig	2018	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,2	0,2
			2020	<0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
A71	Mazelen	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

A72	Waterpokken	Acuut	2018	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9
			2019	3,2	3,0	3,1	3,2	3,0	3,1
			2020	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
			2021	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			2022	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
A73	Malaria	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
A74	Rode hond	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A75	Mononucleosis infectiosa	Acuut	2018	0,5	0,9	0,7	0,5	0,8	0,7
			2019	0,6	0,9	0,7	0,6	0,8	0,7
			2020	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
			2021	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2022	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
A76	Andere virusziekte met exantheem	Acuut	2018	4,3	4,1	4,2	4,0	3,8	3,9
			2019	4,1	4,0	4,1	3,9	3,8	3,9
			2020	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,7
			2021	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
			2022	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3	3,4
A77	Andere virusziekte(n)	Acuut	2018	4,0	4,4	4,2	3,8	4,2	4,0
			2019	3,5	3,9	3,7	3,3	3,6	3,4
			2020	6,4	8,1	7,2	5,9	7,4	6,7
			2021	3,3	3,8	3,5	3,2	3,6	3,4
			2022	3,7	3,9	3,8	3,4	3,6	3,5
A78	Andere infectieziekte(n)	Acuut	2018	3,5	3,4	3,5	3,4	3,2	3,3
			2019	3,4	3,3	3,4	3,2	3,1	3,1

			2020	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4	3,4
			2021	3,0	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9
			2022	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
A79	Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie	Chronisch	2018	0,2	0,3	0,3	0,8	0,9	0,8
			2019	0,3	0,2	0,3	0,8	0,9	0,8
			2020	0,3	0,3	0,3	0,8	0,9	0,9
			2021	0,2	0,3	0,2	0,8	0,9	0,9
			2022	0,2	0,3	0,3	0,8	0,9	0,9
A80	Ongeval/letsel	Acuut	2018	23,5	27,0	25,3	22,5	25,9	24,2
			2019	22,7	26,5	24,6	21,8	25,2	23,5
			2020	21,7	24,5	23,1	20,9	23,6	22,3
			2021	22,3	25,7	24,0	21,4	24,6	23,0
			2022	24,8	27,8	26,3	23,8	26,6	25,2
A81	Multiple traumata/inwendig letsels	Acuut	2018	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
			2019	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
			2020	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
			2021	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6
			2022	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
A82	Laat gevolg van letsel	Langdurig	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A84	Geneesmiddelintoxicatie	Acuut	2018	0,8	1,2	1,0	0,8	1,1	0,9
			2019	0,7	1,1	0,9	0,7	1,0	0,9
			2020	0,8	1,1	1,0	0,8	1,1	0,9
			2021	0,8	1,1	1,0	0,8	1,1	0,9
			2022	0,7	1,1	0,9	0,7	1,1	0,9
A85	Geneesmiddelbijwerking	Acuut	2018	5,0	11,4	8,2	4,1	9,5	6,9
			2019	4,7	10,4	7,6	3,9	8,8	6,3
			2020	4,3	9,6	7,0	3,4	8,0	5,7
			2021	4,2	10,2	7,2	3,5	8,5	6,1

			2022	3,7	8,4	6,1	3,0	7,0	5,0
A86	Intoxicatie andere chemische stof	Acuut	2018	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
			2019	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2020	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
			2021	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2022	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1
A87	Complicatie(s) medische behandeling	Acuut	2018	1,8	2,2	2,0	2,1	2,6	2,3
			2019	1,8	2,1	1,9	2,0	2,4	2,2
			2020	1,8	2,0	1,9	2,1	2,3	2,2
			2021	2,4	3,1	2,8	2,6	3,3	3,0
			2022	1,8	2,1	2,0	2,1	2,6	2,3
A88	Schadelijk gevolg fysische factor [ex. H85]	Acuut	2018	1,4	2,3	1,9	1,3	2,1	1,7
			2019	1,4	2,0	1,7	1,2	1,8	1,5
			2020	1,0	1,6	1,3	0,9	1,4	1,1
			2021	1,6	2,1	1,8	1,4	1,9	1,6
			2022	1,6	2,4	2,0	1,4	2,2	1,8
A89	Aanwezigheid/gevolg prothese	Acuut	2018	2,7	2,2	2,5	2,8	2,4	2,6
			2019	2,6	2,3	2,4	2,8	2,5	2,6
			2020	2,3	2,1	2,2	2,6	2,3	2,5
			2021	2,2	2,2	2,2	2,5	2,4	2,4
			2022	2,3	2,1	2,2	2,5	2,4	2,5
A90	Multiple aangeboren afwijkingen	Chronisch	2018	0,1	<0,1	<0,1	2,1	1,9	2,0
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	1,9	2,0
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	2,0	1,9	2,0
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	2,0	2,0
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	2,0	2,1
A91	Afwijkende uitslag(en) onderzoek	Acuut	2018	22,0	31,9	27,0	16,9	22,9	19,9
			2019	21,4	30,9	26,2	16,4	22,0	19,2
			2020	18,7	27,7	23,2	14,8	19,9	17,4
			2021	22,1	32,4	27,3	17,5	23,1	20,3
			2022	19,6	29,9	24,8	15,3	21,1	18,2
A92	Toxoplasmose	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
A93	Dysmatuur/prematuur/immatuur levendgeborene	Langdurig	2018	0,7	0,7	0,7	1,3	1,2	1,3
			2019	0,8	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
			2020	0,7	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
			2021	0,7	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
			2022	0,7	0,6	0,7	1,4	1,2	1,3
A94	Perinatale morbiditeit	Acuut	2018	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5
			2019	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4
			2020	0,9	0,5	0,7	0,8	0,4	0,6
			2021	0,8	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6
			2022	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5
A97	Geen ziekte	Acuut	2018	71,8	104,9	88,5	59,7	85,7	72,8
			2019	81,1	117,1	99,2	67,8	95,2	81,6
			2020	84,6	114,8	99,8	71,4	94,3	82,9
			2021	91,7	133,2	112,6	75,1	106,3	90,8
			2022	88,2	120,6	104,5	73,1	96,7	85,0
A99	Andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte(n)	Langdurig	2018	13,8	16,9	15,4	21,1	26,4	23,8
			2019	19,6	23,4	21,5	33,2	40,6	36,9
			2020	15,8	18,9	17,4	27,3	33,7	30,5
			2021	17,6	21,6	19,6	29,7	37,0	33,4
			2022	21,5	28,1	24,8	37,1	49,8	43,5
B02	Vergrote lymfeklier(en)	Acuut	2018	4,0	5,2	4,6	3,6	4,6	4,1
			2019	4,1	5,5	4,8	3,5	4,9	4,2
			2020	3,7	5,0	4,4	3,2	4,4	3,8
			2021	4,2	6,1	5,2	3,6	5,3	4,5
			2022	4,4	6,0	5,2	3,9	5,3	4,6
B03	Andere symptomen/klachten lymfeklieren	Acuut	2018	0,7	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8
			2019	0,8	1,1	0,9	0,7	1,0	0,8
			2020	0,7	1,2	1,0	0,6	1,1	0,9

			2021	0,8	1,2	1,0	0,7	1,1	0,9
			2022	0,9	1,2	1,0	0,8	1,1	0,9
B04	Symptomen/klachten bloed/bloedvormende organen	Acuut	2018	0,7	0,8	0,7	0,5	0,7	0,6
			2019	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6
			2020	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
			2021	0,7	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7
			2022	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7
B25	Angst voor AIDS	Acuut	2018	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2
			2019	0,3	<0,1	0,2	0,3	<0,1	0,2
			2020	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2021	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2022	0,2	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
B26	Angst voor kanker bloed/lymfestelsel	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
B27	Angst voor andere ziekte bloed/lymfestelsel	Acuut	2018	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2019	0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2020	<0,1	0,2	0,2	<0,1	0,2	0,1
			2021	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
B28	Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,4	0,3
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,3	0,3
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,4	0,3
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,4	0,3
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,4	0,3
B29	Andere symptomen/klachten bloed/lymfestelsel	Acuut	2018	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,2
			2019	0,8	1,3	1,1	0,6	0,9	0,7
			2020	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	0,7	1,0	0,9	0,5	0,7	0,6

B70	Acute lymphadenitis	Acuut	2018	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	0,8
			2019	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
			2020	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2021	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
			2022	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6
B71	Chronische/niet-gespecificeerde lymphadenitis	Acuut	2018	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
			2019	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
			2020	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2
			2022	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
B72	Ziekte van Hodgkin	Chronisch	2018	0,2	0,1	0,1	2,5	1,9	2,2
			2019	0,2	0,2	0,2	2,6	2,0	2,3
			2020	0,2	0,1	0,2	2,7	2,0	2,4
			2021	0,2	0,2	0,2	2,8	2,1	2,4
			2022	0,2	0,1	0,2	2,8	2,1	2,5
B73	Leukemie	Chronisch	2018	0,2	0,1	0,2	1,9	1,4	1,6
			2019	0,2	0,1	0,2	1,9	1,4	1,7
			2020	0,2	0,1	0,2	1,9	1,4	1,7
			2021	0,2	0,1	0,2	2,0	1,5	1,7
			2022	0,2	0,1	0,2	2,0	1,5	1,8
B74	Andere maligniteit bloed/lymfestelsel	Chronisch	2018	0,2	0,1	0,1	1,1	1,0	1,0
			2019	0,2	<0,1	0,1	1,2	0,9	1,1
			2020	0,2	0,2	0,2	1,2	1,0	1,1
			2021	0,2	0,1	0,2	1,3	1,0	1,2
			2022	0,2	0,1	0,1	1,3	1,1	1,2
B75	Benigne/niet-gespecificeerd neoplasma bloed/lymfestelsel	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
B76	Miltruypuur	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2

			2020	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
B77	Ander letsel bloed/lymfestelsel	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
B78	Erfelijke hemolytische anemie	Chronisch	2018	0,2	0,3	0,3	3,4	5,1	4,3
			2019	0,2	0,2	0,2	2,7	4,2	3,5
			2020	0,2	0,2	0,2	2,9	4,4	3,7
			2021	0,2	0,2	0,2	3,1	4,7	3,9
			2022	0,2	0,2	0,2	3,1	4,7	3,9
B79	Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,5
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,6	0,6
B80	IJzergebrekanemie	Langdurig	2018	2,6	10,3	6,5	5,1	19,8	12,5
			2019	2,6	9,9	6,3	4,9	18,5	11,8
			2020	2,4	8,7	5,6	5,0	18,4	11,7
			2021	2,7	10,4	6,6	5,2	19,4	12,3
			2022	2,8	10,8	6,8	5,5	20,9	13,3
B81	Pernicieuze/foliumzuurdeficiëntie-anemie	Langdurig	2018	2,0	4,7	3,4	5,4	12,9	9,2
			2019	1,7	3,9	2,8	4,8	11,1	8,0
			2020	1,5	3,4	2,5	4,6	10,8	7,7
			2021	1,6	3,5	2,5	4,3	10,2	7,3
			2022	1,7	3,5	2,6	4,3	1<0,1	7,2
B82	Andere/niet-gespecificeerde anemie	Langdurig	2018	3,5	5,2	4,4	6,2	9,2	7,7
			2019	3,5	5,2	4,3	6,1	9,0	7,6
			2020	3,0	4,3	3,7	5,8	8,4	7,1
			2021	3,3	4,8	4,0	6,1	8,6	7,4

			2022	3,6	4,9	4,2	6,4	9,0	7,7
B83	Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten	Chronisch	2018	0,7	0,9	0,8	6,5	9,4	7,9
			2019	0,6	0,8	0,7	6,7	9,9	8,3
			2020	0,5	0,7	0,6	6,9	10,3	8,6
			2021	0,6	0,9	0,7	7,2	11,0	9,1
			2022	0,6	0,8	0,7	7,5	11,2	9,3
B84	Afwijking leukocyten	Acuut	2018	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2019	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3
			2020	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
			2021	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
			2022	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
B85	Onverklaarde afwijking bloedonderzoek	Acuut	2018	5,6	6,9	6,3	4,8	5,9	5,3
			2019	5,4	6,8	6,1	4,5	5,7	5,1
			2020	5,0	6,6	5,8	4,3	5,6	4,9
			2021	5,4	7,1	6,2	4,5	5,9	5,2
			2022	5,2	6,9	6,0	4,4	5,7	5,1
B86	Andere hematologische afwijking(en)	Acuut	2018	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4
			2019	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
			2020	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2021	0,3	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4
			2022	0,3	0,7	0,5	0,3	0,6	0,4
B87	Splenomegalie	Langdurig	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,2	0,2
			2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
B90	HIV-infectie (AIDS/ARC)	Chronisch	2018	0,2	<0,1	<0,1	2,4	0,7	1,5
			2019	0,1	<0,1	<0,1	2,1	0,5	1,3
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	0,6	1,4
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,2	0,6	1,4
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,1	0,6	1,3
B99	Andere ziekte(n) bloed/lymfestelsel	Langdurig	2018	0,3	0,6	0,5	0,6	1,2	0,9

			2019	0,3	0,7	0,5	0,7	1,2	1,0
			2020	0,3	0,6	0,4	0,7	1,2	0,9
			2021	1,0	1,1	1,0	1,4	1,6	1,5
			2022	0,8	0,9	0,9	1,6	1,8	1,7
D01	Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen	Acuut	2018	17,5	33,8	25,7	16,0	30,2	23,2
			2019	17,0	33,0	25,0	15,5	29,0	22,3
			2020	15,3	29,9	22,6	13,8	26,5	20,2
			2021	16,5	32,2	24,4	15,0	28,2	21,6
			2022	18,1	34,5	26,3	16,3	30,2	23,3
D02	Maagpijn	Acuut	2018	16,6	26,6	21,6	18,9	3<0,1	24,5
			2019	16,5	25,6	21,1	18,1	28,5	23,3
			2020	14,7	23,2	19,0	17,4	27,3	22,4
			2021	14,9	23,6	19,3	17,7	28,1	23,0
			2022	14,6	23,0	18,8	17,6	27,7	22,7
D03	Zuurbranden	Acuut	2018	6,4	8,0	7,2	7,1	9,2	8,1
			2019	6,5	8,2	7,4	7,0	9,2	8,1
			2020	6,1	7,7	6,9	7,1	9,4	8,2
			2021	6,1	8,2	7,1	7,3	9,8	8,6
			2022	5,9	7,7	6,8	7,1	9,5	8,3
D04	Pijn anus/rectum	Acuut	2018	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8
			2019	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7
			2020	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7
			2021	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
			2022	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
D05	Perianale jeuk	Acuut	2018	3,3	3,0	3,2	3,0	2,7	2,8
			2019	3,3	3,0	3,2	2,9	2,6	2,7
			2020	2,9	2,7	2,8	2,6	2,4	2,5
			2021	3,1	2,9	3,0	2,7	2,5	2,6
			2022	3,1	2,9	3,0	2,7	2,6	2,7
D06	Andere gelokaliseerde buikpijn	Acuut	2018	19,3	42,6	31,0	17,6	37,8	27,8
			2019	20,1	43,8	32,0	18,2	38,2	28,2
			2020	19,3	40,8	30,1	17,4	36,0	26,7

			2021	20,5	43,7	32,2	18,3	37,9	28,1
			2022	21,3	44,5	33,0	19,2	38,8	29,0
D08	Flatulentie/meteorisme/boeren	Acuut	2018	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2019	1,1	1,3	1,2	0,9	1,0	1,0
			2020	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2021	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2022	1,1	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
D09	Misselijkheid	Acuut	2018	4,4	12,2	8,4	4,1	11,1	7,6
			2019	4,1	11,0	7,6	3,7	9,9	6,8
			2020	4,0	11,0	7,5	3,7	9,8	6,8
			2021	4,3	11,6	7,9	3,9	10,3	7,1
			2022	4,2	11,8	8,0	3,8	10,6	7,2
D10	Braken	Acuut	2018	5,9	7,5	6,7	5,5	7,0	6,2
			2019	5,1	6,7	5,9	4,7	6,1	5,4
			2020	4,0	5,5	4,8	3,8	5,0	4,4
			2021	6,0	7,5	6,8	5,4	6,8	6,1
			2022	6,8	8,7	7,7	6,4	7,9	7,1
D11	Diarree	Acuut	2018	15,7	20,5	18,1	13,7	17,3	15,6
			2019	14,9	19,0	17,0	12,8	16,0	14,4
			2020	11,9	15,5	13,8	10,5	13,2	11,8
			2021	13,2	16,6	14,9	11,4	13,8	12,6
			2022	14,8	18,2	16,5	12,9	15,3	14,1
D12	Obstipatie	Langdurig	2018	16,0	25,2	20,6	29,3	48,3	38,9
			2019	15,3	24,5	19,9	28,1	45,8	37,0
			2020	15,1	23,5	19,3	28,2	45,8	37,1
			2021	15,4	24,8	20,1	28,6	46,7	37,7
			2022	15,5	24,1	19,8	28,9	46,7	37,8
D13	Geelzucht	Acuut	2018	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4
			2019	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3
			2020	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
			2021	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
			2022	0,7	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5

D14	Haematemesis	Acuut	2018	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
			2019	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4	0,5
			2020	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
			2021	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5
			2022	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5
D15	Melaena	Acuut	2018	0,9	0,9	0,9	1,1	1,0	1,0
			2019	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	0,9
			2020	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
			2021	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1	1,1
			2022	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1	1,1
D16	Rectaal bloedverlies	Acuut	2018	6,1	5,9	6,0	5,7	5,4	5,6
			2019	5,8	6,0	5,9	5,4	5,4	5,4
			2020	5,6	5,6	5,6	5,1	5,1	5,1
			2021	6,7	6,6	6,6	6,0	6,0	6,0
			2022	6,7	6,4	6,6	6,1	5,8	6,0
D17	Incontinentie voor ontlasting	Langdurig	2018	0,6	1,1	0,9	1,1	2,0	1,5
			2019	0,6	1,1	0,9	1,0	2,0	1,5
			2020	0,6	0,9	0,8	1,0	1,9	1,4
			2021	0,6	1,1	0,8	1,0	1,9	1,5
			2022	0,6	1,2	0,9	1,1	2,0	1,5
D18	Verandering ontlasting/defecatiepatroon	Acuut	2018	3,1	3,5	3,3	3,5	4,0	3,8
			2019	3,1	3,7	3,4	3,5	4,1	3,8
			2020	3,0	3,5	3,3	3,5	4,0	3,8
			2021	3,6	4,0	3,8	4,0	4,6	4,3
			2022	3,6	4,3	3,9	4,1	4,9	4,5
D19	Symptomen/klachten tanden/tandvlees	Acuut	2018	7,8	8,8	8,3	6,4	7,2	6,8
			2019	7,6	8,9	8,2	5,9	6,9	6,4
			2020	8,3	9,3	8,8	6,1	6,9	6,5
			2021	14,9	15,7	15,3	9,2	9,6	9,4
			2022	10,3	11,1	10,7	7,5	8,0	7,7
D20	Symptomen/klachten mond/tong/lippen/speekselklieren	Acuut	2018	8,2	12,3	10,3	7,3	10,7	9,0
			2019	8,3	12,6	10,5	7,3	10,8	9,1

			2020	7,8	12,7	10,3	7,0	10,9	8,9
			2021	8,1	13,0	10,6	7,3	11,2	9,2
			2022	8,7	13,6	11,2	7,8	11,8	9,8
D21	Slikproblemen	Acuut	2018	3,2	3,6	3,4	2,6	3,1	2,8
			2019	3,1	3,7	3,4	2,5	3,1	2,8
			2020	3,3	3,7	3,5	2,6	3,1	2,9
			2021	3,4	4,0	3,7	2,7	3,2	3,0
			2022	3,4	3,7	3,5	2,6	3,0	2,8
D22	Wormen/oxyuren/andere parasieten	Acuut	2018	1,6	2,4	2,0	1,6	2,3	1,9
			2019	1,4	2,1	1,8	1,4	2,0	1,7
			2020	1,2	2,0	1,6	1,2	2,0	1,6
			2021	2,2	3,3	2,7	2,1	3,1	2,6
			2022	1,4	2,1	1,7	1,3	2,0	1,7
D24	Zwelling in de buik	Acuut	2018	0,6	1,0	0,8	0,7	1,1	0,9
			2019	0,5	1,0	0,7	0,6	1,1	0,9
			2020	0,6	0,8	0,7	0,6	1,0	0,8
			2021	0,5	0,9	0,7	0,6	1,1	0,8
			2022	0,6	1,1	0,8	0,6	1,2	0,9
D25	Verandering omvang/uitzetting buik	Acuut	2018	0,9	2,0	1,5	1,0	2,3	1,7
			2019	0,9	2,0	1,5	1,0	2,2	1,6
			2020	0,8	1,8	1,3	1,0	2,0	1,5
			2021	0,9	2,0	1,5	1,1	2,2	1,6
			2022	0,9	2,0	1,4	1,0	2,2	1,6
D26	Angst voor kanker spijsverteringsorganen	Acuut	2018	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
			2019	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2020	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2021	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2022	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
D27	Angst voor andere ziekte spijsverteringsorganen	Acuut	2018	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
			2019	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
D28	Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,8	0,7
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,8	0,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,8	0,7
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
D29	Andere symptomen/klachten spijsverteringsorganen	Acuut	2018	0,9	1,1	1,0	1,0	1,3	1,1
			2019	1,2	1,5	1,3	1,3	1,7	1,5
			2020	0,8	1,0	0,9	0,9	1,2	1,0
			2021	0,9	1,1	1,0	1,0	1,2	1,1
			2022	0,9	1,3	1,1	1,1	1,5	1,3
D70	Infectieuze diarree, dysenterie	Acuut	2018	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4
			2019	1,4	1,6	1,5	1,3	1,4	1,4
			2020	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9
			2021	1,0	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9
			2022	1,2	1,4	1,3	1,1	1,3	1,2
D71	Bof	Acuut	2018	0,1	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
D72	Virus hepatitis	Langdurig	2018	0,9	0,9	0,9	1,6	1,6	1,6
			2019	0,7	0,7	0,7	1,3	1,2	1,2
			2020	0,6	0,6	0,6	1,2	1,1	1,2
			2021	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1
			2022	0,6	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
D73	Veronderstelde gastro-intestinale infectie	Acuut	2018	14,7	18,2	16,4	13,6	16,8	15,2
			2019	12,5	15,1	13,8	11,5	14,0	12,8
			2020	7,2	9,7	8,5	6,7	9,0	7,9
			2021	9,4	11,4	10,4	8,5	10,4	9,4
			2022	11,8	14,2	13,0	11,1	13,3	12,2
D74	Maligniteit maag	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,7

			2019	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,6
			2020	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,5	0,6
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,7
			2022	0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,6
D75	Maligniteit colon/rectum	Chronisch	2018	0,8	0,8	0,8	8,5	7,9	8,2
			2019	0,8	0,7	0,8	8,9	8,0	8,4
			2020	0,7	0,6	0,6	8,9	8,1	8,5
			2021	0,8	0,7	0,7	9,0	8,2	8,6
			2022	0,8	0,6	0,7	9,1	8,2	8,7
D76	Maligniteit pancreas	Chronisch	2018	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5
			2019	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,5
			2020	0,2	0,2	0,2	0,6	0,5	0,6
			2021	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6
			2022	0,2	0,2	0,2	0,7	0,6	0,6
D77	Andere/niet-gespecif. maligniteit spijsverteringsorganen	Chronisch	2018	0,5	0,3	0,4	2,7	2,0	2,4
			2019	0,5	0,3	0,4	2,7	2,1	2,4
			2020	0,5	0,3	0,4	2,8	2,2	2,5
			2021	0,5	0,3	0,4	2,9	2,2	2,5
			2022	0,5	0,3	0,4	3,0	2,3	2,6
D78	Benigne neoplasma spijsverteringsorganen	Acuut	2018	4,1	3,3	3,7	4,6	3,7	4,1
			2019	4,0	3,3	3,6	4,5	3,6	4,1
			2020	3,9	3,1	3,5	4,4	3,5	4,0
			2021	4,5	3,6	4,1	5,1	4,0	4,6
			2022	4,3	3,5	3,9	4,9	4,0	4,4
D79	Corpus alienum via mond/anus	Acuut	2018	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1
			2019	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			2020	1,2	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0
			2021	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
			2022	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0
D80	Ander letsel spijsverteringsorganen	Acuut	2018	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4
			2019	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2020	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3

			2021	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
			2022	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
D81	Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen	Chronisch	2018	0,4	0,3	0,3	5,2	3,2	4,2
			2019	0,4	0,2	0,3	5,6	3,3	4,5
			2020	0,3	0,2	0,3	5,9	3,4	4,7
			2021	0,4	0,3	0,3	6,3	3,7	5,0
			2022	0,4	0,3	0,3	6,7	4,0	5,3
D82	Ziekte tanden/tandvlees	Acuut	2018	3,2	4,2	3,7	2,9	3,7	3,3
			2019	2,7	3,8	3,2	2,4	3,4	2,9
			2020	2,3	3,1	2,7	2,1	2,7	2,4
			2021	2,2	3,1	2,7	2,0	2,8	2,4
			2022	2,3	3,0	2,6	2,0	2,7	2,4
D83	Ziekte mond/tong/lippen/speekselklieren	Acuut	2018	7,6	11,7	9,7	7,0	10,4	8,7
			2019	6,8	10,7	8,8	6,1	9,4	7,8
			2020	5,8	9,3	7,6	5,2	8,1	6,7
			2021	5,6	9,3	7,5	5,0	8,2	6,6
			2022	6,1	9,2	7,6	5,5	8,2	6,8
D84	Ziekte oesofagus	Langdurig	2018	5,3	5,7	5,5	13,7	15,0	14,4
			2019	5,8	6,0	5,9	14,1	14,9	14,5
			2020	4,9	5,2	5,0	13,5	14,4	13,9
			2021	5,0	5,2	5,1	13,4	14,0	13,7
			2022	4,6	4,8	4,7	13,3	13,6	13,5
D85	Ulcus duodeni	Acuut	2018	0,7	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8
			2019	0,8	0,6	0,7	0,9	0,7	0,8
			2020	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
			2021	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
			2022	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
D86	Ander ulcus pepticum	Acuut	2018	1,2	1,6	1,4	1,4	1,8	1,6
			2019	1,3	1,6	1,5	1,4	1,8	1,6
			2020	1,1	1,5	1,3	1,4	1,8	1,6
			2021	1,2	1,6	1,4	1,5	1,9	1,7
			2022	1,2	1,5	1,4	1,4	1,8	1,6

D87	Stoornis maagfunctie	Langdurig	2018	3,1	4,5	3,8	7,0	10,2	8,6
			2019	3,3	4,8	4,0	6,9	10,2	8,6
			2020	2,5	3,7	3,1	6,3	9,3	7,8
			2021	2,6	3,8	3,2	6,0	9,0	7,5
			2022	2,6	3,7	3,1	6,1	8,8	7,5
D88	Appendicitis	Acuut	2018	1,5	1,7	1,6	1,5	1,6	1,6
			2019	1,4	1,7	1,5	1,4	1,7	1,5
			2020	1,3	1,7	1,5	1,3	1,7	1,5
			2021	1,5	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5
			2022	1,4	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5
D89	Hernia inguinalis	Langdurig	2018	5,4	0,8	3,1	9,2	1,4	5,3
			2019	5,6	0,9	3,2	9,3	1,4	5,4
			2020	4,9	0,8	2,9	8,9	1,4	5,1
			2021	5,4	0,8	3,1	9,0	1,4	5,2
			2022	5,8	0,9	3,3	9,8	1,4	5,6
D90	Hernia diafragmatica/hiatus	Langdurig	2018	1,0	1,5	1,3	3,0	4,4	3,7
			2019	1,2	1,6	1,4	3,1	4,2	3,6
			2020	1,0	1,6	1,3	3,0	4,3	3,6
			2021	1,0	1,5	1,3	3,0	4,3	3,6
			2022	1,0	1,4	1,2	3,0	4,1	3,6
D91	Andere hernia abdominalis	Langdurig	2018	2,5	1,9	2,2	4,1	3,2	3,6
			2019	2,3	1,8	2,0	3,9	3,0	3,5
			2020	1,9	1,5	1,7	3,4	2,8	3,1
			2021	2,1	1,7	1,9	3,5	2,8	3,1
			2022	2,4	1,7	2,1	3,9	3,0	3,5
D92	Diverticulose/diverticulitis	Chronisch	2018	1,5	1,7	1,6	17,8	23,9	20,9
			2019	1,4	1,7	1,5	17,9	23,6	20,8
			2020	1,3	1,5	1,4	18,9	24,8	21,8
			2021	1,5	1,8	1,6	19,7	25,6	22,7
			2022	1,4	1,6	1,5	2<0,1	25,5	22,7
D93	Spastisch colon/IBS	Langdurig	2018	3,8	10,2	7,0	7,4	20,3	13,9
			2019	3,7	1<0,1	6,9	7,0	19,1	13,1

			2020	3,1	8,7	5,9	6,6	18,3	12,5
			2021	3,5	9,1	6,3	6,6	18,2	12,4
			2022	3,2	8,3	5,8	6,4	17,4	11,9
D94	Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)	Chronisch	2018	0,4	0,5	0,4	8,4	10,1	9,3
			2019	0,4	0,4	0,4	8,7	10,6	9,6
			2020	0,3	0,4	0,4	9,0	11,0	1<0,1
			2021	0,4	0,5	0,4	9,4	11,3	10,3
			2022	0,4	0,4	0,4	9,4	11,5	10,5
D95	Fissura ani/perianaal abces	Langdurig	2018	4,1	4,3	4,2	7,2	7,4	7,3
			2019	3,9	4,2	4,0	6,8	7,1	6,9
			2020	3,4	3,6	3,5	6,4	6,6	6,5
			2021	3,7	4,0	3,8	6,2	6,8	6,5
			2022	3,6	3,8	3,7	6,4	6,8	6,6
D96	Hepatomegalie	Langdurig	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
D97	Cirrose/andere leverziekte	Chronisch	2018	1,1	1,0	1,0	10,2	9,4	9,8
			2019	1,0	1,0	1,0	1<0,1	9,1	9,5
			2020	1,0	0,9	0,9	10,9	10,1	10,5
			2021	1,2	1,0	1,1	11,7	10,9	11,3
			2022	1,2	1,1	1,1	12,1	11,0	11,5
D98	Cholecystitis/cholelithiasis	Langdurig	2018	2,3	4,9	3,6	4,1	8,9	6,5
			2019	2,3	4,9	3,6	4,0	8,7	6,3
			2020	2,3	4,4	3,4	4,1	8,4	6,3
			2021	2,2	4,7	3,5	4,1	8,6	6,3
			2022	2,2	4,6	3,4	3,9	8,5	6,2
D99	Andere ziekte(n) spijsverteringsorganen	Langdurig	2018	2,7	3,3	3,0	5,1	6,1	5,6
			2019	2,8	3,3	3,1	5,2	6,1	5,6
			2020	2,5	3,0	2,8	5,0	6,0	5,5
			2021	2,8	3,4	3,1	5,2	6,2	5,7

			2022	2,7	3,4	3,1	5,2	6,5	5,8
F01	Pijn oog	Acuut	2018	1,1	1,7	1,4	1,1	1,5	1,3
			2019	1,0	1,6	1,3	1,0	1,5	1,2
			2020	1,3	1,9	1,6	1,3	1,8	1,5
			2021	1,1	1,8	1,5	1,1	1,7	1,4
			2022	1,2	1,8	1,5	1,1	1,6	1,3
F02	Rood oog	Acuut	2018	4,1	4,9	4,5	3,6	4,3	4,0
			2019	4,4	5,2	4,8	3,9	4,4	4,1
			2020	4,3	5,3	4,8	3,8	4,5	4,2
			2021	4,7	5,5	5,1	4,2	4,7	4,5
			2022	5,1	5,8	5,5	4,7	5,2	4,9
F03	Afscheiding uit oog	Acuut	2018	2,2	3,5	2,9	2,0	3,0	2,5
			2019	2,4	3,8	3,1	2,0	3,2	2,6
			2020	2,0	3,1	2,5	1,7	2,5	2,1
			2021	2,3	3,5	2,9	2,0	2,8	2,4
			2022	2,5	3,5	3,0	2,2	3,0	2,6
F04	Mouches volantes/flitsen/flikkeringen	Acuut	2018	3,3	5,0	4,1	2,8	4,4	3,6
			2019	3,3	4,9	4,1	2,8	4,3	3,5
			2020	3,0	4,5	3,8	2,5	3,9	3,2
			2021	3,4	5,1	4,3	3,0	4,3	3,6
			2022	3,4	5,2	4,3	2,9	4,4	3,6
F05	Andere visussymptomen/-klachten [ex. F94]	Acuut	2018	12,3	15,9	14,1	11,4	14,3	12,9
			2019	12,5	16,3	14,4	11,3	14,7	13,0
			2020	11,0	14,3	12,7	10,1	12,9	11,5
			2021	12,6	16,3	14,4	11,6	14,5	13,1
			2022	13,6	17,6	15,6	12,2	15,4	13,8
F13	Afwijkend gevoel aan oog	Acuut	2018	12,3	23,3	17,8	10,7	18,5	14,6
			2019	12,5	23,0	17,8	10,8	18,1	14,5
			2020	12,0	22,1	17,0	10,2	17,0	13,6
			2021	12,8	23,7	18,3	11,0	18,2	14,6
			2022	12,7	23,4	18,1	10,9	18,1	14,5
F14	Afwijkende oogbewegingen	Acuut	2018	0,6	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5

			2019	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6
			2020	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
			2021	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
			2022	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6
F15	Afwijkend aspect oog	Acuut	2018	1,5	2,2	1,9	1,4	2,0	1,7
			2019	1,7	2,4	2,0	1,5	2,2	1,9
			2020	1,5	2,3	1,9	1,4	2,1	1,8
			2021	2,0	2,7	2,4	1,9	2,5	2,2
			2022	2,0	2,9	2,4	1,8	2,6	2,2
F16	Symptomen/klachten oogleden	Acuut	2018	3,4	6,8	5,1	2,8	5,4	4,1
			2019	3,7	7,1	5,4	3,0	5,7	4,3
			2020	4,2	7,4	5,8	3,5	6,2	4,8
			2021	4,0	7,5	5,8	3,3	6,2	4,7
			2022	4,2	7,3	5,8	3,5	6,0	4,8
F17	Symptomen/klachten van bril	Acuut	2018	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2019	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
			2020	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2021	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,5	0,7	0,6	0,4	0,6	0,5
F18	Symptomen/klachten van contactlens	Acuut	2018	<0,1	0,2	0,2	<0,1	0,2	0,1
			2019	0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
F27	Angst voor ziekte oog	Acuut	2018	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
			2019	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
			2020	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3
			2022	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
F28	Functiebeperking/handicap oog/adnexen	Chronisch	2018	0,2	0,2	0,2	2,5	2,8	2,7
			2019	0,2	0,2	0,2	2,4	2,7	2,6
			2020	0,2	0,2	0,2	2,6	2,9	2,8

			2021	0,2	0,2	0,2	2,8	3,1	3,0
			2022	0,2	0,2	0,2	2,8	3,1	2,9
F29	Andere symptomen/klachten oog/adnexen	Acuut	2018	1,1	1,9	1,5	1,0	1,5	1,3
			2019	1,2	1,8	1,5	1,1	1,6	1,3
			2020	1,0	1,5	1,3	0,8	1,3	1,1
			2021	1,0	1,5	1,3	0,9	1,3	1,1
			2022	1,0	1,8	1,4	0,9	1,5	1,2
F70	Infectieuze conjunctivitis	Acuut	2018	14,3	17,6	16,0	12,9	15,6	14,3
			2019	13,6	17,3	15,5	12,2	15,1	13,7
			2020	10,3	13,2	11,8	9,2	11,4	10,3
			2021	10,3	12,1	11,2	9,1	10,2	9,6
			2022	11,4	14,1	12,8	10,4	12,3	11,3
F71	Allergische/niet-gespecificeerde conjunctivitis	Langdurig	2018	5,1	6,3	5,7	8,4	11,0	9,7
			2019	4,4	5,9	5,1	7,3	10,1	8,7
			2020	3,8	5,1	4,5	6,6	9,5	8,1
			2021	4,3	5,3	4,8	7,0	9,1	8,0
			2022	3,4	4,3	3,9	6,2	8,1	7,2
F72	Blepharitis/hordeolum/chalazion	Acuut	2018	13,6	17,6	15,6	14,9	19,4	17,2
			2019	13,5	17,2	15,4	14,8	18,8	16,8
			2020	11,7	15,9	13,8	13,2	17,7	15,4
			2021	12,1	15,8	14,0	13,3	17,6	15,4
			2022	11,7	15,5	13,6	13,0	17,3	15,1
F73	Andere infectie/ontsteking oog/adnexen [ex. F85,F86]	Acuut	2018	3,2	4,4	3,8	2,9	3,9	3,4
			2019	3,0	4,3	3,6	2,8	3,9	3,3
			2020	3,0	4,2	3,6	2,8	3,8	3,3
			2021	3,2	4,5	3,8	3,0	4,1	3,5
			2022	3,4	4,8	4,1	3,2	4,4	3,8
F74	Neoplasma oog/adnexen	Acuut	2018	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2020	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

F75	Kneuzing/bloeding oog/adnexen	Acuut	2018	2,7	2,5	2,6	2,6	2,3	2,4
			2019	2,4	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3
			2020	2,2	2,2	2,2	2,0	2,1	2,0
			2021	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
			2022	2,3	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1
F76	Corpus alienum oog	Acuut	2018	5,5	1,9	3,7	5,3	1,8	3,5
			2019	6,3	1,9	4,1	6,0	1,8	3,9
			2020	6,5	1,7	4,1	6,2	1,7	4,0
			2021	6,0	1,8	3,9	5,7	1,7	3,7
			2022	5,9	1,9	3,9	5,7	1,8	3,7
F79	Ander letsel oog/adnexen	Acuut	2018	3,6	3,0	3,3	3,2	2,6	2,9
			2019	3,8	3,1	3,5	3,5	2,6	3,0
			2020	3,8	3,0	3,4	3,4	2,5	3,0
			2021	4,0	3,0	3,5	3,6	2,6	3,1
			2022	4,0	3,3	3,7	3,6	2,7	3,2
F80	Stenose traankanaal zuigeling	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
			2022	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
F81	Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen	Chronisch	2018	0,2	0,2	0,2	2,6	2,5	2,5
			2019	0,1	0,2	0,2	2,4	2,6	2,5
			2020	0,1	0,1	0,1	2,6	2,9	2,7
			2021	0,2	0,2	0,2	2,8	2,9	2,9
			2022	0,1	0,2	0,1	2,7	3,0	2,8
F82	Netvliesloslating	Langdurig	2018	1,0	0,9	1,0	1,7	1,6	1,6
			2019	0,9	0,9	0,9	1,7	1,5	1,6
			2020	0,9	0,8	0,9	1,7	1,5	1,6
			2021	1,0	0,9	0,9	1,7	1,5	1,6
			2022	0,9	0,8	0,9	1,6	1,5	1,6
F83	Retinopathie	Chronisch	2018	0,7	0,6	0,7	8,8	7,5	8,2
			2019	0,7	0,6	0,6	8,9	7,5	8,2

			2020	0,6	0,5	0,5	9,3	7,6	8,5
			2021	0,7	0,6	0,7	9,3	7,5	8,4
			2022	0,7	0,6	0,6	9,1	7,4	8,3
F84	Maculadegeneratie	Chronisch	2018	0,7	0,9	0,8	6,0	9,4	7,7
			2019	0,7	1,0	0,8	6,0	9,5	7,8
			2020	0,5	0,8	0,7	6,3	9,7	8,0
			2021	0,7	0,9	0,8	6,7	1<0,1	8,3
			2022	0,7	0,9	0,8	6,7	10,2	8,5
F85	Ulcus corneae	Acuut	2018	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2019	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2020	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9
			2021	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
			2022	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0
F86	Trachoom	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
F91	Refractie afwijking(en)	Chronisch	2018	4,2	5,4	4,8	45,7	57,6	51,7
			2019	3,8	4,9	4,4	45,4	56,9	51,2
			2020	3,0	3,7	3,3	47,6	59,8	53,7
			2021	3,6	4,5	4,0	50,6	63,7	57,2
			2022	3,3	4,4	3,8	51,7	65,3	58,6
F92	Cataract/staar	Langdurig	2018	10,5	14,7	12,6	18,2	25,9	22,1
			2019	10,6	15,1	12,8	18,3	26,2	22,3
			2020	9,1	12,6	10,8	17,3	24,5	21,0
			2021	10,8	14,8	12,8	18,5	25,9	22,2
			2022	10,4	14,5	12,5	18,8	26,3	22,6
F93	Glaucoom/verhoogde oogdruk	Chronisch	2018	1,3	1,7	1,5	16,0	20,5	18,3
			2019	1,5	1,8	1,6	16,6	21,3	18,9
			2020	1,0	1,3	1,2	16,9	21,9	19,4
			2021	1,3	1,5	1,4	17,9	22,8	20,4

			2022	1,3	1,6	1,4	18,3	23,4	20,9
F94	Blindheid (elke graad/vorm)	Chronisch	2018	0,1	0,1	0,1	2,1	2,0	2,0
			2019	0,1	0,1	0,1	2,1	1,9	2,0
			2020	0,1	0,1	0,1	2,2	2,0	2,1
			2021	0,1	<0,1	0,1	2,1	1,9	2,0
			2022	<0,1	0,1	0,1	2,1	1,9	2,0
F95	Strabismus/scheelzien	Langdurig	2018	0,7	0,9	0,8	1,2	1,4	1,3
			2019	0,7	0,8	0,8	1,2	1,4	1,3
			2020	0,7	0,7	0,7	1,1	1,3	1,2
			2021	0,8	0,8	0,8	1,2	1,4	1,3
			2022	0,6	0,7	0,7	1,1	1,3	1,2
F99	Andere ziekte(n) oog/adnexen	Langdurig	2018	6,0	9,1	7,5	10,2	16,4	13,3
			2019	5,9	8,9	7,4	1<0,1	15,8	12,9
			2020	4,8	7,2	6,0	9,0	14,5	11,8
			2021	5,5	8,2	6,8	9,5	15,2	12,4
			2022	5,6	8,5	7,1	9,8	15,6	12,7
H01	Oorpijn	Acuut	2018	9,1	13,4	11,2	8,4	12,2	10,4
			2019	8,6	13,1	10,9	7,8	11,9	9,9
			2020	8,1	12,2	10,1	7,5	11,1	9,3
			2021	8,4	12,4	10,5	7,6	11,2	9,4
			2022	10,2	15,1	12,6	9,3	13,5	11,4
H02	Gehoorklachten [ex. H84,H85,H86]	Acuut	2018	8,6	8,7	8,6	8,0	8,1	8,0
			2019	8,8	8,7	8,7	8,3	8,0	8,1
			2020	7,2	7,2	7,2	6,9	6,8	6,8
			2021	7,4	7,4	7,4	7,2	7,0	7,1
			2022	8,8	8,8	8,8	8,2	8,3	8,2
H03	Oorsuizen/tinnitus	Langdurig	2018	4,3	3,9	4,1	7,4	6,8	7,1
			2019	4,3	4,0	4,1	7,0	6,5	6,7
			2020	4,0	3,6	3,8	6,8	6,2	6,5
			2021	4,6	4,1	4,4	7,5	6,7	7,1
			2022	4,3	3,9	4,1	7,2	6,7	7,0
H04	Afscheiding uit oor	Acuut	2018	3,5	3,3	3,4	2,8	2,7	2,7

			2019	3,6	3,2	3,4	2,8	2,6	2,7
			2020	2,6	2,5	2,6	2,2	2,0	2,1
			2021	2,4	2,3	2,3	2,0	1,9	1,9
			2022	3,5	3,4	3,4	2,9	2,7	2,8
H05	Bloed in/uit oor	Acuut	2018	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
			2019	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2020	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
			2021	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2022	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
H13	Verstopt gevoel oor	Acuut	2018	4,4	5,9	5,1	3,9	5,3	4,6
			2019	4,9	6,4	5,7	4,4	5,8	5,1
			2020	4,4	5,6	5,0	4,0	4,9	4,5
			2021	5,2	6,6	5,9	4,7	5,9	5,3
			2022	6,5	8,1	7,3	5,9	7,3	6,6
H15	Ontevreden/bezorgd over aspect oor	Acuut	2018	0,9	1,1	1,0	0,8	1,0	0,9
			2019	0,8	1,2	1,0	0,7	1,1	0,9
			2020	0,6	1,1	0,9	0,6	0,9	0,7
			2021	0,9	1,2	1,0	0,8	1,0	0,9
			2022	0,9	1,2	1,1	0,8	1,1	0,9
H27	Angst voor ziekte oor	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
H28	Functiebeperking/handicap oor	Chronisch	2018	0,1	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,4	1,4
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	1,4	1,4
			2021	<0,1	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5
			2022	0,1	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5
H29	Andere symptomen/klachten oor	Acuut	2018	1,7	2,3	2,0	1,5	2,2	1,8
			2019	2,0	2,6	2,3	1,8	2,3	2,1
			2020	1,0	1,5	1,3	1,0	1,4	1,2

			2021	1,1	1,7	1,4	1,1	1,6	1,3
			2022	1,6	2,4	2,0	1,5	2,2	1,9
H70	Otitis externa	Acuut	2018	21,3	24,0	22,6	19,3	21,2	20,3
			2019	21,0	23,7	22,4	18,9	20,9	19,9
			2020	19,2	21,5	20,3	17,2	18,9	18,1
			2021	18,9	22,2	20,6	16,9	19,3	18,1
			2022	20,1	22,5	21,3	18,2	19,9	19,0
H71	Otitis media acuta/myringitis	Acuut	2018	21,3	20,6	21,0	19,6	19,4	19,5
			2019	20,6	19,8	20,2	19,0	18,7	18,8
			2020	12,8	12,1	12,4	12,9	12,3	12,6
			2021	15,7	14,5	15,1	13,6	12,8	13,2
			2022	20,9	19,9	20,4	18,4	18,0	18,2
H72	Otitis media met effusie	Acuut	2018	7,4	8,8	8,1	6,8	8,0	7,4
			2019	7,4	8,8	8,1	6,7	7,9	7,4
			2020	4,8	5,9	5,3	4,4	5,5	5,0
			2021	4,9	5,8	5,3	4,3	5,0	4,7
			2022	6,3	7,2	6,7	5,6	6,5	6,1
H73	Tubair catarre/tubastenose	Acuut	2018	5,2	7,7	6,5	4,9	7,0	5,9
			2019	4,9	7,3	6,1	4,5	6,6	5,6
			2020	3,7	5,3	4,5	3,3	4,7	4,0
			2021	3,7	5,7	4,7	3,3	4,9	4,1
			2022	4,4	6,7	5,6	3,9	5,9	4,9
H74	Chronische otitis media/andere infectie oor	Acuut	2018	1,8	1,6	1,7	1,5	1,4	1,5
			2019	1,8	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5
			2020	1,6	1,4	1,5	1,3	1,2	1,3
			2021	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4
			2022	1,8	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4
H75	Neoplasma oor	Acuut	2018	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2

H76	Corpus alienum in oor	Acuut	2018	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			2019	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			2020	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
			2021	1,2	1,3	1,2	1,1	1,3	1,2
			2022	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3
H77	Perforatie trommelvlies [ex. H71]	Langdurig	2018	1,3	1,3	1,3	2,1	2,2	2,2
			2019	1,3	1,2	1,2	2,1	2,1	2,1
			2020	1,1	0,9	1,0	2,0	1,8	1,9
			2021	1,1	1,1	1,1	1,9	1,8	1,9
			2022	1,2	1,2	1,2	2,1	2,0	2,0
H78	Oppervlakkig letsel oor	Acuut	2018	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
			2019	0,6	0,9	0,7	0,5	0,8	0,7
			2020	0,5	0,7	0,6	0,4	0,7	0,6
			2021	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
			2022	0,6	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7
H79	Ander letsel oor	Acuut	2018	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1
			2019	1,2	1,4	1,3	1,1	1,3	1,2
			2020	1,1	1,3	1,2	1,0	1,2	1,1
			2021	1,4	1,8	1,6	1,3	1,6	1,4
			2022	1,6	1,7	1,7	1,4	1,6	1,5
H80	Aangeboren afwijking(en) oor	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,6	1,5	1,6
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,5	1,5	1,5
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,7	1,6	1,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,7	1,7	1,7
			2022	<0,1	0,1	<0,1	1,7	1,7	1,7
H81	Overmatig cerumen	Acuut	2018	59,6	53,2	56,4	53,0	47,4	50,2
			2019	62,4	56,3	59,3	55,2	49,9	52,5
			2020	55,0	48,2	51,6	49,3	43,3	46,3
			2021	61,5	54,6	58,1	54,9	48,5	51,7
			2022	65,7	57,4	61,5	58,6	51,0	54,8
H82	Vertigosyndroom/labyrinthitis [ex. N17]	Langdurig	2018	6,5	12,3	9,4	10,8	20,9	15,9
			2019	6,0	11,7	8,9	10,1	19,5	14,8

			2020	5,7	10,4	8,1	9,7	18,7	14,2
			2021	5,8	11,0	8,4	9,7	18,5	14,1
			2022	5,6	10,7	8,2	9,5	18,3	13,9
H83	Otosclerose	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	1,1	0,8
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,1	0,8
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	1,2	0,9
H84	Presbycusis	Chronisch	2018	1,3	1,2	1,3	18,9	17,9	18,4
			2019	1,2	1,1	1,1	19,4	17,9	18,6
			2020	0,7	0,7	0,7	19,5	17,8	18,7
			2021	0,9	0,9	0,9	19,2	17,5	18,3
			2022	0,9	0,8	0,8	18,0	16,4	17,2
H85	Akoestisch letsel/lawaaidoofheid	Chronisch	2018	0,3	0,2	0,2	5,3	2,3	3,8
			2019	0,2	0,2	0,2	5,2	2,2	3,7
			2020	0,2	<0,1	0,2	5,7	2,4	4,0
			2021	0,2	0,1	0,2	5,6	2,3	3,9
			2022	0,2	0,1	0,2	5,3	2,3	3,8
H86	Doofheid/slechthorendheid	Chronisch	2018	2,2	2,2	2,2	24,2	24,2	24,2
			2019	2,1	2,0	2,0	24,3	23,8	24,0
			2020	1,6	1,5	1,6	25,5	24,9	25,2
			2021	1,8	1,8	1,8	26,3	25,8	26,1
			2022	2,0	1,9	1,9	26,7	26,2	26,5
H99	Andere ziekte(n) oor	Langdurig	2018	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7
			2019	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
			2020	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,7
			2021	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7
			2022	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
K01	Pijn toegeschreven aan hart	Acuut	2018	4,9	5,3	5,1	3,9	4,3	4,1
			2019	4,5	5,0	4,8	3,6	4,1	3,8
			2020	4,7	5,1	4,9	3,7	4,1	3,9
			2021	4,8	5,1	4,9	3,7	4,1	3,9

			2022	5,0	5,3	5,1	3,9	4,2	4,0
K02	Druk/beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02]	Acuut	2018	2,8	3,6	3,2	3,2	4,2	3,7
			2019	2,9	3,7	3,3	3,3	4,2	3,7
			2020	2,6	3,4	3,0	3,2	4,1	3,6
			2021	2,7	3,5	3,1	3,2	4,2	3,7
			2022	2,9	3,5	3,2	3,3	4,2	3,8
K03	Andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
K04	Hartkloppingen/bewust van hartslag	Acuut	2018	8,4	20,4	14,5	7,0	16,1	11,6
			2019	8,5	21,5	15,1	7,1	17,0	12,1
			2020	8,8	21,3	15,1	7,4	16,7	12,1
			2021	9,5	23,0	16,3	7,9	17,9	12,9
			2022	11,1	24,1	17,6	9,1	18,6	13,9
K05	Andere afwijkende/onregelmatige hartslag	Acuut	2018	1,7	2,0	1,8	2,0	2,2	2,1
			2019	1,8	2,1	1,9	2,0	2,4	2,2
			2020	1,7	1,9	1,8	2,1	2,3	2,2
			2021	1,9	2,0	2,0	2,2	2,4	2,3
			2022	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	2,4
K06	Opgezette aderen	Langdurig	2018	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3
			2019	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3
			2020	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
			2021	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4
			2022	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,4
K07	Gezwellen enkels/enkeloedeem	Acuut	2018	7,6	14,9	11,3	8,4	16,3	12,4
			2019	7,2	14,0	10,6	7,9	15,2	11,6
			2020	7,1	13,2	10,2	7,9	14,7	11,3
			2021	7,3	13,9	10,6	8,1	15,4	11,8
			2022	7,3	13,4	10,3	8,2	14,9	11,6
K24	Angst voor hartaanval	Acuut	2018	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3

			2019	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
			2020	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
			2021	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2022	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
K25	Angst voor hoge bloeddruk	Acuut	2018	1,6	2,6	2,1	1,4	2,3	1,8
			2019	1,5	2,5	2,0	1,3	2,1	1,7
			2020	1,3	2,0	1,6	1,1	1,7	1,4
			2021	1,3	2,1	1,7	1,1	1,7	1,4
			2022	1,3	1,9	1,6	1,1	1,6	1,3
K27	Angst voor andere ziekte hartvaatstelsel	Acuut	2018	1,9	2,1	2,0	1,6	1,7	1,7
			2019	1,7	2,0	1,9	1,5	1,6	1,6
			2020	1,4	1,5	1,5	1,2	1,3	1,2
			2021	1,3	1,5	1,4	1,1	1,2	1,2
			2022	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1
K28	Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,3	1,3
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,2	1,2
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	1,4	1,4
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,8	0,7	0,7
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
K29	Andere symptomen/klachten hartvaatstelsel	Acuut	2018	4,1	4,7	4,4	4,9	5,7	5,3
			2019	4,0	4,7	4,3	4,8	5,7	5,3
			2020	3,3	3,9	3,6	3,9	4,5	4,2
			2021	3,1	3,3	3,2	4,0	4,5	4,3
			2022	4,0	4,2	4,1	4,8	5,1	5,0
K70	Infectieziekte hartvaatstelsel	Acuut	2018	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5
			2019	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5
			2020	0,6	0,3	0,4	0,7	0,4	0,5
			2021	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5
			2022	0,7	0,3	0,5	0,8	0,4	0,6
K71	Acuut reuma/reumatische hartziekte	Acuut	2018	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
			2019	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2020	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

			2021	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
K72	Neoplasma hartvaatstelsel	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
K73	Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel	Chronisch	2018	0,2	0,2	0,2	4,3	4,4	4,4
			2019	0,2	0,2	0,2	4,2	4,4	4,3
			2020	0,2	0,2	0,2	4,3	4,6	4,5
			2021	0,2	0,2	0,2	4,6	4,8	4,7
			2022	0,2	0,2	0,2	4,6	4,8	4,7
K74	Angina pectoris	Chronisch	2018	1,9	1,7	1,8	28,3	22,4	25,4
			2019	1,9	1,6	1,7	27,1	21,5	24,3
			2020	1,6	1,4	1,5	27,1	21,5	24,3
			2021	1,8	1,3	1,5	27,3	21,5	24,4
			2022	1,7	1,4	1,5	26,8	20,8	23,8
K75	Acuut myocardinfarct	Langdurig	2018	5,8	2,4	4,1	20,9	8,3	14,6
			2019	6,0	2,7	4,4	20,8	8,3	14,5
			2020	5,5	2,4	3,9	20,9	8,4	14,6
			2021	5,5	2,4	4,0	21,2	8,5	14,8
			2022	5,4	2,3	3,9	20,8	8,4	14,6
K76	Andere/chronische ischemische hartziekte	Chronisch	2018	0,8	0,5	0,6	16,1	7,3	11,7
			2019	0,9	0,5	0,7	16,5	7,5	11,9
			2020	0,7	0,4	0,6	16,2	7,5	11,8
			2021	0,8	0,4	0,6	16,1	7,4	11,7
			2022	0,7	0,4	0,5	15,8	7,3	11,5
K77	Decompensatio cordis	Chronisch	2018	2,1	2,2	2,2	13,2	14,9	14,1
			2019	2,1	2,2	2,2	13,1	14,4	13,8
			2020	2,0	2,1	2,1	13,3	14,3	13,8
			2021	2,1	2,2	2,2	13,3	14,2	13,8
			2022	2,4	2,4	2,4	13,4	14,0	13,7

K78	Boezemfibrilleren/-fladderen	Langdurig	2018	7,6	6,1	6,8	22,0	17,9	2<0,1
			2019	8,6	6,6	7,6	23,3	18,6	20,9
			2020	7,6	5,8	6,7	23,0	18,2	20,6
			2021	8,1	6,0	7,0	24,0	18,8	21,4
			2022	8,1	6,2	7,1	24,5	19,3	21,9
K79	Paroxysmale tachycardie	Langdurig	2018	1,2	2,0	1,6	2,6	4,5	3,6
			2019	1,2	2,2	1,7	2,6	4,5	3,6
			2020	1,2	2,0	1,6	2,7	4,7	3,7
			2021	1,3	2,1	1,7	2,8	4,7	3,7
			2022	1,1	1,9	1,5	2,6	4,5	3,6
K80	Ectopische slagen/extrasystolen	Langdurig	2018	0,9	1,1	1,0	1,7	2,1	1,9
			2019	0,9	1,1	1,0	1,7	2,1	1,9
			2020	0,8	1,0	0,9	1,6	2,1	1,8
			2021	0,9	1,1	1,0	1,8	2,2	2,0
			2022	0,8	0,9	0,9	1,6	1,9	1,8
K81	Hartgeruis	Langdurig	2018	1,1	1,6	1,3	1,8	2,6	2,2
			2019	1,2	1,6	1,4	1,8	2,5	2,2
			2020	0,8	1,2	1,0	1,6	2,2	1,9
			2021	0,9	1,2	1,0	1,5	2,0	1,7
			2022	1,0	1,3	1,1	1,5	2,1	1,8
K82	Cor pulmonale	Chronisch	2018	<0,1	0,1	<0,1	0,5	0,8	0,6
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,7	0,6
K83	Niet-reumatische klepaandoening	Langdurig	2018	3,0	3,4	3,2	6,5	7,1	6,8
			2019	3,2	3,4	3,3	6,8	7,1	6,9
			2020	2,7	2,8	2,8	6,8	6,8	6,8
			2021	3,0	3,1	3,1	6,7	6,8	6,8
			2022	2,8	3,1	3,0	6,5	6,7	6,6
K84	Andere hartziekte(n)	Langdurig	2018	3,0	2,2	2,6	6,1	4,6	5,4
			2019	3,0	2,3	2,6	6,0	4,5	5,2

			2020	2,8	2,1	2,5	6,0	4,5	5,3
			2021	3,0	2,2	2,6	6,3	4,7	5,5
			2022	3,1	2,3	2,7	6,4	4,7	5,5
K85	Verhoogde bloeddruk [ex. K86,K87]	Acuut	2018	8,6	11,1	9,9	9,9	12,6	11,3
			2019	9,0	11,5	10,3	10,1	12,7	11,4
			2020	7,6	9,3	8,4	9,1	11,2	10,2
			2021	8,2	9,9	9,0	9,7	11,6	10,7
			2022	7,8	9,9	8,8	9,2	11,6	10,4
K86	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	Chronisch	2018	5,9	6,3	6,1	132,8	164,5	148,8
			2019	6,3	6,4	6,4	132,9	162,4	147,8
			2020	5,7	5,7	5,7	133,9	162,5	148,3
			2021	6,0	6,1	6,0	133,5	161,9	147,8
			2022	5,7	5,8	5,7	132,9	159,3	146,2
K87	Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie	Chronisch	2018	0,9	0,9	0,9	22,2	19,2	20,7
			2019	0,9	0,9	0,9	21,6	18,4	2<0,1
			2020	0,8	0,6	0,7	21,3	18,2	19,7
			2021	0,8	0,7	0,7	21,2	17,9	19,5
			2022	0,8	0,7	0,7	20,6	17,4	19,0
K88	Orthostatische hypotensie	Langdurig	2018	1,6	2,2	1,9	2,6	3,5	3,1
			2019	1,5	2,1	1,8	2,5	3,4	2,9
			2020	1,4	1,8	1,6	2,4	3,0	2,7
			2021	1,3	1,8	1,6	2,3	3,0	2,7
			2022	1,5	1,9	1,7	2,4	3,1	2,7
K89	Passagère cerebrale ischemie/TIA	Langdurig	2018	3,1	3,2	3,1	8,9	9,7	9,3
			2019	3,3	3,5	3,4	9,4	9,9	9,7
			2020	3,1	3,1	3,1	9,4	9,8	9,6
			2021	3,0	3,1	3,0	9,6	9,9	9,8
			2022	3,0	3,1	3,1	9,8	1<0,1	9,9
K90	Cerebrovasculair accident (CVA)	Chronisch	2018	2,3	2,3	2,3	21,2	20,1	20,7
			2019	2,3	2,2	2,2	21,2	19,6	20,4
			2020	2,3	2,1	2,2	22,0	2<0,1	20,9
			2021	2,3	2,3	2,3	22,2	20,2	21,2

			2022	2,2	2,2	2,2	22,3	20,4	21,4
K91	Atherosclerose [ex. K76,K90]	Chronisch	2018	0,6	0,5	0,6	14,4	12,3	13,3
			2019	0,5	0,3	0,4	12,7	10,4	11,6
			2020	0,5	0,4	0,5	12,1	10,1	11,1
			2021	0,6	0,4	0,5	13,1	11,5	12,3
			2022	0,6	0,4	0,5	14,6	12,6	13,6
K92	Andere ziekte(n) perifere arteriën	Chronisch	2018	2,3	2,3	2,3	25,0	25,0	25,0
			2019	2,5	2,4	2,4	23,6	23,5	23,5
			2020	2,1	1,9	2,0	24,4	24,7	24,5
			2021	3,4	2,8	3,1	25,7	25,5	25,6
			2022	2,1	2,0	2,1	25,1	25,2	25,2
K93	Longembolie/longinfarct	Langdurig	2018	1,2	1,3	1,3	2,6	2,9	2,7
			2019	1,2	1,4	1,3	2,5	2,9	2,7
			2020	1,2	1,3	1,3	2,7	2,9	2,8
			2021	1,3	1,5	1,4	3,0	3,1	3,0
			2022	1,2	1,3	1,3	3,0	3,0	3,0
K94	Thrombophlebitis/flebotrombose	Langdurig	2018	2,4	3,3	2,9	4,6	6,1	5,4
			2019	2,3	3,3	2,8	4,6	6,2	5,4
			2020	2,1	3,0	2,6	4,6	6,0	5,3
			2021	2,4	3,3	2,8	4,8	6,1	5,5
			2022	2,4	3,0	2,7	5,0	5,9	5,5
K95	Varices benen [ex. S97]	Langdurig	2018	3,5	9,5	6,5	5,6	15,6	10,6
			2019	3,2	8,7	6,0	5,4	14,4	9,9
			2020	2,7	6,6	4,7	4,8	12,5	8,7
			2021	3,1	7,9	5,5	4,9	12,7	8,8
			2022	3,2	8,1	5,7	5,1	13,2	9,2
K96	Hemorroïden	Langdurig	2018	7,0	1<0,1	8,5	11,7	16,7	14,2
			2019	6,8	9,7	8,3	11,1	16,0	13,6
			2020	5,9	8,7	7,3	10,3	15,2	12,7
			2021	6,3	9,6	8,0	10,5	15,9	13,2
			2022	6,4	9,3	7,9	10,7	16,1	13,4
K99	Andere ziekte(n) hartvaatstelsel	Langdurig	2018	3,8	2,6	3,2	8,1	5,3	6,7

			2019	4,0	2,7	3,3	8,3	5,3	6,8
			2020	3,8	2,5	3,1	8,3	5,1	6,7
			2021	3,9	2,6	3,2	8,6	5,4	7,0
			2022	4,1	2,6	3,4	8,7	5,5	7,1
L01	Nek symptomen/klachten [ex. N01]	Acuut	2018	18,2	29,3	23,8	16,8	26,3	21,6
			2019	17,9	28,4	23,2	16,4	25,6	21,0
			2020	15,2	23,5	19,4	14,2	21,6	17,9
			2021	15,2	23,8	19,5	13,9	21,7	17,8
			2022	14,6	21,9	18,3	13,5	19,8	16,7
L02	Rug symptomen/klachten	Acuut	2018	28,8	40,8	34,8	25,9	35,9	30,9
			2019	28,6	40,4	34,5	26,0	35,5	30,8
			2020	25,9	35,7	30,9	23,6	31,9	27,7
			2021	25,7	36,8	31,3	23,6	32,6	28,1
			2022	26,4	37,0	31,7	23,9	32,8	28,4
L03	Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]	Acuut	2018	32,5	39,3	35,9	29,1	33,9	31,5
			2019	30,8	36,3	33,6	27,7	31,6	29,7
			2020	26,7	31,6	29,2	24,1	27,8	25,9
			2021	27,0	32,4	29,7	23,8	28,0	25,9
			2022	26,0	30,9	28,4	23,0	26,6	24,8
L04	Borstkas symptomen/klachten	Acuut	2018	31,4	40,8	36,1	28,9	36,9	32,9
			2019	31,7	40,2	35,9	28,9	36,2	32,6
			2020	31,1	39,4	35,3	28,4	35,3	31,9
			2021	32,2	40,7	36,5	29,0	36,2	32,7
			2022	32,1	40,5	36,3	29,1	36,2	32,7
L05	Flank symptomen/klachten	Acuut	2018	3,7	5,4	4,6	3,6	5,2	4,4
			2019	3,5	5,4	4,4	3,4	5,1	4,3
			2020	3,4	5,0	4,2	3,4	4,9	4,1
			2021	3,4	5,1	4,2	3,3	4,9	4,1
			2022	3,4	5,0	4,2	3,3	4,8	4,0
L06	Oksel symptomen/klachten	Acuut	2018	0,7	2,0	1,4	0,7	1,8	1,3
			2019	0,6	1,9	1,3	0,6	1,7	1,2
			2020	0,7	2,0	1,3	0,6	1,8	1,2

			2021	0,9	2,4	1,6	0,8	2,2	1,5
			2022	0,9	2,6	1,7	0,8	2,4	1,6
L07	Kaak(gewricht) symptomen/klachten	Acuut	2018	3,5	6,4	4,9	3,1	5,4	4,3
			2019	3,3	6,0	4,7	3,0	5,1	4,1
			2020	3,2	5,6	4,4	2,8	4,7	3,8
			2021	3,3	6,3	4,8	3,0	5,2	4,1
			2022	3,2	5,6	4,4	2,9	4,9	3,9
L08	Schouder symptomen/klachten	Acuut	2018	31,5	39,8	35,7	28,2	35,0	31,6
			2019	32,6	4<0,1	36,4	29,2	35,0	32,1
			2020	28,9	36,5	32,7	26,1	32,2	29,2
			2021	29,7	37,2	33,5	26,8	32,7	29,8
			2022	29,7	35,6	32,7	26,7	31,5	29,1
L09	Arm symptomen/klachten	Acuut	2018	6,3	9,6	8,0	6,2	9,2	7,7
			2019	6,5	9,9	8,3	6,2	9,4	7,8
			2020	6,1	9,6	7,9	6,0	9,1	7,6
			2021	6,7	10,4	8,6	6,5	9,9	8,2
			2022	6,4	9,5	8,0	6,2	9,2	7,7
L10	Elleboog symptomen/klachten	Acuut	2018	4,9	4,5	4,7	4,3	4,0	4,1
			2019	5,1	4,6	4,8	4,4	3,9	4,2
			2020	5,0	4,3	4,6	4,4	3,7	4,0
			2021	4,8	4,5	4,6	4,3	3,8	4,1
			2022	5,0	4,6	4,8	4,5	4,0	4,2
L11	Pols symptomen/klachten	Acuut	2018	8,4	12,3	10,3	7,4	10,2	8,8
			2019	8,6	12,4	10,5	7,5	10,3	8,9
			2020	7,7	11,3	9,5	6,7	9,4	8,1
			2021	8,2	12,1	10,1	7,1	1<0,1	8,5
			2022	8,8	11,8	10,3	7,7	9,8	8,8
L12	Hand/vinger symptomen/klachten	Acuut	2018	20,5	27,8	24,1	18,0	23,2	20,6
			2019	21,2	28,1	24,7	18,7	23,7	21,2
			2020	18,6	26,0	22,3	16,6	21,8	19,2
			2021	20,7	28,3	24,6	18,2	23,6	20,9
			2022	22,5	29,0	25,7	19,7	24,3	22,0

L13	Heup symptomen/klachten	Acuut	2018	1<0,1	19,7	14,9	9,1	17,3	13,2
			2019	10,1	20,1	15,1	9,2	17,8	13,5
			2020	9,2	18,0	13,7	8,5	16,2	12,4
			2021	9,8	19,1	14,5	8,9	16,7	12,8
			2022	10,4	2<0,1	15,2	9,4	17,4	13,4
L14	Been/dijbeen symptomen/klachten	Acuut	2018	19,2	27,8	23,6	17,8	25,0	21,4
			2019	19,6	28,4	24,0	18,0	25,3	21,7
			2020	17,4	25,7	21,6	16,2	23,2	19,7
			2021	19,0	28,2	23,7	17,7	25,2	21,5
			2022	19,8	27,8	23,9	18,3	24,8	21,6
L15	Knie symptomen/klachten	Acuut	2018	31,6	37,8	34,7	29,3	34,0	31,7
			2019	32,0	38,3	35,2	29,6	34,3	31,9
			2020	26,6	30,7	28,6	24,7	28,1	26,4
			2021	29,0	33,7	31,3	26,6	30,1	28,3
			2022	31,0	35,9	33,5	28,4	32,1	30,3
L16	Enkel symptomen/klachten	Acuut	2018	6,8	8,6	7,7	6,4	8,1	7,3
			2019	7,0	8,9	8,0	6,7	8,3	7,5
			2020	6,1	7,3	6,7	5,8	6,9	6,4
			2021	6,8	8,4	7,6	6,4	7,8	7,1
			2022	7,6	8,8	8,2	7,3	8,3	7,8
L17	Voet/teen symptomen/klachten	Acuut	2018	29,2	40,5	34,9	27,7	38,0	32,9
			2019	29,3	40,1	34,7	27,8	37,5	32,7
			2020	26,0	35,1	30,6	25,1	33,5	29,3
			2021	28,0	37,6	32,8	26,5	35,4	31,0
			2022	30,1	39,4	34,8	28,4	36,9	32,7
L18	Spierpijn	Acuut	2018	7,3	18,6	13,0	6,6	14,5	10,6
			2019	7,0	17,6	12,3	6,3	13,6	1<0,1
			2020	6,0	15,2	10,6	5,4	11,6	8,5
			2021	6,0	16,2	11,1	5,4	12,2	8,8
			2022	6,0	16,0	11,0	5,3	12,1	8,7
L19	Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde spieren	Acuut	2018	4,2	7,3	5,8	3,8	6,3	5,1
			2019	4,3	7,4	5,9	3,8	6,2	5,0

			2020	3,9	6,4	5,1	3,4	5,3	4,4
			2021	3,9	6,7	5,3	3,4	5,5	4,5
			2022	3,7	6,1	4,9	3,3	5,0	4,2
L20	Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde gewrichten	Acuut	2018	3,5	9,5	6,5	4,0	10,5	7,3
			2019	3,6	9,3	6,5	4,1	10,4	7,2
			2020	3,0	7,8	5,4	3,6	9,0	6,3
			2021	3,1	7,9	5,5	3,5	8,9	6,2
			2022	3,1	7,6	5,4	3,6	8,7	6,2
L26	Angst voor kanker bewegingsapparaat	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
L27	Angst voor andere ziekte bewegingsapparaat	Acuut	2018	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
			2019	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2020	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2021	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
L28	Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat	Chronisch	2018	0,5	0,6	0,5	4,1	4,7	4,4
			2019	0,5	0,5	0,5	4,2	4,8	4,5
			2020	0,4	0,4	0,4	4,3	4,9	4,6
			2021	0,5	0,5	0,5	4,6	5,1	4,8
			2022	0,5	0,5	0,5	4,7	5,1	4,9
L29	Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat	Acuut	2018	6,3	7,5	6,9	5,9	6,5	6,2
			2019	7,0	8,0	7,5	6,4	6,9	6,6
			2020	4,6	5,5	5,1	4,4	5,0	4,7
			2021	4,8	5,7	5,3	4,5	5,2	4,9
			2022	6,1	7,1	6,6	5,7	6,2	5,9
L70	Infectieziekte bewegingsapparaat	Acuut	2018	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
			2019	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4
			2020	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4
			2021	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4

			2022	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4
L71	Neoplasma bewegingsapparaat	Acuut	2018	0,5	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7
			2019	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
			2020	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
			2021	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
			2022	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
L72	Fractuur radius/ulna	Acuut	2018	3,9	6,0	5,0	3,6	5,4	4,5
			2019	3,7	5,6	4,6	3,5	4,9	4,2
			2020	3,5	5,4	4,5	3,4	4,9	4,1
			2021	3,7	6,3	5,0	3,4	5,4	4,4
			2022	3,8	5,9	4,9	3,6	5,3	4,5
L73	Fractuur tibia/fibula	Langdurig	2018	1,9	2,5	2,2	3,3	4,3	3,8
			2019	1,8	2,4	2,1	3,1	4,3	3,7
			2020	1,6	2,0	1,8	3,0	3,9	3,4
			2021	1,8	2,4	2,1	3,1	4,1	3,6
			2022	2,0	2,5	2,2	3,3	4,3	3,8
L74	Fractuur hand/voet	Acuut	2018	6,5	6,2	6,3	6,4	5,9	6,1
			2019	6,4	6,1	6,3	6,2	5,8	6,0
			2020	5,4	5,2	5,3	5,4	5,0	5,2
			2021	5,8	5,7	5,7	5,6	5,3	5,5
			2022	6,3	6,0	6,2	6,2	5,6	5,9
L75	Fractuur femur	Langdurig	2018	1,2	2,2	1,7	2,1	4,0	3,1
			2019	1,2	2,2	1,7	2,2	4,0	3,1
			2020	1,2	2,0	1,6	2,2	3,9	3,0
			2021	1,2	2,1	1,6	2,1	3,7	2,9
			2022	1,3	2,2	1,7	2,2	3,9	3,1
L76	Andere fractuur	Langdurig	2018	4,9	5,7	5,3	8,4	10,5	9,4
			2019	4,9	5,7	5,3	8,3	10,3	9,3
			2020	4,2	4,9	4,6	7,6	9,7	8,7
			2021	4,4	5,5	4,9	7,5	9,8	8,6
			2022	5,0	5,7	5,3	8,2	10,4	9,3
L77	Verstuiking/distorsie enkel	Acuut	2018	9,5	12,3	10,9	8,7	11,0	9,8

			2019	9,5	12,1	10,8	8,7	10,7	9,7
			2020	7,7	9,7	8,7	7,2	8,8	8,0
			2021	8,2	1<0,1	9,1	7,4	8,9	8,2
			2022	9,0	10,9	9,9	8,3	9,7	9,0
L78	Verstuiking/distorsie knie	Acuut	2018	5,3	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2
			2019	5,1	5,6	5,4	5,0	5,2	5,1
			2020	4,9	5,1	5,0	4,8	4,9	4,8
			2021	4,4	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3
			2022	5,3	4,9	5,1	5,0	4,7	4,9
L79	Andere verstuiking/distorsie	Acuut	2018	2,0	2,2	2,1	1,8	2,1	2,0
			2019	1,8	2,1	1,9	1,7	2,0	1,9
			2020	1,3	1,7	1,5	1,3	1,6	1,4
			2021	1,5	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5
			2022	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
L80	Luxatie/subluxatie	Acuut	2018	2,6	2,3	2,4	2,4	2,0	2,2
			2019	2,8	2,2	2,5	2,6	2,0	2,3
			2020	2,5	2,1	2,3	2,3	1,9	2,1
			2021	2,6	2,1	2,3	2,4	1,9	2,2
			2022	2,8	2,2	2,5	2,6	2,0	2,3
L81	Ander letsel bewegingsapparaat	Acuut	2018	27,4	26,1	26,7	24,3	22,8	23,5
			2019	25,4	24,6	25,0	22,5	21,5	22,0
			2020	21,1	20,3	20,7	18,6	17,8	18,2
			2021	21,9	20,8	21,3	19,3	18,1	18,7
			2022	24,5	21,7	23,1	21,7	19,1	20,4
L82	Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat	Chronisch	2018	0,7	0,8	0,8	12,2	15,3	13,8
			2019	0,7	0,7	0,7	12,1	15,4	13,8
			2020	0,6	0,7	0,6	13,1	16,5	14,8
			2021	0,6	0,6	0,6	13,7	16,8	15,3
			2022	0,6	0,6	0,6	13,6	16,6	15,1
L83	Syndroom cervicale wervelkolom	Langdurig	2018	2,3	2,7	2,5	4,5	5,2	4,8
			2019	2,1	2,5	2,3	4,2	4,8	4,5
			2020	1,8	2,2	2,0	3,8	4,6	4,2

			2021	1,8	2,0	1,9	3,5	4,0	3,8
			2022	1,7	2,0	1,9	3,5	3,9	3,7
L84	Artrose/spondylose wervelkolom	Chronisch	2018	0,8	1,5	1,1	11,9	22,7	17,3
			2019	0,8	1,4	1,1	12,1	22,2	17,2
			2020	0,6	1,0	0,8	12,4	22,6	17,5
			2021	0,6	1,3	0,9	12,3	22,8	17,6
			2022	0,6	1,2	0,9	12,2	22,6	17,4
L85	Verworven afwijking(en) wervelkolom	Chronisch	2018	0,4	0,7	0,6	8,2	12,3	10,3
			2019	0,4	0,6	0,5	8,2	12,3	10,3
			2020	0,3	0,5	0,4	8,4	12,7	10,6
			2021	0,3	0,6	0,5	8,6	12,9	10,8
			2022	0,4	0,5	0,5	8,7	13,2	10,9
L86	Lage-rugpijn met uitstraling	Langdurig	2018	13,2	16,6	14,9	25,7	32,9	29,3
			2019	13,6	16,1	14,9	25,4	31,5	28,5
			2020	11,6	14,4	13,0	23,9	30,1	27,0
			2021	12,2	15,1	13,7	23,0	29,7	26,4
			2022	11,8	14,5	13,2	23,2	29,3	26,3
L87	Ganglion gewricht/pees	Acuut	2018	3,2	5,7	4,5	3,2	5,4	4,3
			2019	3,3	5,5	4,4	3,2	5,2	4,2
			2020	2,6	4,7	3,7	2,6	4,5	3,6
			2021	3,0	5,1	4,1	2,8	4,9	3,9
			2022	3,0	5,2	4,1	2,9	4,9	3,9
L88	Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)	Chronisch	2018	0,5	0,9	0,7	11,0	18,9	15,0
			2019	0,5	0,8	0,7	11,2	18,6	15,0
			2020	0,6	0,8	0,7	11,5	19,1	15,3
			2021	0,5	0,8	0,7	11,6	19,1	15,4
			2022	0,6	0,8	0,7	11,7	19,0	15,4
L89	Coxartrose	Chronisch	2018	1,4	2,2	1,8	18,8	33,3	26,1
			2019	1,3	2,1	1,7	19,6	33,4	26,5
			2020	1,0	1,7	1,4	20,2	34,4	27,3
			2021	1,3	2,0	1,6	20,5	34,8	27,7
			2022	1,3	2,0	1,7	20,5	34,6	27,6

L90	Gonartrose	Chronisch	2018	2,1	3,6	2,9	28,9	51,4	40,2
			2019	2,2	3,4	2,8	30,1	51,0	40,6
			2020	1,8	2,9	2,3	31,9	53,5	42,8
			2021	1,9	3,1	2,5	32,5	54,4	43,5
			2022	2,1	3,2	2,6	32,8	54,1	43,5
L91	Andere artrose/verwante aandoening(en)	Chronisch	2018	1,8	3,8	2,8	20,8	49,7	35,3
			2019	1,7	3,8	2,7	21,3	49,7	35,6
			2020	1,4	2,9	2,2	22,5	52,1	37,4
			2021	1,6	3,3	2,5	23,3	53,4	38,5
			2022	1,5	3,3	2,4	23,3	53,6	38,5
L92	Schouder syndroom/PHS	Langdurig	2018	8,3	10,8	9,6	14,7	19,8	17,3
			2019	7,9	10,1	9,0	13,8	17,9	15,9
			2020	6,7	8,6	7,7	12,7	16,6	14,6
			2021	6,5	8,5	7,5	11,5	15,6	13,6
			2022	6,1	7,7	6,9	10,8	14,1	12,4
L93	Epicondylitis lateralis	Langdurig	2018	5,1	5,0	5,1	8,2	8,1	8,2
			2019	4,7	4,7	4,7	7,5	7,6	7,6
			2020	3,8	3,6	3,7	6,5	6,4	6,5
			2021	3,7	3,6	3,7	6,1	5,9	6,0
			2022	3,5	3,5	3,5	5,6	5,6	5,6
L94	Osgood-Schlatter/andere osteochondropathie	Langdurig	2018	0,7	0,3	0,5	1,1	0,6	0,9
			2019	0,6	0,4	0,5	1,0	0,6	0,8
			2020	0,5	0,3	0,4	0,8	0,5	0,7
			2021	0,4	0,3	0,4	0,8	0,5	0,6
			2022	0,5	0,3	0,4	0,8	0,5	0,7
L95	Osteoporose	Chronisch	2018	1,0	3,3	2,1	9,0	48,2	28,8
			2019	0,9	3,6	2,3	9,3	48,8	29,2
			2020	0,8	2,7	1,8	9,4	48,5	29,1
			2021	1,0	3,5	2,3	10,2	50,8	30,6
			2022	1,0	3,4	2,2	10,3	51,7	31,1
L96	Acuut letsel meniscus/kniebanden	Acuut	2018	4,5	3,4	3,9	4,0	2,9	3,4
			2019	4,2	3,1	3,6	3,7	2,7	3,2

			2020	3,7	2,8	3,2	3,2	2,4	2,8
			2021	3,5	2,4	3,0	3,1	2,1	2,6
			2022	3,7	2,6	3,1	3,1	2,2	2,7
L97	Chronisch inwendig trauma knie	Langdurig	2018	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3
			2019	0,6	0,6	0,6	1,1	1,0	1,1
			2020	0,7	0,6	0,6	1,1	1,0	1,1
			2021	0,5	0,5	0,5	1,0	0,9	1,0
			2022	0,5	0,4	0,5	0,9	0,8	0,9
L98	Verworven afwijking(en) extremiteiten	Chronisch	2018	2,5	4,2	3,3	35,3	60,3	47,9
			2019	2,4	3,5	2,9	35,0	58,6	46,9
			2020	1,7	2,6	2,1	36,5	61,1	48,9
			2021	1,9	3,1	2,5	38,2	63,2	50,8
			2022	2,1	3,0	2,5	38,7	63,4	51,1
L99	Andere ziekte(n) bewegingsapparaat	Langdurig	2018	26,2	32,8	29,6	45,3	59,8	52,6
			2019	25,6	31,9	28,8	43,8	56,7	50,3
			2020	21,0	26,0	23,5	39,2	51,2	45,2
			2021	22,3	28,1	25,2	38,6	50,7	44,7
			2022	23,0	27,6	25,3	42,1	52,7	47,4
N01	Hoofdpijn [ex. N02,N89,R09]	Acuut	2018	15,2	28,8	22,1	13,9	25,2	19,6
			2019	14,8	28,7	21,8	13,3	24,7	19,0
			2020	14,1	27,7	20,9	12,9	23,8	18,4
			2021	14,7	28,2	21,5	13,2	24,4	18,8
			2022	15,2	28,5	21,9	13,8	24,4	19,1
N02	Spanningshoofdpijn	Acuut	2018	3,6	9,0	6,3	3,2	7,6	5,4
			2019	3,6	8,5	6,1	3,1	7,2	5,2
			2020	3,0	7,6	5,3	2,6	6,3	4,5
			2021	3,3	7,5	5,4	2,8	6,3	4,5
			2022	2,9	7,1	5,0	2,6	5,9	4,2
N03	Aangezichtspijn	Acuut	2018	0,4	1,0	0,7	0,5	1,2	0,8
			2019	0,4	1,1	0,8	0,5	1,2	0,9
			2020	0,4	0,9	0,7	0,5	1,1	0,8
			2021	0,4	1,0	0,7	0,5	1,2	0,8

			2022	0,4	1,0	0,7	0,5	1,1	0,8
N04	Restless legs	Langdurig	2018	0,9	2,0	1,4	1,9	4,4	3,2
			2019	0,9	2,0	1,4	1,8	4,5	3,2
			2020	0,8	1,9	1,4	1,9	4,3	3,1
			2021	0,8	1,9	1,4	1,8	4,3	3,1
			2022	0,8	1,9	1,3	1,8	4,4	3,1
N05	Tintelen vingers/voeten/tenen	Acuut	2018	2,8	4,1	3,5	2,7	3,8	3,2
			2019	2,8	4,3	3,6	2,7	4,0	3,4
			2020	3,0	4,1	3,5	2,8	3,8	3,3
			2021	3,1	4,6	3,8	2,9	4,2	3,6
			2022	3,1	4,4	3,7	2,9	4,1	3,5
N06	Andere sensibiliteitstoornis/onwillekeurige bewegingen	Acuut	2018	6,1	7,3	6,7	5,0	6,2	5,6
			2019	6,0	7,6	6,8	5,0	6,2	5,6
			2020	5,8	6,9	6,3	4,6	5,8	5,2
			2021	6,3	7,7	7,0	5,2	6,3	5,7
			2022	6,6	8,0	7,3	5,3	6,6	5,9
N07	Convulsies/stuipen (inclusief koorts-)	Acuut	2018	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
			2019	0,9	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7
			2020	0,8	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6
			2021	0,8	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6
			2022	1,1	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8
N16	Andere afwijking(en) reuk/smaak	Acuut	2018	0,7	1,0	0,9	0,6	0,9	0,8
			2019	0,7	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7
			2020	0,9	1,2	1,1	0,8	1,1	0,9
			2021	0,8	1,4	1,1	0,8	1,2	1,0
			2022	0,7	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8
N17	Vertigo/duizeligheid [ex. H82]	Acuut	2018	11,7	22,9	17,4	10,7	20,7	15,7
			2019	12,1	23,2	17,7	11,0	20,9	16,0
			2020	11,7	22,1	16,9	10,7	2<0,1	15,4
			2021	12,0	23,3	17,7	11,0	21,1	16,1
			2022	12,4	23,7	18,1	11,3	21,5	16,4
N18	Verlamming/krachtverlies [ex. A04]	Acuut	2018	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0

			2019	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
			2020	1,2	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0
			2021	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2
			2022	1,6	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3
N19	Spraak-/fonatiestoornis	Langdurig	2018	3,6	2,6	3,1	6,3	4,5	5,4
			2019	3,6	2,6	3,1	6,3	4,5	5,4
			2020	3,3	2,4	2,8	6,2	4,4	5,3
			2021	3,5	2,3	2,9	6,1	4,2	5,1
			2022	3,2	2,3	2,7	5,7	4,0	4,8
N26	Angst voor kanker zenuwstelsel	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
N27	Angst voor andere ziekte zenuwstelsel	Acuut	2018	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2019	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
N28	Functiebeperking/handicap zenuwstelsel	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,6	0,6
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,6	0,6
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,6	0,7
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,7	0,7	0,7
N29	Andere symptomen/klachten zenuwstelsel	Acuut	2018	1,6	1,7	1,7	1,3	1,4	1,3
			2019	1,6	1,8	1,7	1,3	1,4	1,4
			2020	1,4	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2
			2021	1,5	1,7	1,6	1,2	1,3	1,3
			2022	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3
N70	Poliomyelitis/andere enterovirus infectie	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,5
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,5

			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,5
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,5	0,4
N71	Meningitis/encephalitis	Langdurig	2018	0,4	0,3	0,4	0,7	0,6	0,6
			2019	0,3	0,3	0,3	0,7	0,6	0,6
			2020	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
			2021	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
			2022	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
N72	Tetanus	Acuut	2018	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2019	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
			2020	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2021	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2022	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
N73	Andere infectieziekte(n) zenuwstelsel	Langdurig	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
N74	Maligniteit zenuwstelsel	Chronisch	2018	0,1	0,1	0,1	0,8	0,8	0,8
			2019	0,1	0,1	0,1	0,8	0,8	0,8
			2020	0,2	0,1	0,1	0,9	0,8	0,8
			2021	0,1	0,1	0,1	0,9	0,8	0,8
			2022	0,2	<0,1	0,1	0,9	0,8	0,8
N75	Benigne neoplasma zenuwstelsel	Acuut	2018	0,8	1,5	1,1	0,9	1,6	1,2
			2019	0,8	1,5	1,2	0,9	1,6	1,3
			2020	0,8	1,5	1,1	0,9	1,6	1,2
			2021	0,9	1,5	1,2	1,0	1,7	1,3
			2022	0,9	1,6	1,3	1,0	1,7	1,4
N76	Niet-gespecificeerd neoplasma zenuwstelsel	Acuut	2018	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
			2020	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

N79	Hersenschudding	Acuut	2018	3,7	4,4	4,1	3,4	3,8	3,6
			2019	4,7	5,5	5,1	4,3	4,7	4,5
			2020	4,3	5,3	4,8	4,0	4,6	4,3
			2021	4,7	5,9	5,3	4,3	5,1	4,7
			2022	5,6	6,6	6,1	5,1	5,7	5,4
N80	Ander letsel hoofd [ex. L76]	Acuut	2018	5,4	4,9	5,2	5,4	5,0	5,2
			2019	4,8	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6
			2020	4,5	4,2	4,4	4,4	4,2	4,3
			2021	4,8	4,7	4,8	4,8	4,6	4,7
			2022	5,1	4,6	4,9	5,0	4,6	4,8
N81	Ander letsel zenuwstelsel	Acuut	2018	0,7	0,4	0,5	0,8	0,5	0,6
			2019	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
			2020	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6
			2021	0,6	0,4	0,5	0,7	0,5	0,6
			2022	0,5	0,4	0,4	0,7	0,5	0,6
N85	Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,2	1,3
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,2	1,2
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,2	1,2
N86	Multiple sclerose	Chronisch	2018	<0,1	0,1	<0,1	1,2	2,9	2,0
			2019	<0,1	0,1	<0,1	1,2	2,9	2,0
			2020	<0,1	0,1	<0,1	1,2	2,9	2,0
			2021	<0,1	0,1	<0,1	1,2	3,0	2,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	3,0	2,1
N87	Parkinsonisme, ziekte van Parkinson	Chronisch	2018	0,4	0,2	0,3	3,6	2,5	3,0
			2019	0,5	0,2	0,4	3,7	2,5	3,1
			2020	0,4	0,2	0,3	3,7	2,4	3,0
			2021	0,5	0,2	0,3	3,7	2,4	3,0
			2022	0,4	0,2	0,3	3,7	2,4	3,0
N88	Epilepsie (alle vormen)	Chronisch	2018	0,8	0,6	0,7	12,7	10,9	11,8
			2019	0,7	0,6	0,6	12,3	10,8	11,6

			2020	0,7	0,6	0,6	12,7	11,0	11,8
			2021	0,7	0,5	0,6	12,9	11,3	12,1
			2022	0,7	0,6	0,6	13,0	11,4	12,2
N89	Migraine	Langdurig	2018	3,3	10,4	6,9	6,8	25,0	16,0
			2019	3,5	11,1	7,3	7,0	25,2	16,1
			2020	3,1	10,1	6,6	6,8	24,8	15,8
			2021	3,3	10,8	7,0	6,9	25,3	16,2
			2022	3,2	10,3	6,8	7,0	25,4	16,2
N90	Cluster headache	Langdurig	2018	0,4	0,3	0,4	1,0	0,5	0,8
			2019	0,4	0,3	0,4	0,9	0,5	0,7
			2020	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
			2021	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
			2022	0,4	0,2	0,3	0,9	0,5	0,7
N91	Facialis parese/Bell's palsy	Langdurig	2018	0,5	0,6	0,5	0,9	1,1	1,0
			2019	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9
			2020	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
			2021	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9
			2022	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,9
N92	Trigeminus neuralgie	Langdurig	2018	0,2	0,4	0,3	0,4	0,8	0,6
			2019	0,2	0,4	0,3	0,4	0,8	0,6
			2020	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6
			2021	0,2	0,3	0,2	0,4	0,7	0,5
			2022	0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	0,5
N93	Carpale tunnelsyndroom	Langdurig	2018	2,4	5,2	3,8	4,2	9,2	6,7
			2019	2,4	5,3	3,9	4,2	9,0	6,6
			2020	2,3	4,5	3,4	4,0	8,5	6,3
			2021	2,4	4,6	3,5	4,2	8,4	6,3
			2022	2,3	4,7	3,5	4,1	8,3	6,2
N94	Andere perifere neuritis/neuropathie	Langdurig	2018	5,1	5,8	5,4	9,6	10,8	10,2
			2019	5,0	5,5	5,2	9,2	10,3	9,7
			2020	4,3	4,9	4,6	8,6	9,8	9,2
			2021	5,1	5,3	5,2	9,4	10,1	9,7

			2022	4,6	5,4	5,0	9,1	10,3	9,7
N99	Andere ziekte(n) zenuwstelsel	Langdurig	2018	1,1	1,1	1,1	2,6	2,5	2,6
			2019	1,0	1,1	1,1	2,4	2,5	2,4
			2020	1,0	1,0	1,0	2,4	2,4	2,4
			2021	1,0	1,0	1,0	2,3	2,4	2,4
			2022	0,9	1,0	0,9	2,3	2,4	2,4
P01	Angstig/nerveus/gespannen gevoel	Acuut	2018	9,2	18,7	14,0	10,5	21,9	16,3
			2019	9,6	20,4	15,0	11,1	23,0	17,1
			2020	8,7	18,7	13,7	10,3	22,1	16,2
			2021	8,9	19,4	14,2	10,4	23,0	16,8
			2022	9,1	19,8	14,5	10,8	23,8	17,3
P02	Crisis/voorbijgaande stressreactie	Acuut	2018	8,1	14,9	11,5	9,3	16,9	13,1
			2019	8,0	14,4	11,2	8,9	16,1	12,5
			2020	7,9	14,3	11,1	9,1	16,4	12,8
			2021	7,9	15,0	11,5	9,1	16,9	13,0
			2022	7,6	14,6	11,1	8,9	17,1	13,0
P03	Down/depressief gevoel	Acuut	2018	7,7	13,9	10,8	9,0	16,5	12,8
			2019	7,6	13,6	10,6	8,8	15,8	12,3
			2020	7,3	12,7	1<0,1	8,7	15,5	12,1
			2021	7,7	13,9	10,8	9,3	16,6	13,0
			2022	7,8	13,4	10,6	9,5	16,5	13,0
P04	Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag	Acuut	2018	4,3	3,8	4,0	3,6	3,0	3,3
			2019	3,6	3,1	3,4	3,0	2,5	2,8
			2020	3,7	2,9	3,3	3,1	2,4	2,8
			2021	4,7	4,2	4,4	3,8	3,2	3,5
			2022	2,9	2,1	2,5	2,5	1,8	2,1
P05	Zich oud voelen/gedragen	Acuut	2018	0,9	1,4	1,2	0,7	1,2	0,9
			2019	0,6	1,3	0,9	0,5	0,9	0,7
			2020	0,5	1,2	0,8	0,4	0,8	0,6
			2021	0,6	1,2	0,9	0,4	0,8	0,6
			2022	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4
P06	Slapeloosheid/andere slaapstoornis	Acuut	2018	21,0	29,5	25,3	24,1	34,3	29,2

			2019	21,6	28,8	25,2	24,3	33,0	28,7
			2020	2<0,1	26,9	23,5	23,2	31,7	27,5
			2021	20,7	27,0	23,8	23,7	32,3	28,0
			2022	21,0	27,1	24,1	24,1	32,1	28,1
P07	Libido verlies/vermindering	Acuut	2018	0,9	0,3	0,6	0,7	0,3	0,5
			2019	0,9	0,3	0,6	0,7	0,3	0,5
			2020	1,0	0,3	0,6	0,8	0,2	0,5
			2021	1,1	0,3	0,7	0,8	0,3	0,6
			2022	1,1	0,3	0,7	0,9	0,3	0,6
P08	Seksuele bevrediging verlies/vermindering	Acuut	2018	3,1	0,3	1,7	2,3	0,3	1,3
			2019	4,0	0,3	2,2	3,0	0,3	1,7
			2020	3,7	0,2	1,9	2,7	0,2	1,5
			2021	4,5	0,3	2,4	3,2	0,3	1,7
			2022	5,1	0,3	2,7	3,7	0,2	1,9
P09	Bezorgdheid over seksuele voorkeur	Acuut	2018	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
			2019	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
			2020	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
			2021	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
			2022	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
P10	Stamelen/stotteren/tics	Langdurig	2018	0,7	0,3	0,5	1,2	0,5	0,8
			2019	0,6	0,3	0,5	1,1	0,5	0,8
			2020	0,6	0,3	0,5	1,1	0,5	0,8
			2021	0,6	0,4	0,5	1,1	0,6	0,8
			2022	0,5	0,3	0,4	0,9	0,6	0,7
P11	Eetprobleem(en) bij kind	Langdurig	2018	0,5	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8
			2019	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8
			2020	0,4	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8
			2021	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	0,8
			2022	0,5	0,5	0,5	0,9	1,0	0,9
P12	Enuresis [ex. U04]	Langdurig	2018	1,1	0,6	0,9	2,1	1,1	1,6
			2019	1,1	0,6	0,8	2,0	1,1	1,5
			2020	0,8	0,5	0,6	1,6	0,9	1,3

			2021	0,8	0,5	0,7	1,5	0,9	1,2
			2022	0,8	0,5	0,6	1,5	0,9	1,2
P13	Encopresis	Langdurig	2018	0,1	<0,1	<0,1	0,2	<0,1	0,2
			2019	0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,2	0,1	0,2
P15	Chronisch alcoholmisbruik	Langdurig	2018	4,0	1,6	2,8	8,2	3,4	5,8
			2019	3,6	1,5	2,5	7,2	3,0	5,1
			2020	3,2	1,3	2,3	7,1	2,9	5,0
			2021	3,4	1,4	2,4	7,0	3,0	5,0
			2022	3,4	1,4	2,4	7,0	3,0	5,0
P16	Acuut alcohol misbruik/intoxicatie	Langdurig	2018	0,8	0,5	0,7	1,4	0,8	1,1
			2019	0,8	0,5	0,6	1,3	0,8	1,0
			2020	0,7	0,4	0,5	1,2	0,7	1,0
			2021	0,6	0,4	0,5	1,1	0,6	0,9
			2022	0,7	0,5	0,6	1,2	0,8	1,0
P17	Tabaksmisbruik	Langdurig	2018	9,2	9,1	9,1	15,1	15,4	15,3
			2019	8,8	8,5	8,7	15,0	14,7	14,9
			2020	9,2	8,4	8,8	15,2	14,3	14,8
			2021	7,5	6,8	7,1	13,5	12,6	13,0
			2022	7,0	6,6	6,8	12,4	11,9	12,1
P18	Geneesmiddelmisbruik	Langdurig	2018	0,9	1,5	1,2	1,8	3,1	2,5
			2019	0,9	1,3	1,1	1,7	2,9	2,3
			2020	0,8	1,2	1,0	1,7	3,0	2,3
			2021	0,7	1,2	1,0	1,7	2,9	2,3
			2022	0,8	1,2	1,0	1,7	2,8	2,3
P19	Drugsmisbruik	Langdurig	2018	3,6	1,0	2,3	6,9	1,9	4,4
			2019	3,6	1,0	2,3	6,6	1,8	4,2
			2020	3,3	0,9	2,1	6,8	1,9	4,3
			2021	3,2	1,0	2,1	6,5	2,0	4,2
			2022	3,1	1,0	2,0	6,4	1,9	4,2

P20	Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen	Langdurig	2018	5,2	5,9	5,6	9,4	11,0	10,2
			2019	5,3	6,0	5,7	9,6	10,9	10,3
			2020	4,8	5,4	5,1	9,2	10,5	9,8
			2021	5,3	6,2	5,8	9,5	11,1	10,3
			2022	5,5	6,5	6,0	10,1	11,8	10,9
P21	Overactief kind/hyperkinetisch syndroom	Langdurig	2018	6,3	3,6	4,9	15,9	8,4	12,1
			2019	6,9	3,9	5,4	16,4	8,9	12,6
			2020	6,6	4,0	5,3	16,8	9,6	13,2
			2021	7,3	4,8	6,1	17,4	10,8	14,1
			2022	7,3	5,6	6,4	18,2	12,6	15,4
P22	Andere zorgen gedrag kind	Langdurig	2018	4,7	4,8	4,7	8,7	8,3	8,5
			2019	4,5	4,6	4,5	8,3	7,8	8,1
			2020	4,1	4,1	4,1	7,8	7,6	7,7
			2021	4,4	4,6	4,5	8,0	7,9	8,0
			2022	4,4	4,4	4,4	8,1	7,8	7,9
P23	Andere zorgen gedrag adolescent	Langdurig	2018	0,9	0,8	0,9	1,7	1,4	1,6
			2019	0,9	0,7	0,8	1,5	1,3	1,4
			2020	0,8	0,6	0,7	1,5	1,2	1,3
			2021	0,7	0,6	0,7	1,4	1,1	1,3
			2022	0,7	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2
P24	Specifiek leerprobleem	Langdurig	2018	6,2	3,5	4,8	11,7	6,3	9,0
			2019	5,8	3,3	4,6	10,8	5,9	8,3
			2020	5,3	3,0	4,1	10,5	5,8	8,1
			2021	5,7	3,2	4,5	10,7	6,0	8,3
			2022	5,3	3,1	4,2	10,2	5,9	8,1
P25	Levensfaseprobleem volwassene	Langdurig	2018	0,5	0,7	0,6	0,9	1,4	1,1
			2019	0,5	0,7	0,6	0,8	1,3	1,1
			2020	0,5	0,7	0,6	0,9	1,3	1,1
			2021	0,4	0,6	0,5	0,8	1,2	1,0
			2022	0,4	0,6	0,5	0,8	1,1	0,9
P27	Angst voor psychische ziekte	Acuut	2018	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
			2019	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2

			2020	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
P28	Functiebeperking/handicap psychische ziekte	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,1	1,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,0	1,0
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,0	1,0
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,0	1,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,0	1,1
P29	Andere psychische symptomen/klachten	Acuut	2018	7,1	10,6	8,9	7,9	11,9	9,9
			2019	7,8	11,9	9,9	8,5	13,0	10,8
			2020	6,1	9,4	7,8	7,0	10,8	8,9
			2021	8,8	13,1	10,9	9,6	14,3	12,0
			2022	9,0	13,8	11,4	10,1	16,0	13,1
P70	Seniele dementie/Alzheimer	Chronisch	2018	1,0	1,4	1,2	5,2	8,0	6,6
			2019	0,9	1,4	1,2	5,2	8,0	6,6
			2020	0,9	1,4	1,1	5,1	8,0	6,6
			2021	1,0	1,5	1,2	5,2	8,1	6,6
			2022	1,0	1,5	1,3	5,3	8,1	6,7
P71	Andere organische psychose(n)	Langdurig	2018	1,2	1,4	1,3	2,1	2,3	2,2
			2019	1,2	1,3	1,2	1,9	2,1	2,0
			2020	1,3	1,3	1,3	1,9	2,1	2,0
			2021	1,2	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0
			2022	1,2	1,2	1,2	1,9	2,0	2,0
P72	Schizofrenie	Chronisch	2018	0,2	<0,1	0,1	4,3	2,4	3,3
			2019	0,1	<0,1	0,1	3,7	2,0	2,9
			2020	0,1	<0,1	<0,1	3,8	2,0	2,9
			2021	0,1	<0,1	<0,1	3,8	2,0	2,9
			2022	0,1	<0,1	<0,1	3,6	1,9	2,8
P73	Affectieve psychose	Langdurig	2018	0,7	0,9	0,8	2,0	2,6	2,3
			2019	0,8	0,9	0,8	2,0	2,6	2,3
			2020	0,7	0,9	0,8	2,1	2,7	2,4
			2021	0,7	0,8	0,8	2,1	2,6	2,4

			2022	0,6	0,7	0,7	2,1	2,6	2,3
P74	Angststoornis/angsttoestand	Langdurig	2018	7,0	14,3	10,7	16,1	33,0	24,6
			2019	7,5	14,7	11,1	16,0	32,4	24,3
			2020	7,0	14,3	10,7	16,4	34,0	25,2
			2021	7,4	15,1	11,3	16,6	35,2	25,9
			2022	7,2	14,8	11,0	16,9	35,8	26,4
P75	Hysterie/hypochondrie	Langdurig	2018	0,5	1,0	0,7	1,1	2,0	1,5
			2019	0,6	1,0	0,8	1,1	1,9	1,5
			2020	0,5	0,9	0,7	1,2	2,0	1,6
			2021	0,5	0,8	0,7	1,1	1,8	1,5
			2022	0,5	0,8	0,6	1,0	1,7	1,3
P76	Depressie	Langdurig	2018	8,9	15,3	12,1	22,5	41,8	32,2
			2019	8,9	15,4	12,2	21,5	40,2	30,9
			2020	7,7	13,5	10,6	21,1	39,2	30,2
			2021	7,9	14,1	11,0	20,7	39,0	29,9
			2022	7,3	12,8	10,1	20,4	38,2	29,3
P77	Suïcidepoging	Acuut	2018	0,9	1,3	1,1	1,0	1,5	1,2
			2019	0,8	1,1	0,9	0,9	1,2	1,1
			2020	0,8	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1
			2021	0,8	1,1	1,0	0,9	1,3	1,1
			2022	0,8	1,2	1,0	0,9	1,3	1,1
P78	Neurasthenie/surmenage	Langdurig	2018	5,5	10,8	8,2	10,2	20,3	15,3
			2019	5,5	10,8	8,2	9,8	19,4	14,7
			2020	4,7	8,5	6,6	9,5	18,1	13,8
			2021	5,1	9,8	7,4	9,4	18,0	13,7
			2022	5,0	9,4	7,2	9,3	18,3	13,9
P79	Andere neurose	Langdurig	2018	0,9	1,5	1,2	1,8	3,3	2,6
			2019	0,8	1,4	1,1	1,8	3,1	2,4
			2020	0,8	1,3	1,0	1,8	3,1	2,5
			2021	0,8	1,3	1,1	1,8	3,1	2,5
			2022	0,7	1,3	1,0	1,8	3,1	2,4
P80	Persoonlijkheids-/karakterstoornis	Chronisch	2018	0,9	1,1	1,0	12,2	15,6	13,9

			2019	0,8	1,0	0,9	11,4	14,9	13,2
			2020	0,7	0,9	0,8	12,2	15,7	13,9
			2021	0,6	0,9	0,8	12,5	16,3	14,4
			2022	0,7	0,8	0,7	12,4	16,2	14,3
P85	Mentale retardatie/intellectuele achterstand	Chronisch	2018	0,4	0,4	0,4	7,2	5,6	6,4
			2019	0,3	0,3	0,3	6,8	5,2	6,0
			2020	0,3	0,3	0,3	7,1	5,5	6,3
			2021	0,4	0,2	0,3	7,4	5,6	6,5
			2022	0,3	0,2	0,3	7,2	5,4	6,3
P98	Andere/niet gespecificeerde psychose(n)	Langdurig	2018	1,1	1,0	1,1	2,6	2,3	2,5
			2019	1,0	1,0	1,0	2,3	2,2	2,2
			2020	1,1	0,9	1,0	2,4	2,2	2,3
			2021	1,1	0,9	1,0	2,4	2,0	2,2
			2022	0,9	0,8	0,9	2,2	2,0	2,1
P99	Andere psychische stoornissen	Langdurig	2018	4,7	3,6	4,1	9,4	6,8	8,1
			2019	5,1	3,9	4,5	9,7	7,4	8,5
			2020	4,6	3,6	4,1	9,7	7,5	8,6
			2021	5,1	4,5	4,8	10,2	8,6	9,4
			2022	5,0	4,5	4,7	10,4	9,1	9,8
R01	Pijn toegeschreven aan luchtwegen [ex. R09]	Acuut	2018	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2019	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3
			2020	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2021	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2022	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4
R02	Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]	Acuut	2018	12,2	16,9	14,6	13,6	18,6	16,1
			2019	12,2	16,5	14,4	13,4	17,9	15,7
			2020	13,0	17,3	15,2	14,5	19,3	16,9
			2021	13,2	16,5	14,8	14,6	18,3	16,5
			2022	13,3	16,9	15,1	14,8	18,8	16,8
R03	Piepende ademhaling	Acuut	2018	2,4	1,9	2,1	2,1	1,6	1,8
			2019	2,4	1,9	2,1	2,0	1,6	1,8
			2020	2,1	1,8	2,0	1,9	1,5	1,7

			2021	2,4	1,9	2,1	2,0	1,5	1,7
			2022	2,3	2,0	2,1	1,9	1,6	1,7
R04	Andere problemen ademhaling	Acuut	2018	7,7	4,4	6,1	6,5	3,8	5,1
			2019	7,8	4,4	6,1	6,5	3,8	5,1
			2020	6,8	3,9	5,3	5,7	3,3	4,5
			2021	7,2	4,3	5,7	6,0	3,6	4,8
			2022	7,4	4,5	5,9	6,2	3,9	5,0
R05	Hoesten	Acuut	2018	59,2	82,2	70,8	55,2	75,4	65,4
			2019	57,7	79,0	68,4	53,1	71,8	62,5
			2020	45,2	60,2	52,8	43,4	56,8	50,1
			2021	41,4	53,3	47,4	36,3	46,5	41,4
			2022	57,2	79,1	68,2	51,5	70,2	60,9
R06	Epistaxis/neusbloeding	Acuut	2018	7,7	6,3	7,0	6,9	5,6	6,2
			2019	7,4	5,9	6,7	6,6	5,3	5,9
			2020	6,8	5,5	6,2	6,0	4,9	5,5
			2021	7,3	6,0	6,7	6,5	5,3	5,9
			2022	8,1	6,2	7,1	7,1	5,4	6,3
R07	Niezen/neusverstopping/loopneus	Acuut	2018	6,6	6,2	6,4	5,1	4,7	4,9
			2019	6,6	6,3	6,4	4,9	4,7	4,8
			2020	6,8	6,8	6,8	5,2	5,0	5,1
			2021	6,9	6,3	6,6	5,1	4,6	4,9
			2022	6,5	6,3	6,4	4,9	4,6	4,8
R08	Andere symptomen/klachten neus	Acuut	2018	7,0	7,8	7,4	6,0	6,9	6,5
			2019	7,2	8,1	7,7	6,1	7,1	6,6
			2020	6,5	7,7	7,1	5,5	6,7	6,1
			2021	7,0	8,1	7,6	5,9	7,0	6,5
			2022	7,8	8,3	8,0	6,6	7,1	6,9
R09	Symptomen/klachten sinussen (inclusief pijn)	Acuut	2018	2,0	3,3	2,6	1,8	2,9	2,3
			2019	2,0	3,5	2,7	1,7	3,0	2,4
			2020	1,7	3,1	2,4	1,4	2,5	2,0
			2021	1,5	2,9	2,2	1,2	2,3	1,8
			2022	1,7	3,0	2,4	1,5	2,6	2,0

R21	Symptomen/klachten keel	Acuut	2018	18,1	29,1	23,6	15,9	25,6	20,8
			2019	18,1	28,2	23,1	15,7	24,4	20,1
			2020	18,7	29,4	24,1	15,7	24,7	20,3
			2021	17,4	26,8	22,1	14,8	22,7	18,8
			2022	21,9	34,9	28,4	19,1	30,2	24,7
R22	Symptomen/klachten tonsillen	Acuut	2018	1,4	1,9	1,6	1,3	1,8	1,6
			2019	1,3	2,1	1,7	1,3	2,0	1,6
			2020	1,2	1,9	1,5	1,2	1,8	1,5
			2021	1,3	1,9	1,6	1,2	1,8	1,5
			2022	1,6	2,6	2,1	1,5	2,5	2,0
R23	Symptomen/klachten stem	Acuut	2018	2,4	3,8	3,1	2,2	3,4	2,8
			2019	2,4	3,8	3,1	2,2	3,3	2,8
			2020	2,3	3,1	2,7	2,0	2,7	2,4
			2021	2,1	3,0	2,5	1,8	2,6	2,2
			2022	2,1	3,3	2,7	1,9	3,0	2,4
R24	Haemoptoë	Acuut	2018	1,0	0,6	0,8	0,9	0,6	0,8
			2019	1,0	0,6	0,8	0,9	0,6	0,8
			2020	0,8	0,5	0,6	0,8	0,5	0,6
			2021	0,8	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6
			2022	0,9	0,6	0,8	0,9	0,6	0,7
R25	Abnormaal sputum/slijm	Acuut	2018	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			2019	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
			2020	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
			2021	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6
			2022	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
R26	Angst voor kanker luchtwegen	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2020	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2022	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
R27	Angst voor andere ziekte luchtwegen	Acuut	2018	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2019	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1

			2020	3,5	4,7	4,1	3,3	4,5	3,9
			2021	2,0	2,9	2,4	2,0	2,8	2,4
			2022	0,3	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
R28	Functiebeperking/handicap luchtwegen	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,9	0,9	0,9
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,9	0,9	0,9
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,9	0,9	0,9
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,0	1,0
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,1	1,1
R29	Andere symptomen/klachten luchtwegen	Acuut	2018	2,2	1,9	2,1	2,2	1,9	2,0
			2019	5,9	6,5	6,2	5,6	6,1	5,9
			2020	4,4	5,1	4,8	5,0	5,5	5,2
			2021	4,6	4,8	4,7	4,7	4,9	4,8
			2022	5,2	5,5	5,3	5,5	5,8	5,6
R70	Tuberculose luchtwegen [ex. A70]	Langdurig	2018	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
			2019	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
			2020	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
R71	Kinkhoest	Acuut	2018	0,3	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
			2019	0,5	1,2	0,8	0,5	1,3	0,9
			2020	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3
			2021	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1
R72	Streptokokken-angina/roodvonk	Acuut	2018	1,2	1,8	1,5	1,1	1,6	1,4
			2019	1,2	1,6	1,4	1,1	1,5	1,3
			2020	0,6	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7
			2021	5,2	4,7	5,0	2,9	2,7	2,8
			2022	4,0	3,8	3,9	3,1	3,0	3,1
R73	Furunkel/abces neus	Acuut	2018	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6
			2019	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6
			2020	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2021	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5

			2022	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
R74	Acute infectie bovenste luchtwegen	Acuut	2018	70,3	91,5	81,0	59,1	77,3	68,3
			2019	67,5	87,0	77,3	55,6	72,5	64,1
			2020	63,4	83,2	73,3	54,7	70,5	62,7
			2021	49,7	61,0	55,4	39,3	49,0	44,2
			2022	62,8	78,8	70,8	50,1	64,1	57,1
R75	Acute/chronische sinusitis	Acuut	2018	15,7	29,8	22,8	13,6	25,5	19,5
			2019	15,5	28,8	22,2	13,2	24,1	18,7
			2020	11,1	21,3	16,2	9,1	17,2	13,2
			2021	10,4	20,8	15,6	8,2	15,8	12,0
			2022	13,2	24,9	19,1	10,8	2<0,1	15,4
R76	Acute tonsillitis/peritonsillair abces	Acuut	2018	7,8	11,9	9,9	7,1	10,4	8,8
			2019	8,1	12,0	10,1	7,2	10,4	8,8
			2020	4,7	7,2	6,0	4,3	6,4	5,4
			2021	4,5	7,0	5,7	4,0	6,1	5,0
			2022	8,1	12,5	10,3	7,1	10,5	8,8
R77	Acute laryngitis/tracheïtis	Acuut	2018	2,3	2,0	2,1	2,1	1,8	1,9
			2019	2,5	1,9	2,2	2,2	1,7	2,0
			2020	1,4	1,1	1,2	1,3	0,9	1,1
			2021	2,2	1,5	1,8	1,9	1,2	1,6
			2022	2,6	1,7	2,2	2,2	1,5	1,9
R78	Acute bronchitis/bronchiolitis	Acuut	2018	14,9	20,5	17,7	13,4	18,1	15,8
			2019	14,3	18,9	16,6	12,8	16,6	14,7
			2020	8,5	11,0	9,8	7,7	1<0,1	8,9
			2021	7,7	9,4	8,6	6,2	7,3	6,7
			2022	9,5	12,2	10,9	7,9	10,2	9,1
R80	Influenza [ex. R81]	Acuut	2018	11,1	14,7	12,9	10,8	14,1	12,5
			2019	5,9	7,9	6,9	5,7	7,5	6,6
			2020	6,0	7,9	6,9	5,9	7,6	6,7
			2021	1,5	2,2	1,9	1,4	2,0	1,7
			2022	4,5	6,0	5,2	4,2	5,7	5,0
R81	Pneumonie	Acuut	2018	15,1	16,4	15,8	16,9	18,2	17,5

			2019	14,2	15,1	14,6	15,7	16,5	16,1
			2020	9,0	8,9	8,9	11,6	11,5	11,6
			2021	7,6	7,6	7,6	8,5	8,3	8,4
			2022	11,5	12,6	12,0	12,4	13,6	13,0
R82	Pleuritis alle vormen [ex. R70]	Acuut	2018	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2019	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2022	<0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
R83	Andere infectie(s) luchtwegen	Acuut	2018	2,6	2,9	2,8	2,8	3,2	3,0
			2019	2,6	2,8	2,7	2,8	3,0	2,9
			2020	31,5	39,4	35,4	31,1	38,8	35,0
			2021	103,5	115,7	109,6	116,6	131,3	124,0
			2022	254,2	299,5	277,0	294,7	340,5	317,7
R84	Maligniteit bronchus/long	Chronisch	2018	1,0	0,7	0,8	3,7	3,2	3,5
			2019	0,9	0,8	0,8	3,8	3,4	3,6
			2020	0,9	0,8	0,9	3,9	3,6	3,7
			2021	0,8	0,7	0,8	3,9	3,7	3,8
			2022	0,9	0,8	0,8	3,9	3,9	3,9
R85	Andere maligniteit luchtwegen	Chronisch	2018	0,1	<0,1	<0,1	1,3	0,5	0,9
			2019	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,8
			2020	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,8
			2021	0,1	<0,1	0,1	1,2	0,5	0,8
			2022	0,1	<0,1	<0,1	1,2	0,5	0,9
R86	Benigne neoplasma luchtwegen	Acuut	2018	0,7	0,5	0,6	0,8	0,5	0,7
			2019	0,7	0,5	0,6	0,8	0,5	0,6
			2020	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7
			2021	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
			2022	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
R87	Corpus alienum neus/larynx/bronchiën	Acuut	2018	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6
			2019	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6
			2020	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7

			2021	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2022	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
R88	Ander letsel luchtwegen	Acuut	2018	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
			2019	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
			2020	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2021	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2022	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
R89	Aangeboren afwijking(en) luchtwegen	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,4	0,4
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	0,4	0,4
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,4	0,4
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,5	0,5	0,5
R90	Hypertrofie/chronische infectie tonsillen/adenoid	Langdurig	2018	1,9	1,8	1,8	3,0	3,1	3,1
			2019	1,7	1,7	1,7	2,7	2,8	2,8
			2020	1,1	1,2	1,2	2,2	2,4	2,3
			2021	1,3	1,4	1,3	2,1	2,2	2,2
			2022	1,7	1,7	1,7	2,6	2,7	2,6
R91	Chronische bronchitis/bronchiëctasieën	Chronisch	2018	0,5	0,7	0,6	7,6	9,3	8,4
			2019	0,5	0,5	0,5	7,2	8,5	7,9
			2020	0,3	0,4	0,3	6,9	8,2	7,5
			2021	0,3	0,4	0,3	6,7	8,3	7,5
			2022	0,4	0,4	0,4	6,5	8,0	7,2
R93	Pleuravocht	Langdurig	2018	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
			2019	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2
			2020	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
			2021	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
			2022	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
R95	Emfyseem/COPD	Chronisch	2018	1,6	1,6	1,6	29,5	28,1	28,8
			2019	1,4	1,4	1,4	28,1	26,6	27,4
			2020	0,9	0,8	0,9	26,8	25,6	26,2
			2021	1,0	1,0	1,0	25,5	24,4	25,0
			2022	1,2	1,2	1,2	24,7	23,8	24,2

R96	Astma	Chronisch	2018	4,5	5,0	4,8	99,8	110,7	105,3
			2019	3,2	3,7	3,5	96,9	106,9	101,9
			2020	2,3	2,7	2,5	96,5	106,6	101,6
			2021	2,8	3,1	3,0	97,3	106,7	102,0
			2022	2,6	3,4	3,0	96,1	105,5	100,8
R97	Hooikoorts/allergische rhinitis	Langdurig	2018	25,6	29,8	27,7	51,7	62,1	57,0
			2019	24,4	28,7	26,6	49,9	6<0,1	55,0
			2020	24,9	29,9	27,4	51,8	62,6	57,2
			2021	27,3	30,8	29,1	55,5	65,2	60,4
			2022	21,1	25,1	23,1	51,4	61,7	56,6
R98	Hyperventilatie	Acuut	2018	3,3	6,6	5,0	2,9	5,8	4,4
			2019	3,0	6,2	4,6	2,7	5,4	4,1
			2020	2,8	5,8	4,3	2,6	5,2	3,9
			2021	2,6	5,3	4,0	2,3	4,7	3,5
			2022	2,4	4,9	3,6	2,1	4,3	3,2
R99	Andere ziekte(n) luchtwegen	Langdurig	2018	2,1	1,4	1,7	4,0	2,7	3,3
			2019	2,0	1,3	1,7	3,7	2,5	3,1
			2020	1,8	1,3	1,5	3,6	2,6	3,1
			2021	1,9	1,3	1,6	3,6	2,5	3,0
			2022	1,9	1,3	1,6	3,6	2,5	3,0
S01	Pijn/gevoeligheid huid	Acuut	2018	1,0	1,7	1,3	0,9	1,6	1,2
			2019	0,9	1,4	1,1	0,8	1,3	1,1
			2020	1,0	1,6	1,3	0,9	1,5	1,2
			2021	0,9	1,6	1,3	0,9	1,5	1,2
			2022	1,0	1,5	1,2	0,9	1,5	1,2
S02	Pruritus/jeuk [ex. D05,X16]	Acuut	2018	11,8	18,1	15,0	9,8	15,3	12,5
			2019	11,6	18,0	14,8	9,7	15,2	12,5
			2020	11,1	16,5	13,8	8,9	13,6	11,3
			2021	11,3	16,9	14,2	9,2	13,8	11,5
			2022	10,9	16,3	13,6	9,1	13,4	11,3
S03	Wratten	Acuut	2018	27,0	32,6	29,8	25,7	30,7	28,2
			2019	26,8	32,1	29,5	25,4	30,1	27,8

			2020	21,0	24,8	22,9	20,5	24,3	22,4
			2021	22,0	26,4	24,2	20,6	24,8	22,7
			2022	23,1	27,1	25,1	21,7	25,4	23,6
S04	Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis	Acuut	2018	11,4	15,5	13,4	10,1	13,6	11,9
			2019	11,9	16,9	14,4	10,5	14,8	12,7
			2020	11,9	16,1	14,0	10,6	14,3	12,4
			2021	13,2	18,5	15,9	11,5	16,2	13,9
			2022	14,5	19,9	17,2	12,5	17,2	14,9
S05	Multiple zwellingen/papels/knobbels huid/subcutis	Acuut	2018	1,5	1,7	1,6	1,3	1,5	1,4
			2019	1,5	2,0	1,8	1,4	1,7	1,5
			2020	1,2	1,5	1,4	1,0	1,4	1,2
			2021	1,4	2,0	1,7	1,2	1,7	1,5
			2022	1,6	2,0	1,8	1,4	1,8	1,6
S06	Lokale roodheid/erytheem huid	Acuut	2018	14,2	20,7	17,5	13,4	19,7	16,6
			2019	16,3	23,6	2<0,1	15,3	22,0	18,7
			2020	18,0	25,9	22,0	16,8	24,4	20,6
			2021	18,9	28,4	23,7	17,7	26,7	22,2
			2022	20,4	29,0	24,7	19,1	27,3	23,2
S07	Gegeneraliseerde roodheid/erytheem huid	Acuut	2018	3,3	4,3	3,8	3,1	4,1	3,6
			2019	3,4	4,6	4,0	3,3	4,4	3,8
			2020	4,1	5,4	4,8	3,9	5,1	4,5
			2021	4,4	5,6	5,0	4,1	5,5	4,8
			2022	4,4	5,7	5,0	4,2	5,5	4,9
S08	Andere verandering(en) in kleur huid	Acuut	2018	1,2	2,6	1,9	1,2	2,4	1,8
			2019	1,2	2,3	1,7	1,1	2,2	1,7
			2020	1,4	2,6	2,0	1,3	2,5	1,9
			2021	1,5	2,8	2,2	1,4	2,7	2,1
			2022	1,6	2,8	2,2	1,6	2,7	2,1
S09	Lokale infectie vinger/teen/paronychia	Acuut	2018	7,3	7,8	7,6	6,9	7,3	7,1
			2019	7,6	8,3	7,9	7,2	7,7	7,5
			2020	6,8	7,5	7,2	6,4	7,1	6,8
			2021	6,9	7,8	7,3	6,4	7,2	6,8

			2022	8,8	9,1	9,0	8,3	8,5	8,4
S10	Furunkel/karbunkel/cellulitis lokaal	Acuut	2018	5,7	6,2	5,9	5,1	5,4	5,2
			2019	5,3	5,7	5,5	4,7	5,0	4,9
			2020	5,1	5,4	5,2	4,5	4,8	4,6
			2021	5,1	5,3	5,2	4,4	4,6	4,5
			2022	5,3	5,5	5,4	4,8	4,8	4,8
S11	Andere lokale infectie(s) huid/subcutis	Acuut	2018	11,6	13,2	12,4	9,8	11,4	10,6
			2019	11,5	12,3	11,9	9,6	10,5	1<0,1
			2020	1<0,1	11,5	10,8	8,3	9,8	9,1
			2021	9,9	11,9	10,9	8,3	10,1	9,2
			2022	10,7	11,9	11,3	9,0	10,3	9,6
S12	Beet/steek insect	Acuut	2018	14,3	20,3	17,3	13,6	19,0	16,3
			2019	12,4	17,5	14,9	11,8	16,4	14,1
			2020	12,4	16,6	14,5	11,7	15,5	13,6
			2021	10,2	15,0	12,6	9,7	14,0	11,8
			2022	11,4	16,5	13,9	10,8	15,4	13,1
S13	Beet mens/dier	Acuut	2018	4,2	5,8	5,0	4,1	5,6	4,9
			2019	4,6	6,2	5,4	4,5	6,0	5,3
			2020	4,4	6,1	5,3	4,4	6,0	5,2
			2021	4,6	6,6	5,6	4,6	6,5	5,5
			2022	5,0	6,7	5,9	4,9	6,6	5,8
S14	Brandwond/verbranding huid (elke graad)	Acuut	2018	4,0	6,0	5,0	4,0	6,0	5,0
			2019	4,1	5,8	4,9	4,1	5,8	4,9
			2020	3,9	5,5	4,7	3,9	5,5	4,7
			2021	3,8	5,4	4,6	3,8	5,4	4,6
			2022	3,8	5,4	4,6	3,7	5,4	4,6
S15	Corpus alienum huid/subcutis	Acuut	2018	2,8	2,9	2,9	2,7	2,8	2,8
			2019	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,7
			2020	2,7	2,4	2,6	2,6	2,4	2,5
			2021	2,4	2,3	2,4	2,4	2,2	2,3
			2022	2,9	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7
S16	Buil/kneuzing/contusie intacte huid	Acuut	2018	6,1	8,1	7,1	5,9	7,7	6,8

			2019	5,7	7,6	6,7	5,5	7,2	6,4
			2020	4,9	6,6	5,8	4,7	6,2	5,4
			2021	5,0	7,3	6,1	4,7	6,8	5,8
			2022	5,0	7,1	6,0	4,8	6,6	5,7
S17	Schaafwond/schram/blaar	Acuut	2018	11,1	11,5	11,3	10,5	10,5	10,5
			2019	10,3	10,8	10,6	9,7	9,9	9,8
			2020	9,6	10,1	9,9	9,0	9,3	9,2
			2021	9,2	9,8	9,5	8,6	9,0	8,8
			2022	10,3	11,0	10,7	9,7	10,2	9,9
S18	Scheurwond/snijwond	Acuut	2018	26,7	17,6	22,1	26,0	16,8	21,4
			2019	27,3	17,7	22,5	26,6	16,8	21,7
			2020	26,7	17,0	21,8	26,0	16,2	21,1
			2021	25,6	16,6	21,1	25,0	15,8	20,4
			2022	27,8	17,9	22,8	27,0	17,0	22,0
S19	Ander letsel van de huid/subcutis	Acuut	2018	3,8	4,5	4,2	3,8	4,4	4,1
			2019	3,9	4,4	4,1	3,8	4,3	4,1
			2020	3,9	4,5	4,2	3,9	4,4	4,1
			2021	4,2	4,9	4,5	4,1	4,8	4,5
			2022	4,6	5,3	5,0	4,5	5,2	4,9
S20	Likdoorn(s)/eeltknobbel(s)	Acuut	2018	3,7	4,4	4,1	3,7	4,3	4,0
			2019	3,5	4,1	3,8	3,4	3,9	3,7
			2020	2,8	3,3	3,0	2,8	3,2	3,0
			2021	3,2	3,6	3,4	3,1	3,5	3,3
			2022	3,1	3,5	3,3	3,1	3,4	3,2
S21	Andere symptomen/klachten aspect huid	Acuut	2018	9,4	12,9	11,2	8,2	11,0	9,6
			2019	8,7	12,0	10,3	7,5	10,2	8,9
			2020	8,7	11,9	10,3	7,4	10,2	8,8
			2021	9,0	12,1	10,5	7,7	10,3	9,0
			2022	8,8	12,0	10,4	7,6	10,2	8,9
S22	Symptomen/klachten nagels	Acuut	2018	2,1	3,1	2,6	1,9	2,8	2,4
			2019	2,0	3,1	2,5	1,8	2,8	2,3
			2020	1,9	2,7	2,3	1,7	2,4	2,1

			2021	2,3	3,3	2,8	2,1	3,0	2,6
			2022	2,5	3,6	3,0	2,2	3,2	2,7
S23	Haaruitval/alopecia	Acuut	2018	2,9	8,9	5,9	3,1	9,8	6,4
			2019	2,7	7,1	4,9	2,8	8,1	5,5
			2020	2,6	6,9	4,8	2,7	8,0	5,4
			2021	2,7	8,3	5,6	3,0	9,2	6,1
			2022	2,8	8,5	5,6	3,0	9,5	6,3
S24	Andere symptomen/klachten haar	Acuut	2018	0,8	4,4	2,6	0,8	4,9	2,9
			2019	0,7	3,7	2,2	0,7	4,1	2,4
			2020	0,7	2,8	1,8	0,8	3,3	2,1
			2021	0,7	2,9	1,8	0,8	3,1	2,0
			2022	0,7	2,4	1,6	0,8	2,7	1,8
S26	Angst voor kanker huid/subcutis	Acuut	2018	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2019	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2020	0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
S27	Angst voor andere ziekte huid/subcutis	Acuut	2018	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
			2019	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2020	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
			2022	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
S28	Functiebeperking/handicap huid/subcutis	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,8	0,7
			2019	<0,1	0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	0,9	0,7
			2021	<0,1	0,1	0,1	0,6	0,9	0,7
			2022	0,1	0,2	0,1	0,7	1,1	0,9
S29	Andere symptomen/klachten huid/subcutis	Acuut	2018	5,5	8,5	7,0	5,1	7,8	6,4
			2019	5,9	8,9	7,4	5,3	8,2	6,8
			2020	4,4	6,8	5,6	4,1	6,5	5,3
			2021	4,2	6,8	5,5	4,1	6,5	5,3
			2022	5,7	8,7	7,2	5,3	8,1	6,7

S70	Herpes zoster	Acuut	2018	4,3	6,3	5,3	4,9	7,2	6,1
			2019	4,4	6,4	5,4	5,1	7,3	6,2
			2020	4,4	6,2	5,3	5,0	7,1	6,1
			2021	4,4	6,3	5,4	5,2	7,3	6,3
			2022	4,4	6,1	5,2	5,1	7,1	6,1
S71	Herpes simplex [ex. F85,X90,Y72]	Acuut	2018	2,1	5,2	3,7	1,8	4,3	3,0
			2019	1,9	4,8	3,4	1,6	3,9	2,8
			2020	1,5	4,4	3,0	1,3	3,5	2,4
			2021	1,7	4,4	3,1	1,4	3,4	2,4
			2022	1,8	4,9	3,3	1,5	3,9	2,7
S72	Scabies/andere aandoening door mijten	Acuut	2018	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2
			2019	2,2	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1
			2020	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
			2021	3,2	3,4	3,3	2,9	3,2	3,1
			2022	6,2	6,6	6,4	5,7	6,2	5,9
S73	Pediculosis/andere huidinfestatie	Acuut	2018	0,2	0,5	0,3	0,1	0,4	0,3
			2019	0,2	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3
			2020	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
			2021	0,1	0,3	0,2	<0,1	0,2	0,2
			2022	0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
S74	Dermatomyose(n)	Acuut	2018	46,5	45,3	45,9	42,2	41,6	41,9
			2019	43,3	42,1	42,7	39,1	38,6	38,9
			2020	37,6	36,8	37,2	34,3	33,8	34,1
			2021	39,2	38,1	38,6	35,5	34,9	35,2
			2022	41,1	39,9	40,5	37,3	36,3	36,8
S75	Moniliasis/candidiasis [ex. X72,Y75]	Acuut	2018	7,7	14,2	11,0	7,3	13,1	10,2
			2019	7,1	13,1	10,1	6,7	12,0	9,4
			2020	7,0	13,4	10,2	6,6	12,3	9,4
			2021	7,2	12,8	10,1	6,7	11,7	9,2
			2022	7,3	13,1	10,2	6,9	12,1	9,5
S76	Andere infectie huid/subcutis	Acuut	2018	10,3	8,7	9,5	11,3	9,8	10,5
			2019	10,3	9,0	9,6	11,3	9,8	10,5

			2020	9,8	8,6	9,2	10,9	9,5	10,2
			2021	9,1	8,2	8,6	10,2	9,1	9,6
			2022	10,4	8,7	9,5	11,3	9,7	10,5
S77	Maligniteit huid/subcutis	Chronisch	2018	3,0	3,4	3,2	34,4	42,4	38,4
			2019	3,1	3,5	3,3	36,2	44,3	40,3
			2020	2,7	3,0	2,8	37,8	46,4	42,1
			2021	3,2	3,4	3,3	39,6	48,7	44,1
			2022	3,1	3,5	3,3	40,6	49,9	45,3
S78	Lipoom	Acuut	2018	4,6	4,5	4,5	5,2	5,1	5,2
			2019	4,9	4,6	4,7	5,5	5,1	5,3
			2020	4,0	3,8	3,9	4,7	4,4	4,5
			2021	4,9	4,6	4,7	5,3	5,0	5,2
			2022	5,0	4,6	4,8	5,6	5,1	5,4
S79	Ander benigne neoplasma huid/subcutis	Acuut	2018	13,2	19,5	16,4	14,5	21,5	18,0
			2019	12,7	19,4	16,1	14,1	21,3	17,7
			2020	9,4	14,1	11,8	10,9	16,3	13,6
			2021	11,0	17,2	14,1	12,1	18,8	15,4
			2022	12,3	18,5	15,4	13,4	20,3	16,9
S80	Ander/niet-gespecificeerd neoplasma huid/subcutis	Acuut	2018	1,0	1,3	1,1	1,1	1,4	1,3
			2019	0,9	1,2	1,1	1,0	1,4	1,2
			2020	1,0	1,2	1,1	1,1	1,4	1,2
			2021	0,9	1,3	1,1	1,0	1,4	1,2
			2022	1,1	1,3	1,2	1,2	1,5	1,3
S81	Hemangioom/lymfangioom	Chronisch	2018	0,8	1,2	1,0	8,3	12,2	10,3
			2019	0,9	1,3	1,1	9,0	13,2	11,1
			2020	0,6	1,0	0,8	9,5	14,3	11,9
			2021	0,8	1,2	1,0	10,2	15,3	12,8
			2022	0,9	1,3	1,1	10,8	16,3	13,6
S82	Naevus/moedervlek	Langdurig	2018	12,3	21,3	16,9	19,3	33,8	26,6
			2019	12,4	21,3	16,9	19,3	33,5	26,5
			2020	10,5	18,1	14,3	17,6	30,2	23,9
			2021	12,3	21,0	16,7	18,8	32,4	25,7

			2022	13,2	22,2	17,7	20,2	34,1	27,2
S83	Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis	Chronisch	2018	0,2	0,2	0,2	2,7	3,8	3,3
			2019	0,2	0,2	0,2	2,8	3,7	3,3
			2020	0,2	0,2	0,2	2,8	3,8	3,3
			2021	0,2	0,3	0,2	3,0	4,1	3,6
			2022	0,2	0,3	0,2	3,2	4,3	3,7
S84	Impetigo/impetiginisatie	Acuut	2018	16,2	17,6	16,9	14,7	15,8	15,2
			2019	16,0	17,4	16,7	14,5	15,7	15,1
			2020	12,9	14,7	13,8	11,7	13,3	12,5
			2021	12,2	13,5	12,8	11,0	12,2	11,6
			2022	15,2	16,6	15,9	13,9	15,1	14,5
S85	Pilonidaal cyste/fistel	Acuut	2018	1,4	0,7	1,1	1,3	0,6	1,0
			2019	1,5	0,7	1,1	1,3	0,6	1,0
			2020	1,4	0,6	1,0	1,3	0,6	0,9
			2021	1,5	0,7	1,1	1,3	0,6	1,0
			2022	1,6	0,6	1,1	1,4	0,5	1,0
S86	Seborroïsch eczeem/roos	Langdurig	2018	9,0	11,2	10,1	17,0	20,3	18,6
			2019	9,3	11,0	10,2	16,6	19,5	18,1
			2020	8,1	9,5	8,8	16,0	18,3	17,2
			2021	9,0	10,4	9,7	16,6	18,9	17,7
			2022	9,0	10,5	9,8	17,8	19,8	18,8
S87	Constitutioneel eczeem	Chronisch	2018	9,3	10,6	1<0,1	117,5	133,1	125,3
			2019	8,4	9,7	9,0	114,7	129,5	122,2
			2020	7,2	8,6	7,9	122,6	139,1	130,9
			2021	7,8	9,0	8,4	125,9	142,7	134,4
			2022	8,2	9,2	8,7	128,4	144,9	136,7
S88	Contact eczeem/ander eczeem	Langdurig	2018	25,5	35,3	30,4	45,1	62,1	53,7
			2019	24,5	33,7	29,1	42,5	59,0	50,8
			2020	20,3	28,8	24,6	38,0	53,5	45,8
			2021	21,8	30,5	26,2	38,1	53,4	45,8
			2022	21,9	29,9	26,0	39,1	53,1	46,2
S89	Luiereczeem	Acuut	2018	1,4	2,5	1,9	1,3	2,1	1,7

			2019	1,3	2,2	1,8	1,2	2,0	1,6
			2020	1,2	2,1	1,7	1,2	1,8	1,5
			2021	1,4	2,3	1,8	1,3	2,1	1,7
			2022	1,6	2,4	2,0	1,4	2,2	1,8
S90	Pityriasis rosea	Acuut	2018	1,5	1,9	1,7	1,4	1,8	1,6
			2019	1,5	1,8	1,6	1,4	1,6	1,5
			2020	1,3	1,6	1,4	1,2	1,5	1,3
			2021	1,4	1,7	1,6	1,3	1,6	1,4
			2022	1,4	1,7	1,6	1,2	1,6	1,4
S91	Psoriasis (met of zonder artropathie)	Chronisch	2018	1,5	1,6	1,5	28,2	27,1	27,7
			2019	1,5	1,5	1,5	28,9	28,1	28,5
			2020	1,3	1,2	1,2	29,6	28,6	29,1
			2021	1,4	1,4	1,4	30,1	29,1	29,6
			2022	1,5	1,3	1,4	30,7	29,2	29,9
S92	Ziekte(n) zweetklieren	Langdurig	2018	1,0	2,1	1,6	1,6	3,8	2,7
			2019	0,9	2,1	1,5	1,5	3,6	2,6
			2020	0,8	1,9	1,4	1,5	3,5	2,5
			2021	0,9	2,1	1,5	1,6	3,6	2,6
			2022	0,9	2,0	1,5	1,6	3,6	2,6
S93	Atheroomcyste/epitheelcyste	Acuut	2018	12,3	12,6	12,4	13,8	14,1	13,9
			2019	12,2	12,9	12,6	13,6	14,4	14,0
			2020	10,2	10,5	10,3	11,9	12,3	12,1
			2021	11,3	12,0	11,7	12,6	13,4	13,0
			2022	11,9	12,3	12,1	13,4	13,8	13,6
S94	Unguis incarnatus/andere nagelaandoening	Acuut	2018	7,1	7,6	7,4	5,9	6,5	6,2
			2019	7,5	8,0	7,7	6,2	6,7	6,4
			2020	6,3	7,2	6,8	5,3	6,2	5,7
			2021	7,2	7,5	7,4	5,8	6,3	6,1
			2022	7,8	8,1	7,9	6,2	6,7	6,5
S95	Mollusca contagiosa	Langdurig	2018	2,6	2,7	2,6	4,1	4,3	4,2
			2019	2,7	2,7	2,7	4,0	4,2	4,1
			2020	2,3	2,4	2,3	3,8	4,0	3,9

			2021	1,8	2,1	1,9	3,1	3,4	3,2
			2022	1,6	1,8	1,7	2,4	2,8	2,6
S96	Acne	Langdurig	2018	4,9	10,5	7,7	9,0	20,3	14,7
			2019	4,7	9,8	7,3	8,6	18,8	13,7
			2020	4,0	8,6	6,3	8,0	17,6	12,8
			2021	4,3	9,2	6,8	8,0	17,9	13,0
			2022	4,0	7,8	5,9	7,8	16,2	12,0
S97	Ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus	Langdurig	2018	2,7	3,7	3,2	4,8	6,7	5,7
			2019	2,8	3,6	3,2	4,8	6,3	5,5
			2020	2,5	3,0	2,7	4,5	5,6	5,1
			2021	2,5	3,1	2,8	4,4	5,5	4,9
			2022	2,7	3,1	2,9	4,7	5,5	5,1
S98	Urticaria	Langdurig	2018	5,4	8,1	6,8	8,9	13,9	11,4
			2019	5,4	8,2	6,8	8,7	13,6	11,2
			2020	4,1	6,7	5,4	7,6	12,2	9,9
			2021	4,6	7,0	5,8	7,5	12,0	9,7
			2022	4,7	7,4	6,1	8,1	12,8	10,5
S99	Andere ziekte(n) huid/subcutis	Langdurig	2018	23,9	33,7	28,8	40,6	56,7	48,7
			2019	25,4	36,3	30,9	42,6	59,6	51,1
			2020	21,9	30,8	26,4	40,1	56,7	48,4
			2021	26,2	37,2	31,7	43,5	61,6	52,6
			2022	27,9	39,3	33,6	47,0	66,3	56,7
T01	Overmatige dorst	Acuut	2018	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
			2019	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
			2020	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
			2021	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
T02	Overmatige eetlust	Acuut	2018	0,1	0,2	0,2	<0,1	0,2	0,1
			2019	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
			2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,1	0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1

T03	Verminderde eetlust	Acuut	2018	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5
			2019	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4
			2020	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
			2021	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
T04	Voedingsprobleem zuigeling/kind [ex. P11]	Acuut	2018	1,1	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2
			2019	1,0	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1
			2020	1,0	0,9	0,9	1,2	1,0	1,1
			2021	1,2	1,1	1,1	1,3	1,2	1,2
			2022	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2
T05	Voedingsprobleem volwassene [ex. T06]	Acuut	2018	0,3	0,8	0,5	0,3	0,9	0,6
			2019	0,3	0,8	0,6	0,4	0,9	0,6
			2020	0,3	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
			2021	0,3	0,8	0,5	0,3	0,8	0,6
			2022	0,3	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
T06	Anorexia nervosa/boulimie	Langdurig	2018	<0,1	0,9	0,5	0,1	1,8	1,0
			2019	<0,1	0,9	0,5	<0,1	1,8	1,0
			2020	<0,1	0,9	0,5	0,1	1,9	1,0
			2021	<0,1	0,9	0,5	0,1	1,9	1,0
			2022	<0,1	0,9	0,5	0,1	2,1	1,1
T07	Gewichtstoename	Acuut	2018	0,4	1,8	1,1	0,5	2,0	1,2
			2019	0,4	1,7	1,0	0,5	1,8	1,1
			2020	0,4	1,5	0,9	0,5	1,7	1,1
			2021	0,4	1,7	1,1	0,5	1,9	1,2
			2022	0,4	1,5	0,9	0,4	1,6	1,0
T08	Gewichtsverlies	Acuut	2018	4,8	6,5	5,7	5,3	7,2	6,2
			2019	4,3	6,2	5,3	4,9	7,0	5,9
			2020	3,8	5,5	4,7	4,4	6,3	5,4
			2021	4,2	5,9	5,1	4,8	6,6	5,7
			2022	4,6	6,5	5,5	5,2	7,2	6,2
T10	Achterblijven verwachte fysiologische ontwikkeling	Langdurig	2018	1,7	1,1	1,4	3,1	1,9	2,5
			2019	1,8	1,1	1,4	3,1	1,9	2,5

			2020	1,6	0,9	1,2	3,0	1,8	2,4
			2021	1,6	1,0	1,3	3,0	1,8	2,4
			2022	1,6	0,9	1,2	3,0	1,7	2,3
T11	Dehydratie	Acuut	2018	0,7	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7
			2019	0,5	0,7	0,6	0,4	0,6	0,5
			2020	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4
			2021	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4
			2022	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
T15	Knobbel/zwelling schildklier	Acuut	2018	0,4	2,0	1,2	0,3	1,6	1,0
			2019	0,4	2,1	1,3	0,3	1,6	1,0
			2020	0,5	2,0	1,2	0,4	1,5	0,9
			2021	0,5	2,2	1,3	0,4	1,7	1,1
			2022	0,6	2,2	1,4	0,4	1,8	1,1
T26	Angst voor kanker endocriene klieren	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
T27	Angst andere ziekte endocriene klieren/metabolisme/voeding	Acuut	2018	0,6	0,9	0,8	0,6	0,9	0,7
			2019	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
			2020	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
			2021	0,4	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
T28	Funct.beperking/handicap endocr. klieren/metabolisme/voeding	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,2	0,2
T29	And. sympt./klacht. endocr. klieren/metabolisme/voeding	Acuut	2018	0,5	0,8	0,7	0,4	0,6	0,5
			2019	0,5	0,8	0,6	0,4	0,6	0,5
			2020	0,5	0,7	0,6	0,3	0,5	0,4
			2021	0,5	0,8	0,6	0,3	0,6	0,5

			2022	0,4	0,8	0,6	0,3	0,6	0,5
T70	Infectie endocriene klier(en)	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
T71	Maligniteit schildklier	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,0	0,7
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,1	0,7
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,1	0,8
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,1	0,8
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,4	1,2	0,8
T72	Benigne neoplasma schildklier	Acuut	2018	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2019	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2020	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
			2021	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,3	0,2
			2022	<0,1	0,3	0,2	<0,1	0,4	0,2
T73	Ander/niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren	Acuut	2018	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9
			2019	0,7	1,0	0,8	0,8	1,0	0,9
			2020	0,7	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9
			2021	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
			2022	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0
T78	Persisterende ductus thyreoglossus/cyste	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,2	1,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,9	1,2	1,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,2	1,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,3	1,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,0	1,3	1,2
T80	Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	1,2	1,2
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	1,3	1,2
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,3	1,3
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,4	1,4
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,3	1,5	1,4
T81	Struma/noduli [ex. T85,T86]	Chronisch	2018	0,1	0,6	0,3	1,4	10,3	5,9

			2019	0,1	0,5	0,3	1,4	9,8	5,6
			2020	<0,1	0,5	0,3	1,5	10,3	5,9
			2021	<0,1	0,5	0,3	1,5	10,6	6,1
			2022	0,1	0,5	0,3	1,5	10,4	6,0
T82	Adipositas (Quetelet-index >30)	Langdurig	2018	3,5	7,7	5,6	6,4	14,5	10,5
			2019	3,7	7,7	5,7	6,5	14,7	10,6
			2020	3,4	6,8	5,1	6,6	14,9	10,8
			2021	5,5	10,7	8,1	8,7	18,6	13,7
			2022	4,2	9,3	6,8	7,7	18,1	12,9
T83	Overgewicht (Quetelet-index 27- 30)	Langdurig	2018	2,7	5,5	4,1	4,3	9,0	6,7
			2019	2,7	5,5	4,1	4,4	9,0	6,7
			2020	2,2	4,7	3,5	3,9	8,4	6,2
			2021	3,0	5,8	4,4	4,6	9,5	7,0
			2022	2,6	5,7	4,2	4,3	9,3	6,8
T85	Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose	Langdurig	2018	0,6	2,4	1,6	1,6	6,7	4,2
			2019	0,6	2,5	1,6	1,5	6,5	4,0
			2020	0,5	2,4	1,5	1,4	6,6	4,0
			2021	0,6	2,4	1,5	1,5	6,6	4,1
			2022	0,6	2,3	1,4	1,5	6,6	4,1
T86	Hypothyreoïdie/myxoedeem	Chronisch	2018	0,5	1,9	1,2	10,8	46,8	28,9
			2019	0,6	1,8	1,2	10,6	46,2	28,5
			2020	0,5	1,6	1,1	10,8	47,2	29,1
			2021	0,6	1,6	1,1	11,0	47,5	29,4
			2022	0,5	1,7	1,1	10,9	47,5	29,3
T87	Hypoglykemie	Acuut	2018	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2019	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
			2020	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
			2021	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
			2022	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3
T88	Renale glucosurie	Langdurig	2018	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2019	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2020	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2

			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
			2022	<0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
T90	Diabetes mellitus	Chronisch	2018	3,6	2,7	3,1	73,1	64,7	68,9
			2019	3,4	2,5	3,0	70,1	61,2	65,6
			2020	3,0	2,2	2,6	70,3	61,1	65,7
			2021	3,4	2,7	3,0	70,9	61,1	66,0
			2022	3,2	2,5	2,8	70,8	60,5	65,6
T91	Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)	Langdurig	2018	13,9	27,7	20,8	28,0	60,3	44,3
			2019	12,8	24,8	18,9	26,1	54,3	40,3
			2020	9,9	19,2	14,6	23,2	47,5	35,4
			2021	10,6	19,9	15,2	22,5	45,6	34,1
			2022	9,5	18,5	14,0	20,9	43,0	32,1
T92	Jicht	Chronisch	2018	3,2	1,8	2,5	42,0	16,9	29,3
			2019	3,0	1,5	2,3	42,9	16,8	29,8
			2020	2,8	1,4	2,1	44,3	17,2	30,7
			2021	2,7	1,3	2,0	45,1	17,3	31,1
			2022	3,0	1,3	2,2	45,7	17,2	31,3
T93	Vetstofwisselingsstoornis(sen)	Chronisch	2018	4,2	4,6	4,4	82,4	83,5	82,9
			2019	4,1	4,5	4,3	84,6	85,9	85,3
			2020	3,5	3,5	3,5	84,1	85,0	84,6
			2021	3,9	4,4	4,1	84,7	86,0	85,4
			2022	3,9	4,5	4,2	86,2	88,2	87,2
T99	Andere ziekte(n) endocriene klieren/metabolisme/voeding	Langdurig	2018	1,5	3,8	2,6	3,0	7,3	5,2
			2019	1,6	3,8	2,7	3,3	7,3	5,3
			2020	1,4	3,6	2,5	3,1	7,3	5,2
			2021	1,5	4,0	2,8	3,2	7,8	5,5
			2022	1,5	3,8	2,7	3,3	7,7	5,5
U01	Pijnlijke mictie	Acuut	2018	5,0	13,7	9,4	4,3	12,1	8,2
			2019	4,8	12,9	8,9	4,2	11,3	7,8
			2020	5,1	13,0	9,1	4,4	11,6	8,0
			2021	5,1	14,7	9,9	4,4	13,0	8,7
			2022	5,6	15,2	10,4	4,8	13,4	9,1

U02	Frequente mictie/aandrang	Acuut	2018	10,8	15,9	13,4	12,3	17,4	14,9
			2019	11,8	14,8	13,3	13,2	16,4	14,8
			2020	11,0	14,6	12,8	13,0	16,4	14,7
			2021	12,1	16,2	14,1	13,9	17,9	15,9
			2022	12,4	17,0	14,7	14,4	18,6	16,5
U04	Urine-incontinentie [ex. P12]	Langdurig	2018	2,7	9,3	6,0	4,8	17,0	11,0
			2019	2,7	8,9	5,8	4,8	16,0	10,4
			2020	2,4	7,6	5,0	4,6	14,7	9,7
			2021	2,7	8,5	5,6	4,7	14,9	9,8
			2022	2,7	8,9	5,8	4,8	15,7	10,3
U05	Ander mictieprobleem	Acuut	2018	12,8	7,4	10,1	9,9	7,0	8,5
			2019	14,2	7,4	10,8	11,0	6,9	8,9
			2020	13,6	7,3	10,5	10,5	6,9	8,7
			2021	15,8	7,8	11,8	11,8	7,5	9,6
			2022	18,3	8,0	13,1	13,5	7,5	10,5
U06	Hematurie	Acuut	2018	5,5	3,6	4,6	5,0	3,4	4,2
			2019	5,6	3,5	4,5	5,0	3,2	4,1
			2020	5,5	3,4	4,4	4,9	3,2	4,1
			2021	5,8	3,6	4,7	5,1	3,3	4,2
			2022	5,9	3,6	4,8	5,3	3,5	4,4
U07	Andere symptomen/klachten urine	Acuut	2018	2,9	5,0	3,9	2,4	4,5	3,4
			2019	3,1	4,7	3,9	2,6	4,3	3,4
			2020	3,0	4,5	3,7	2,5	4,0	3,3
			2021	3,4	5,8	4,6	2,8	5,2	4,0
			2022	3,5	5,8	4,6	2,8	5,2	4,0
U13	Andere symptomen/klachten blaas	Acuut	2018	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
			2019	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
			2020	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
			2021	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
			2022	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
U14	Symptomen/klachten nieren	Acuut	2018	0,7	0,5	0,6	0,8	0,5	0,7
			2019	0,7	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7

			2020	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8
			2021	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7
			2022	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6
U26	Angst voor kanker urinewegen	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
U27	Angst voor andere ziekte urinewegen	Acuut	2018	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,3
			2019	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2
			2020	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2
			2021	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
			2022	0,1	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2
U28	Functiebeperking/handicap urinewegen	Chronisch	2018	0,2	0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2019	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,6	0,9
			2020	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2021	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
			2022	0,2	<0,1	0,1	1,1	0,7	0,9
U29	Andere symptomen/klachten urinewegen	Acuut	2018	0,5	0,9	0,7	0,5	1,0	0,8
			2019	0,7	1,3	1,0	0,8	1,4	1,1
			2020	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
			2021	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2022	0,6	1,0	0,8	0,7	1,0	0,9
U70	Acute pyelonephritis/pyelitis	Acuut	2018	0,9	3,0	2,0	0,8	2,9	1,9
			2019	0,9	2,9	1,9	0,8	2,7	1,8
			2020	0,9	2,9	1,9	0,8	2,7	1,8
			2021	1,1	2,9	2,0	1,0	2,7	1,8
			2022	1,0	3,1	2,1	0,9	2,9	1,9
U71	Cystitis/urinewegsinfectie	Acuut	2018	19,6	125,0	72,7	17,6	104,0	61,1
			2019	19,8	123,7	72,1	17,4	102,8	60,4
			2020	19,9	119,3	69,9	17,6	99,8	58,9
			2021	19,8	116,5	68,4	17,4	97,9	57,9

			2022	20,3	115,0	67,9	17,9	96,4	57,3
U72	Niet specifieke urethritis [ex. X99,Y99]	Acuut	2018	0,7	<0,1	0,4	0,7	<0,1	0,4
			2019	0,6	<0,1	0,3	0,6	<0,1	0,3
			2020	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,3
			2021	0,4	<0,1	0,3	0,4	<0,1	0,2
			2022	0,5	<0,1	0,3	0,5	<0,1	0,3
U75	Maligniteit nier	Chronisch	2018	0,2	0,1	0,2	1,8	1,1	1,5
			2019	0,2	0,1	0,1	1,8	1,2	1,5
			2020	0,2	<0,1	0,1	1,8	1,2	1,5
			2021	0,2	0,1	0,2	1,8	1,2	1,5
			2022	0,2	<0,1	0,1	1,8	1,2	1,5
U76	Maligniteit blaas	Chronisch	2018	0,5	0,1	0,3	5,0	1,6	3,2
			2019	0,5	0,1	0,3	5,0	1,6	3,3
			2020	0,5	0,2	0,3	5,2	1,6	3,4
			2021	0,5	0,2	0,3	5,3	1,7	3,5
			2022	0,4	0,2	0,3	5,2	1,7	3,5
U77	Andere maligniteit urinewegen	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,2	0,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,2	0,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,3	0,1	0,2
U78	Benigne neoplasma urinewegen	Acuut	2018	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2019	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2020	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2022	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
U79	Niet-gespecificeerd neoplasma urinewegen	Acuut	2018	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
			2019	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
			2020	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3
			2021	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3
			2022	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3
U80	Letsel urinewegen	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
U85	Aangeboren afwijking(en) urinewegen	Chronisch	2018	0,1	<0,1	<0,1	2,0	2,0	2,0
			2019	0,1	0,1	0,1	2,1	2,0	2,1
			2020	0,1	0,1	0,1	2,2	2,1	2,2
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	2,3	2,1	2,2
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	2,3	2,2	2,2
U88	Glomerulonephritis/nefroze	Chronisch	2018	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,6	1,7
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,5	1,6
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	1,8	1,4	1,6
U90	Orthostatische proteïnurie	Langdurig	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2021	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
U95	Urolithiasis (alle vormen/lokalisaties)	Langdurig	2018	4,5	3,1	3,8	7,8	5,3	6,5
			2019	4,5	3,0	3,8	7,7	5,2	6,4
			2020	4,4	2,9	3,6	7,9	5,2	6,5
			2021	4,5	3,1	3,8	7,9	5,3	6,6
			2022	4,4	2,9	3,7	7,9	5,3	6,6
U98	Afwijkende uitslag urine-onderzoek	Acuut	2018	3,6	2,4	3,0	2,7	2,0	2,4
			2019	3,6	2,4	3,0	2,8	2,1	2,4
			2020	3,6	2,3	2,9	2,8	1,9	2,3
			2021	3,6	2,5	3,1	2,8	2,1	2,5
			2022	3,8	2,7	3,3	3,1	2,3	2,7
U99	Andere ziekte(n) urinewegen	Langdurig	2018	9,5	11,1	10,3	17,3	20,1	18,7
			2019	10,7	12,1	11,4	19,7	21,9	20,8
			2020	10,1	11,5	10,8	20,2	22,5	21,4

			2021	9,9	11,4	10,7	19,7	22,0	20,8
			2022	10,1	10,9	10,4	20,1	21,5	20,7
W01	Vraag bestaan zwangerschap [ex. W02]	Acuut	2018	-	1,4	0,7	-	1,3	0,6
			2019	-	1,1	0,6	-	1,1	0,5
			2020	-	1,1	0,5	-	1,1	0,5
			2021	-	1,1	0,5	-	1,1	0,5
			2022	-	1,0	0,5	-	0,9	0,5
W02	Angst zwanger te zijn	Acuut	2018	-	2,0	1,0	-	2,0	1,0
			2019	-	1,6	0,8	-	1,6	0,8
			2020	-	1,6	0,8	-	1,6	0,8
			2021	-	1,3	0,7	-	1,3	0,7
			2022	-	1,2	0,6	-	1,2	0,6
W03	Bloedverlies tijdens zwangerschap	Acuut	2018	-	0,5	0,2	-	0,4	0,2
			2019	-	0,3	0,2	-	0,3	0,2
			2020	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
			2021	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
			2022	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
W05	Misselijkheid/braken in zwangerschap	Acuut	2018	-	2,0	1,0	-	2,1	1,0
			2019	-	1,7	0,9	-	1,8	0,9
			2020	-	2,1	1,1	-	2,1	1,1
			2021	-	2,2	1,1	-	2,3	1,2
			2022	-	2,2	1,1	-	2,2	1,1
W10	Morning after pil/postcoïtale anticonceptie	Acuut	2018	-	0,5	0,2	-	0,4	0,2
			2019	-	0,5	0,3	-	0,5	0,2
			2020	-	0,5	0,3	-	0,5	0,2
			2021	-	0,5	0,2	-	0,4	0,2
			2022	-	0,5	0,2	-	0,4	0,2
W11	Anticonceptie: orale anticonceptie	Langdurig	2018	0,1	37,7	19,0	0,2	88,8	44,8
			2019	0,1	35,9	18,1	0,3	87,4	44,1
			2020	0,1	30,8	15,5	0,2	81,2	41,0
			2021	<0,1	29,9	15,1	0,2	78,9	39,8
			2022	<0,1	28,6	14,4	0,2	75,7	38,2

W12	Anticonceptie: IUD	Langdurig	2018	<0,1	23,8	12,0	<0,1	39,5	19,9
			2019	<0,1	24,5	12,4	0,1	41,2	20,8
			2020	<0,1	24,2	12,2	<0,1	41,5	20,9
			2021	<0,1	26,1	13,2	0,1	44,7	22,5
			2022	<0,1	24,5	12,3	0,1	42,6	21,5
W13	Sterilisatie vrouw	Langdurig	2018	-	1,0	0,5	-	1,7	0,9
			2019	-	0,7	0,4	-	1,4	0,7
			2020	-	0,6	0,3	-	1,0	0,5
			2021	-	0,7	0,3	-	1,0	0,5
			2022	-	0,6	0,3	-	1,0	0,5
W14	Andere anticonceptie vrouw	Langdurig	2018	-	10,2	5,1	-	22,8	11,5
			2019	-	9,7	4,9	-	21,6	10,9
			2020	-	9,1	4,6	-	21,7	10,9
			2021	-	9,8	4,9	-	22,4	11,3
			2022	-	9,3	4,7	-	22,0	11,1
W15	Sub-/infertiliteit vrouw	Langdurig	2018	-	3,6	1,8	-	6,5	3,3
			2019	-	3,5	1,8	-	6,1	3,1
			2020	-	3,3	1,6	-	6,2	3,1
			2021	-	3,6	1,8	-	6,6	3,3
			2022	-	2,9	1,5	-	5,8	2,9
W17	Hevig bloedverlies post-partum	Acuut	2018	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
			2019	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
			2020	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
			2021	-	0,3	0,1	-	0,3	0,1
			2022	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
W18	Andere klachten post-partum/kraambed	Acuut	2018	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
			2019	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
			2020	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
			2021	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
			2022	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
W19	Symptomen/klachten borstvoeding	Acuut	2018	-	1,2	0,6	-	1,2	0,6
			2019	-	1,0	0,5	-	1,1	0,5

			2020	-	1,1	0,6	-	1,1	0,6
			2021	-	1,3	0,6	-	1,3	0,7
			2022	-	1,2	0,6	-	1,2	0,6
W20	Andere symptomen/klachten borsten zwangerschap/kraambed	Acuut	2018	-	1,0	0,5	-	0,9	0,4
			2019	-	0,9	0,4	-	0,8	0,4
			2020	-	1,0	0,5	-	0,9	0,4
			2021	-	1,1	0,5	-	0,9	0,5
			2022	-	0,9	0,5	-	0,7	0,4
W27	Angst voor complicaties zwangerschap/bevalling	Acuut	2018	-	0,1	<0,1	-	0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
W28	Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap	Chronisch	2018	-	0,2	0,1	-	2,7	1,4
			2019	-	0,3	0,1	-	2,7	1,4
			2020	-	0,3	0,2	-	3,0	1,5
			2021	-	0,1	<0,1	-	3,1	1,6
			2022	-	0,1	<0,1	-	3,1	1,5
W29	And. sympt./klacht. zwangersch./beval./kraamb./anticonceptie	Acuut	2018	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
			2019	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
			2020	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
			2021	-	0,3	0,2	-	0,3	0,2
			2022	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
W70	Puerperale infectie/sepsis	Acuut	2018	-	0,2	0,1	-	0,2	<0,1
			2019	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
			2020	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
			2021	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
			2022	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
W71	Andere infectie(s) zwangerschap/kraambed [ex. W70]	Acuut	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1

			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
W72	Maligniteit in verband met zwangerschap	Chronisch	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
W73	Benigne neoplasma in verband met zwangerschap	Acuut	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
W75	Zwangerschap complicerende letsels	Acuut	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
W76	Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder	Chronisch	2018	-	<0,1	<0,1	-	0,4	0,2
			2019	-	<0,1	<0,1	-	0,3	0,2
			2020	-	<0,1	<0,1	-	0,4	0,2
			2021	-	<0,1	<0,1	-	0,4	0,2
			2022	-	<0,1	<0,1	-	0,4	0,2
W77	Zwangerschap complicerende niet-obstetrische factor	Langdurig	2018	-	0,2	<0,1	-	0,3	0,1
			2019	-	0,1	<0,1	-	0,2	0,1
			2020	-	0,1	<0,1	-	0,2	0,1
			2021	-	0,2	<0,1	-	0,3	0,1
			2022	-	0,1	<0,1	-	0,2	0,1
W78	Zwangerschap: bevestigd	Langdurig	2018	-	17,2	8,7	-	30,3	15,3
			2019	-	17,3	8,7	-	30,1	15,2
			2020	-	17,1	8,6	-	31,3	15,8
			2021	-	17,1	8,6	-	30,9	15,6
			2022	-	16,3	8,2	-	30,4	15,3
W79	Ongewenste zwangerschap: bevestigd	Langdurig	2018	-	2,6	1,3	-	4,1	2,1

			2019	-	2,2	1,1	-	3,5	1,7
			2020	-	2,1	1,1	-	3,4	1,7
			2021	-	2,1	1,0	-	3,3	1,7
			2022	-	2,1	1,1	-	3,3	1,7
W80	Ectopische zwangerschap	Langdurig	2018	-	0,3	0,1	-	0,5	0,2
			2019	-	0,3	0,2	-	0,5	0,2
			2020	-	0,3	0,1	-	0,5	0,3
			2021	-	0,3	0,2	-	0,5	0,3
			2022	-	0,3	0,1	-	0,5	0,2
W81	Toxicose/(pre-)eclampsie	Langdurig	2018	-	0,5	0,2	-	0,8	0,4
			2019	-	0,5	0,2	-	0,8	0,4
			2020	-	0,5	0,2	-	0,8	0,4
			2021	-	0,6	0,3	-	1,0	0,5
			2022	-	0,5	0,3	-	1,0	0,5
W82	Spontane abortus	Acuut	2018	-	3,6	1,8	-	3,4	1,7
			2019	-	3,4	1,7	-	3,2	1,6
			2020	-	3,5	1,8	-	3,3	1,7
			2021	-	3,7	1,9	-	3,5	1,7
			2022	-	3,5	1,8	-	3,2	1,6
W83	Abortus provocatus	Acuut	2018	-	1,7	0,9	-	1,7	0,8
			2019	-	1,3	0,7	-	1,3	0,6
			2020	-	1,2	0,6	-	1,2	0,6
			2021	-	1,3	0,6	-	1,2	0,6
			2022	-	1,2	0,6	-	1,2	0,6
W84	Zwangerschap met verhoogd risico	Langdurig	2018	-	2,0	1,0	-	3,3	1,7
			2019	-	1,9	1,0	-	3,2	1,7
			2020	-	2,0	1,0	-	3,4	1,8
			2021	-	2,1	1,0	-	3,6	1,8
			2022	-	2,1	1,1	-	3,8	1,9
W90	Normale bevalling levendgeborene	Acuut	2018	0,3	18,2	9,3	0,3	15,1	7,7
			2019	0,3	19,0	9,7	0,3	15,3	7,9
			2020	0,6	20,1	10,4	0,6	16,5	8,6

			2021	0,6	21,4	11,1	0,6	17,4	9,1
			2022	0,9	20,8	10,9	0,8	17,2	9,1
W91	Normale bevalling doodgeborene	Acuut	2018	<0,1	0,2	<0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2019	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2020	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2021	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	<0,1
			2022	<0,1	0,2	0,1	<0,1	0,2	0,1
W92	Gecompliceerde bevalling levendgeborene	Acuut	2018	<0,1	3,9	2,0	<0,1	3,2	1,7
			2019	0,1	3,9	2,0	<0,1	3,2	1,6
			2020	0,1	4,1	2,1	0,1	3,4	1,8
			2021	0,1	4,3	2,2	0,2	3,5	1,8
			2022	0,2	3,9	2,1	0,2	3,3	1,8
W93	Gecompliceerde bevalling doodgeborene	Acuut	2018	-	0,2	0,1	-	0,2	<0,1
			2019	-	0,2	<0,1	-	0,1	<0,1
			2020	-	0,2	0,1	-	0,2	<0,1
			2021	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
			2022	-	0,2	<0,1	-	0,1	<0,1
W94	Mastitis puerperalis	Acuut	2018	-	1,9	1,0	-	1,8	0,9
			2019	-	1,9	1,0	-	1,8	0,9
			2020	-	2,0	1,0	-	1,9	1,0
			2021	-	2,0	1,0	-	1,8	0,9
			2022	-	2,1	1,1	-	1,9	1,0
W95	Andere aandoening borsten kraambed	Acuut	2018	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
			2019	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
			2020	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
			2021	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
			2022	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
W96	Andere complicatie(s) kraambed	Acuut	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1

W99	And. ziekte(n) ivm zwangersch./beval./kraamb./anticonceptie	Langdurig	2018	-	0,2	0,1	-	0,4	0,3
			2019	-	0,1	<0,1	-	0,2	0,1
			2020	-	0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2021	-	0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2022	-	0,1	<0,1	-	0,2	0,1
X01	Pijn geslachtsorganen vrouw	Acuut	2018	-	1,5	0,7	-	1,4	0,7
			2019	-	1,4	0,7	-	1,3	0,7
			2020	-	1,2	0,6	-	1,2	0,6
			2021	-	1,4	0,7	-	1,3	0,6
			2022	-	1,4	0,7	-	1,3	0,6
X02	Pijnlijke menstruatie	Langdurig	2018	-	3,8	1,9	-	7,9	4,0
			2019	-	4,2	2,1	-	8,1	4,1
			2020	-	4,1	2,0	-	8,4	4,2
			2021	-	4,3	2,2	-	8,8	4,4
			2022	-	4,4	2,2	-	9,0	4,5
X03	Intermenstruele pijn	Langdurig	2018	-	0,2	0,1	-	0,4	0,2
			2019	-	0,2	0,1	-	0,4	0,2
			2020	-	0,2	<0,1	-	0,3	0,2
			2021	-	0,2	0,1	-	0,4	0,2
			2022	-	0,2	<0,1	-	0,3	0,2
X04	Pijnlijke coïtus vrouw	Langdurig	2018	-	1,7	0,9	-	2,8	1,4
			2019	-	1,6	0,8	-	2,7	1,4
			2020	-	1,5	0,7	-	2,6	1,3
			2021	-	1,6	0,8	-	2,7	1,4
			2022	-	1,6	0,8	-	2,8	1,4
X05	Amenorroe/hypomenorroe/oligomenorroe	Langdurig	2018	-	3,2	1,6	-	5,3	2,7
			2019	-	2,9	1,5	-	4,9	2,5
			2020	-	2,8	1,4	-	4,7	2,4
			2021	-	3,1	1,6	-	5,3	2,7
			2022	-	2,7	1,4	-	4,9	2,4
X06	Menorragie	Langdurig	2018	-	7,4	3,7	-	13,7	6,9
			2019	-	7,3	3,7	-	13,4	6,7

			2020	-	6,5	3,3	-	13,0	6,5
			2021	-	7,2	3,6	-	13,5	6,8
			2022	-	7,1	3,6	-	13,4	6,8
X07	Onregelmatige/frequente menstruatie	Langdurig	2018	-	6,6	3,3	-	11,9	6,0
			2019	-	6,2	3,2	-	11,0	5,6
			2020	-	6,3	3,2	-	11,5	5,8
			2021	-	6,6	3,3	-	11,9	6,0
			2022	-	6,9	3,5	-	12,3	6,2
X08	Intermenstrueel bloedverlies	Langdurig	2018	-	4,6	2,3	-	7,9	4,0
			2019	-	4,5	2,3	-	7,5	3,8
			2020	-	4,9	2,5	-	8,2	4,2
			2021	-	5,0	2,5	-	8,7	4,4
			2022	-	4,9	2,5	-	8,5	4,3
X09	Premenstruele symptomen/klachten	Langdurig	2018	-	0,4	0,2	-	0,7	0,3
			2019	-	0,4	0,2	-	0,7	0,3
			2020	-	0,4	0,2	-	0,7	0,3
			2021	-	0,4	0,2	-	0,8	0,4
			2022	-	0,4	0,2	-	0,7	0,4
X10	Uitstel van de menstruatie	Acuut	2018	-	7,8	3,9	-	6,5	3,3
			2019	-	8,1	4,1	-	6,6	3,3
			2020	-	4,6	2,3	-	3,7	1,9
			2021	-	5,7	2,9	-	4,7	2,4
			2022	-	7,8	4,0	-	6,5	3,3
X11	Climacteriële symptomen/klachten	Langdurig	2018	-	9,2	4,7	-	18,1	9,1
			2019	-	9,0	4,5	-	17,5	8,9
			2020	-	7,8	3,9	-	16,8	8,5
			2021	-	8,8	4,5	-	17,6	8,9
			2022	-	9,1	4,6	-	18,4	9,3
X12	Postmenopauzaal bloedverlies	Langdurig	2018	-	3,2	1,6	-	5,2	2,6
			2019	-	3,2	1,6	-	5,2	2,6
			2020	-	3,3	1,6	-	5,5	2,8
			2021	-	3,5	1,7	-	5,7	2,9

			2022	-	3,5	1,8	-	5,8	2,9
X13	Bloedverlies na coïtus	Langdurig	2018	-	2,4	1,2	-	4,1	2,0
			2019	-	2,5	1,2	-	4,1	2,0
			2020	-	2,7	1,4	-	4,4	2,2
			2021	-	2,6	1,3	-	4,5	2,3
			2022	-	2,5	1,3	-	4,2	2,1
X14	Vaginale afscheiding [ex. X08]	Acuut	2018	-	14,0	7,1	-	12,7	6,4
			2019	-	12,8	6,5	-	11,5	5,8
			2020	-	11,8	5,9	-	10,7	5,4
			2021	-	11,2	5,6	-	10,1	5,1
			2022	-	11,0	5,6	-	10,1	5,1
X15	Andere symptomen/klachten vagina	Acuut	2018	-	12,5	6,3	-	11,3	5,7
			2019	-	12,3	6,2	-	11,0	5,6
			2020	-	12,6	6,4	-	11,3	5,7
			2021	-	13,1	6,6	-	11,8	6,0
			2022	-	12,9	6,5	-	11,6	5,9
X16	Symptomen/klachten vulva	Acuut	2018	-	7,5	3,8	-	6,5	3,3
			2019	-	7,8	3,9	-	6,8	3,4
			2020	-	7,9	4,0	-	6,7	3,4
			2021	-	8,3	4,2	-	7,1	3,6
			2022	-	8,0	4,0	-	6,9	3,5
X17	Symptomen/klachten kleine bekken	Acuut	2018	-	2,3	1,2	-	2,0	1,0
			2019	-	2,4	1,2	-	2,2	1,1
			2020	-	2,1	1,1	-	1,9	1,0
			2021	-	2,5	1,3	-	2,3	1,2
			2022	-	2,7	1,4	-	2,4	1,3
X18	Pijn in de borsten vrouw	Acuut	2018	-	6,5	3,3	-	5,8	2,9
			2019	-	7,1	3,6	-	6,4	3,2
			2020	-	7,3	3,7	-	6,5	3,3
			2021	-	8,2	4,1	-	7,4	3,7
			2022	-	7,4	3,7	-	6,7	3,4
X19	Knobbel/zwelling borst(en) vrouw	Acuut	2018	-	11,4	5,7	-	9,9	5,0

			2019	-	11,7	5,9	-	10,3	5,2
			2020	-	12,2	6,2	-	10,8	5,4
			2021	-	13,3	6,7	-	11,7	5,9
			2022	-	12,8	6,5	-	11,0	5,6
X20	Symptomen/klachten tepel vrouw	Acuut	2018	-	2,8	1,4	-	2,5	1,3
			2019	-	2,9	1,5	-	2,5	1,3
			2020	-	3,0	1,5	-	2,7	1,3
			2021	-	2,9	1,5	-	2,6	1,3
			2022	-	2,9	1,5	-	2,6	1,3
X21	Andere symptomen/klachten borsten vrouw	Acuut	2018	-	6,5	3,3	-	6,1	3,1
			2019	-	6,3	3,2	-	5,9	3,0
			2020	-	5,3	2,7	-	5,1	2,6
			2021	-	6,2	3,2	-	5,8	2,9
			2022	-	5,7	2,9	-	5,3	2,7
X23	Angst voor geslachtsziekte vrouw	Acuut	2018	-	13,5	6,8	-	12,5	6,3
			2019	-	12,9	6,5	-	11,9	6,0
			2020	-	11,5	5,8	-	10,9	5,5
			2021	-	11,3	5,7	-	10,7	5,4
			2022	-	10,8	5,4	-	10,3	5,2
X24	Angst voor seksueel disfunctioneren vrouw	Acuut	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
X25	Angst voor kanker geslachtsorganen vrouw	Acuut	2018	-	0,3	0,2	-	0,3	0,2
			2019	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
			2020	-	0,3	0,2	-	0,3	0,2
			2021	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
			2022	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
X26	Angst voor borstkanker vrouw	Acuut	2018	-	2,7	1,3	-	2,6	1,3
			2019	-	2,8	1,4	-	2,7	1,3
			2020	-	2,0	1,0	-	1,9	1,0

			2021	-	2,2	1,1	-	2,1	1,0
			2022	-	2,0	1,0	-	1,9	0,9
X27	Angst voor andere ziekte geslachtsorganen/borsten vrouw	Acuut	2018	-	0,2	0,1	-	0,2	<0,1
			2019	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
			2020	-	0,2	<0,1	-	0,2	0,1
			2021	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
			2022	-	0,2	<0,1	-	0,2	<0,1
X28	Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw	Chronisch	2018	-	<0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
X29	Andere symptomen/klachten geslachtsorganen vrouw	Acuut	2018	-	1,0	0,5	-	1,1	0,6
			2019	-	1,4	0,7	-	1,5	0,8
			2020	-	0,6	0,3	-	0,7	0,3
			2021	-	0,7	0,3	-	0,7	0,4
			2022	-	0,8	0,4	-	0,9	0,5
X70	Lues vrouw [ex. A90]	Acuut	2018	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2019	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2020	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2021	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
			2022	-	<0,1	<0,1	-	<0,1	<0,1
X71	Gonorrhoe vrouw	Acuut	2018	-	0,6	0,3	-	0,5	0,3
			2019	-	0,6	0,3	-	0,5	0,3
			2020	-	0,6	0,3	-	0,5	0,3
			2021	-	0,5	0,2	-	0,5	0,2
			2022	-	0,6	0,3	-	0,5	0,3
X72	Candidiasis urogenitale vrouw	Acuut	2018	-	23,7	12,0	-	20,8	10,5
			2019	-	21,1	10,7	-	18,4	9,3
			2020	-	20,5	10,3	-	17,8	9,0
			2021	-	21,3	10,8	-	18,9	9,5
			2022	-	21,6	10,9	-	19,2	9,7

X73	Trichomonas urogenitale vrouw	Acuut	2018	-	0,3	0,2	-	0,3	0,2
			2019	-	0,3	0,1	-	0,3	0,1
			2020	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
			2021	-	0,3	0,1	-	0,3	0,1
			2022	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
X74	Ontsteking kleine bekken/PID	Acuut	2018	-	0,7	0,3	-	0,6	0,3
			2019	-	0,6	0,3	-	0,6	0,3
			2020	-	0,6	0,3	-	0,6	0,3
			2021	-	0,6	0,3	-	0,6	0,3
			2022	-	0,7	0,3	-	0,6	0,3
X75	Maligniteit cervix uteri	Chronisch	2018	-	0,2	0,1	-	5,4	2,7
			2019	-	0,2	0,1	-	5,1	2,6
			2020	-	0,2	<0,1	-	5,4	2,7
			2021	-	0,2	0,1	-	5,3	2,7
			2022	-	0,2	0,1	-	5,3	2,7
X76	Maligniteit borst vrouw	Chronisch	2018	-	1,7	0,9	-	28,6	14,4
			2019	-	1,6	0,8	-	29,1	14,7
			2020	-	1,4	0,7	-	29,5	14,9
			2021	-	1,8	0,9	-	30,3	15,3
			2022	-	1,6	0,8	-	30,6	15,4
X77	Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw	Chronisch	2018	-	0,4	0,2	-	5,8	2,9
			2019	-	0,4	0,2	-	5,7	2,9
			2020	-	0,4	0,2	-	5,9	3,0
			2021	-	0,4	0,2	-	6,1	3,1
			2022	-	0,4	0,2	-	6,1	3,1
X78	Benigne neoplasma uterus/cervix uteri	Acuut	2018	-	3,7	1,9	-	4,1	2,1
			2019	-	3,3	1,7	-	3,7	1,9
			2020	-	2,8	1,4	-	3,3	1,6
			2021	-	3,3	1,6	-	3,5	1,8
			2022	-	2,9	1,5	-	3,3	1,6
X79	Benigne neoplasma borsten vrouw [ex. X88]	Acuut	2018	-	0,8	0,4	-	0,9	0,5
			2019	-	0,8	0,4	-	0,9	0,5

			2020	-	0,7	0,3	-	0,8	0,4
			2021	-	0,8	0,4	-	0,9	0,4
			2022	-	0,8	0,4	-	0,8	0,4
X80	Ander benigne neoplasma geslachtsorganen vrouw	Acuut	2018	-	1,4	0,7	-	1,6	0,8
			2019	-	1,4	0,7	-	1,5	0,8
			2020	-	1,2	0,6	-	1,4	0,7
			2021	-	1,3	0,7	-	1,5	0,8
			2022	-	1,3	0,6	-	1,4	0,7
X81	Ander/niet-gespecificeerd neoplasma geslachtsorganen vrouw	Acuut	2018	-	0,1	<0,1	-	0,1	<0,1
			2019	-	0,1	<0,1	-	0,1	<0,1
			2020	-	0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
			2021	-	0,1	<0,1	-	0,1	<0,1
			2022	-	0,1	<0,1	-	0,2	<0,1
X82	Letsel geslachtsorganen vrouw	Acuut	2018	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
			2019	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
			2020	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
			2021	-	0,5	0,2	-	0,4	0,2
			2022	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
X83	Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw	Chronisch	2018	-	<0,1	<0,1	-	1,4	0,7
			2019	-	<0,1	<0,1	-	1,3	0,7
			2020	-	<0,1	<0,1	-	1,4	0,7
			2021	-	<0,1	<0,1	-	1,5	0,8
			2022	-	<0,1	<0,1	-	1,5	0,8
X84	Vaginitis/vulvitis nao	Acuut	2018	-	18,0	9,1	-	15,9	8,0
			2019	-	16,8	8,5	-	14,8	7,5
			2020	-	16,3	8,2	-	14,3	7,2
			2021	-	14,6	7,4	-	12,9	6,5
			2022	-	13,1	6,6	-	11,5	5,8
X85	Cervicitis/andere ziekte cervix	Acuut	2018	-	1,9	0,9	-	1,7	0,9
			2019	-	1,8	0,9	-	1,7	0,9
			2020	-	1,8	0,9	-	1,7	0,8
			2021	-	1,6	0,8	-	1,5	0,8

			2022	-	1,5	0,8	-	1,4	0,7
X86	Afwijkende cervixuitstrijk	Langdurig	2018	-	5,8	2,9	-	9,7	4,9
			2019	-	5,5	2,8	-	9,4	4,8
			2020	-	5,3	2,7	-	9,3	4,7
			2021	-	6,6	3,3	-	10,6	5,4
			2022	-	5,8	2,9	-	10,5	5,3
X87	Prolaps vagina/uterus	Langdurig	2018	-	5,8	2,9	-	12,1	6,1
			2019	-	6,3	3,2	-	12,9	6,5
			2020	-	5,4	2,7	-	12,5	6,3
			2021	-	6,0	3,0	-	12,7	6,4
			2022	-	6,3	3,2	-	13,5	6,8
X88	Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten	Chronisch	2018	-	1,4	0,7	-	32,8	16,6
			2019	-	1,2	0,6	-	31,3	15,8
			2020	-	1,1	0,6	-	33,3	16,8
			2021	-	1,2	0,6	-	34,3	17,3
			2022	-	1,0	0,5	-	33,6	17,0
X89	Premenstrueel spanningssyndroom	Langdurig	2018	-	0,7	0,3	-	1,2	0,6
			2019	-	0,6	0,3	-	1,3	0,6
			2020	-	0,6	0,3	-	1,3	0,6
			2021	-	0,7	0,3	-	1,4	0,7
			2022	-	0,7	0,3	-	1,4	0,7
X90	Herpes genitalis vrouw	Acuut	2018	-	2,5	1,3	-	2,6	1,3
			2019	-	2,4	1,2	-	2,4	1,2
			2020	-	2,4	1,2	-	2,6	1,3
			2021	-	2,3	1,2	-	2,5	1,2
			2022	-	2,5	1,3	-	2,6	1,3
X91	Condylomata acuminata vrouw	Acuut	2018	-	2,3	1,2	-	2,4	1,2
			2019	-	2,3	1,2	-	2,4	1,2
			2020	-	2,2	1,1	-	2,5	1,2
			2021	-	2,2	1,1	-	2,4	1,2
			2022	-	2,1	1,0	-	2,3	1,2
X99	Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten vrouw	Langdurig	2018	-	5,2	2,6	-	9,6	4,8

			2019	-	5,2	2,6	-	9,4	4,8
			2020	-	4,9	2,5	-	9,2	4,7
			2021	-	5,1	2,6	-	9,4	4,8
			2022	-	4,9	2,5	-	9,3	4,7
Y01	Pijn in penis	Acuut	2018	0,6	-	0,3	0,5	-	0,3
			2019	0,6	-	0,3	0,5	-	0,2
			2020	0,5	-	0,3	0,5	-	0,2
			2021	0,6	-	0,3	0,5	-	0,2
			2022	0,6	-	0,3	0,5	-	0,2
Y02	Pijn testis/scrotum	Acuut	2018	2,6	-	1,3	2,3	-	1,1
			2019	2,7	-	1,4	2,3	-	1,1
			2020	2,7	-	1,3	2,3	-	1,1
			2021	3,1	-	1,6	2,6	-	1,3
			2022	3,7	-	1,9	3,2	-	1,6
Y03	Afscheiding penis/urethra	Acuut	2018	0,6	-	0,3	0,5	-	0,2
			2019	0,5	-	0,3	0,4	-	0,2
			2020	0,5	-	0,3	0,4	-	0,2
			2021	0,6	-	0,3	0,5	-	0,2
			2022	0,5	-	0,3	0,5	-	0,2
Y04	Andere symptomen/klachten penis	Acuut	2018	8,1	-	4,0	6,7	-	3,3
			2019	7,8	-	3,9	6,4	-	3,2
			2020	7,6	-	3,8	6,3	-	3,2
			2021	7,9	-	3,9	6,5	-	3,2
			2022	8,2	-	4,1	6,6	-	3,3
Y05	Symptomen/klachten scrotum/testis	Acuut	2018	5,7	-	2,8	5,0	-	2,5
			2019	6,1	-	3,1	5,3	-	2,7
			2020	6,0	-	3,0	5,2	-	2,6
			2021	6,5	-	3,3	5,6	-	2,8
			2022	7,5	-	3,7	6,5	-	3,3
Y06	Symptomen/klachten prostaat	Acuut	2018	7,2	-	3,6	8,3	-	4,1
			2019	7,8	-	3,9	8,6	-	4,3
			2020	6,6	-	3,3	7,9	-	4,0

			2021	6,8	-	3,4	7,9	-	4,0
			2022	7,2	-	3,6	8,3	-	4,2
Y07	Symptomen/klachten potentie [ex. P07,P08]	Langdurig	2018	5,2	-	2,6	10,2	-	5,1
			2019	4,5	-	2,3	9,2	-	4,6
			2020	4,1	-	2,0	8,8	-	4,4
			2021	4,5	-	2,2	9,0	-	4,5
			2022	4,3	-	2,1	8,8	-	4,4
Y08	Ander seksueel probleem man [ex. P07,P08]	Acuut	2018	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2
			2019	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2
			2020	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
			2021	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
			2022	0,3	-	0,2	0,3	-	0,1
Y10	Sub-/infertiliteit man	Langdurig	2018	1,8	-	0,9	2,9	-	1,4
			2019	1,7	-	0,9	2,8	-	1,4
			2020	1,9	-	0,9	3,1	-	1,5
			2021	2,1	-	1,1	3,5	-	1,7
			2022	1,8	-	0,9	3,1	-	1,5
Y13	Sterilisatie man	Langdurig	2018	3,8	-	1,9	6,1	-	3,0
			2019	3,8	-	1,9	6,4	-	3,2
			2020	3,3	-	1,7	5,8	-	2,9
			2021	3,7	-	1,8	5,9	-	3,0
			2022	4,2	-	2,1	6,7	-	3,4
Y14	Andere anticonceptie man	Langdurig	2018	<0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2019	<0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2020	<0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2021	<0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2022	<0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
Y16	Symptomen/klachten borsten man	Acuut	2018	1,3	-	0,6	1,1	-	0,6
			2019	1,3	-	0,7	1,2	-	0,6
			2020	1,3	-	0,6	1,2	-	0,6
			2021	1,3	-	0,6	1,1	-	0,6
			2022	1,3	-	0,7	1,2	-	0,6

Y24	Angst voor seksueel disfunctioneren man	Acuut	2018	<0,1	-	<0,1	<0,1	-	<0,1
			2019	<0,1	-	<0,1	<0,1	-	<0,1
			2020	<0,1	-	<0,1	<0,1	-	<0,1
			2021	<0,1	-	<0,1	<0,1	-	<0,1
			2022	<0,1	-	<0,1	<0,1	-	<0,1
Y25	Angst voor geslachtsziekte man	Acuut	2018	11,2	-	5,6	10,6	-	5,3
			2019	11,5	-	5,7	10,7	-	5,3
			2020	9,3	-	4,6	9,0	-	4,5
			2021	9,1	-	4,5	8,5	-	4,2
			2022	9,5	-	4,7	9,0	-	4,5
Y26	Angst voor kanker geslachtsorganen man	Acuut	2018	1,9	-	0,9	1,7	-	0,9
			2019	2,3	-	1,1	2,1	-	1,1
			2020	1,6	-	0,8	1,7	-	0,9
			2021	1,9	-	0,9	1,8	-	0,9
			2022	2,1	-	1,1	2,0	-	1,0
Y27	Angst andere ziekte geslachtsorganen/borsten man	Acuut	2018	0,2	-	<0,1	0,2	-	<0,1
			2019	0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2020	0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2021	0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
			2022	0,1	-	<0,1	0,1	-	<0,1
Y28	Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man	Chronisch	2018	0,3	-	0,1	2,6	-	1,3
			2019	0,2	-	0,1	2,5	-	1,2
			2020	0,1	-	<0,1	2,6	-	1,3
			2021	0,1	-	<0,1	2,6	-	1,3
			2022	<0,1	-	<0,1	2,5	-	1,2
Y29	Andere symptomen/klachten geslachtsorganen man	Acuut	2018	2,6	-	1,3	2,5	-	1,2
			2019	2,6	-	1,3	2,4	-	1,2
			2020	2,4	-	1,2	2,2	-	1,1
			2021	2,5	-	1,3	2,3	-	1,2
			2022	2,6	-	1,3	2,4	-	1,2
Y70	Lues man [ex. A90]	Acuut	2018	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
			2019	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2

			2020	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2
			2021	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2
			2022	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2
Y71	Gonorroë man	Acuut	2018	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4
			2019	1,1	-	0,5	1,0	-	0,5
			2020	1,1	-	0,5	1,0	-	0,5
			2021	1,0	-	0,5	0,9	-	0,5
			2022	1,1	-	0,6	1,1	-	0,5
Y72	Herpes genitalis man	Acuut	2018	0,9	-	0,5	1,0	-	0,5
			2019	0,9	-	0,5	0,9	-	0,5
			2020	0,9	-	0,4	0,9	-	0,5
			2021	0,9	-	0,4	0,9	-	0,5
			2022	0,9	-	0,4	0,9	-	0,5
Y73	Prostatitis/vesiculitis seminalis	Acuut	2018	1,8	-	0,9	2,1	-	1,0
			2019	1,8	-	0,9	2,0	-	1,0
			2020	1,6	-	0,8	1,8	-	0,9
			2021	1,5	-	0,7	1,7	-	0,9
			2022	1,4	-	0,7	1,7	-	0,8
Y74	Orchitis/epididymitis	Acuut	2018	3,1	-	1,5	3,0	-	1,5
			2019	3,2	-	1,6	3,2	-	1,6
			2020	2,9	-	1,5	2,9	-	1,5
			2021	2,9	-	1,4	2,8	-	1,4
			2022	3,5	-	1,7	3,4	-	1,7
Y75	Balanitis	Acuut	2018	7,3	-	3,6	6,0	-	3,0
			2019	7,1	-	3,6	5,8	-	2,9
			2020	6,8	-	3,4	5,4	-	2,7
			2021	7,1	-	3,6	5,7	-	2,8
			2022	7,8	-	3,9	6,3	-	3,1
Y76	Condylomata acuminata man	Acuut	2018	3,3	-	1,6	3,4	-	1,7
			2019	3,2	-	1,6	3,3	-	1,6
			2020	3,2	-	1,6	3,3	-	1,6
			2021	3,4	-	1,7	3,5	-	1,8

			2022	3,3	-	1,6	3,4	-	1,7
Y77	Maligniteit prostaat	Chronisch	2018	1,0	-	0,5	13,5	-	6,7
			2019	1,0	-	0,5	13,9	-	6,9
			2020	0,9	-	0,4	14,2	-	7,1
			2021	1,0	-	0,5	14,7	-	7,3
			2022	1,0	-	0,5	15,1	-	7,5
Y78	Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man	Chronisch	2018	0,1	-	<0,1	2,4	-	1,2
			2019	0,1	-	<0,1	2,5	-	1,3
			2020	0,1	-	<0,1	2,6	-	1,3
			2021	0,1	-	<0,1	2,7	-	1,4
			2022	0,1	-	<0,1	2,8	-	1,4
Y79	Benigne neoplasma geslachtsorganen/borsten man	Acuut	2018	0,2	-	<0,1	0,2	-	0,1
			2019	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1
			2020	0,2	-	<0,1	0,2	-	0,1
			2021	0,2	-	<0,1	0,2	-	0,1
			2022	0,2	-	<0,1	0,2	-	0,1
Y80	Letsel geslachtsorganen man	Acuut	2018	1,0	-	0,5	1,0	-	0,5
			2019	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4
			2020	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4
			2021	1,0	-	0,5	0,9	-	0,4
			2022	0,9	-	0,5	0,8	-	0,4
Y81	Phimosis/slurf-preputium	Langdurig	2018	3,7	-	1,8	6,1	-	3,0
			2019	3,8	-	1,9	6,1	-	3,0
			2020	3,4	-	1,7	5,9	-	3,0
			2021	3,7	-	1,8	6,2	-	3,1
			2022	3,7	-	1,8	6,1	-	3,0
Y82	Hypospadie	Chronisch	2018	<0,1	-	<0,1	2,3	-	1,1
			2019	<0,1	-	<0,1	2,3	-	1,1
			2020	<0,1	-	<0,1	2,3	-	1,2
			2021	<0,1	-	<0,1	2,5	-	1,2
			2022	0,1	-	<0,1	2,5	-	1,3
Y83	Cryptorchisme/niet ingedaalde testis	Langdurig	2018	0,8	-	0,4	1,4	-	0,7

			2019	0,8	-	0,4	1,3	-	0,7
			2020	0,7	-	0,3	1,2	-	0,6
			2021	0,8	-	0,4	1,3	-	0,6
			2022	0,7	-	0,4	1,2	-	0,6
Y84	Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man	Chronisch	2018	0,1	-	<0,1	1,4	-	0,7
			2019	<0,1	-	<0,1	1,4	-	0,7
			2020	<0,1	-	<0,1	1,4	-	0,7
			2021	<0,1	-	<0,1	1,6	-	0,8
			2022	<0,1	-	<0,1	1,6	-	0,8
Y85	Benigne prostaathypertrofie	Acuut	2018	12,8	-	6,4	14,8	-	7,3
			2019	12,7	-	6,3	14,4	-	7,1
			2020	11,1	-	5,5	13,6	-	6,8
			2021	11,8	-	5,9	14,1	-	7,0
			2022	11,6	-	5,7	14,0	-	7,0
Y86	Hydrokèle	Langdurig	2018	0,7	-	0,3	1,2	-	0,6
			2019	0,7	-	0,4	1,2	-	0,6
			2020	0,6	-	0,3	1,1	-	0,6
			2021	0,7	-	0,3	1,2	-	0,6
			2022	0,7	-	0,3	1,2	-	0,6
Y99	Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten man	Langdurig	2018	4,5	-	2,2	7,1	-	3,5
			2019	4,4	-	2,2	7,0	-	3,5
			2020	4,1	-	2,1	7,1	-	3,5
			2021	4,2	-	2,1	6,9	-	3,4
			2022	4,3	-	2,2	7,0	-	3,5
Z01	Armoede/financieel probleem	Acuut	2018	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			2019	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
			2020	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
			2021	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3
			2022	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Z02	Probleem met voedsel/water	Acuut	2018	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2019	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
			2020	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	0,1	0,1

			2021	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			2022	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Z03	Probleem huisvesting/buurt	Acuut	2018	1,1	1,5	1,3	1,3	1,7	1,5
			2019	0,9	1,4	1,1	1,1	1,5	1,3
			2020	1,1	1,5	1,3	1,3	1,7	1,5
			2021	0,9	1,3	1,1	1,0	1,5	1,3
			2022	0,9	1,1	1,0	0,9	1,2	1,1
Z04	Probleem met sociale/culturele achtergrond	Acuut	2018	0,4	0,8	0,6	0,5	0,9	0,7
			2019	0,3	0,7	0,5	0,4	0,8	0,6
			2020	0,3	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6
			2021	0,3	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5
			2022	0,3	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5
Z05	Probleem met werksituatie	Acuut	2018	2,2	2,6	2,4	2,6	3,0	2,8
			2019	2,1	2,4	2,2	2,4	2,8	2,6
			2020	1,7	1,9	1,8	2,1	2,4	2,3
			2021	1,8	1,9	1,8	2,1	2,2	2,1
			2022	1,6	1,7	1,7	1,9	2,1	2,0
Z06	Probleem met werkloosheid	Acuut	2018	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
			2019	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
			2020	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
			2021	0,1	<0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2022	<0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
Z07	Probleem met opleiding	Acuut	2018	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
			2019	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
			2020	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
			2021	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			2022	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Z08	Probleem met sociale verzekering/welzijnszorg	Acuut	2018	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
			2019	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			2020	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
			2021	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2022	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Z09	Probleem met justitie/politie	Acuut	2018	0,2	<0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
			2019	0,1	<0,1	0,1	0,2	<0,1	0,1
			2020	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	0,1
			2021	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
			2022	0,1	<0,1	<0,1	0,1	<0,1	<0,1
Z10	Probleem toegankelijkheid/beschikbaarheid gezondheidszorg	Acuut	2018	2,0	2,6	2,3	2,2	2,8	2,5
			2019	1,8	2,3	2,1	2,0	2,5	2,2
			2020	3,5	4,0	3,8	3,8	4,3	4,0
			2021	1,6	2,3	1,9	1,7	2,5	2,1
			2022	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	1,6
Z11	Probleem met ziek zijn	Acuut	2018	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5
			2019	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
			2020	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5
			2021	0,3	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5
			2022	0,4	0,6	0,5	0,4	0,7	0,6
Z12	Relatieprobleem met partner	Acuut	2018	4,7	8,3	6,5	5,4	9,5	7,5
			2019	4,6	8,0	6,3	5,3	9,0	7,2
			2020	3,9	6,6	5,3	4,5	7,9	6,2
			2021	3,6	6,3	5,0	4,3	7,4	5,9
			2022	3,5	6,1	4,8	4,0	7,1	5,5
Z13	Probleem met gedrag van partner	Acuut	2018	0,5	1,2	0,9	0,6	1,3	1,0
			2019	0,5	1,2	0,9	0,6	1,4	1,0
			2020	0,4	1,0	0,7	0,5	1,2	0,9
			2021	0,4	1,1	0,7	0,5	1,2	0,9
			2022	0,5	1,1	0,8	0,5	1,3	0,9
Z14	Probleem met ziekte van partner	Acuut	2018	2,8	5,0	3,9	3,1	5,5	4,3
			2019	2,8	5,1	3,9	3,1	5,7	4,4
			2020	2,9	5,2	4,1	3,2	5,9	4,6
			2021	2,8	5,3	4,1	3,2	6,0	4,6
			2022	2,8	5,0	3,9	3,1	5,6	4,4
Z15	Verlies/overlijden van partner	Acuut	2018	2,7	6,1	4,4	3,1	7,1	5,1
			2019	2,9	6,5	4,7	3,2	7,4	5,3

			2020	2,9	6,6	4,8	3,3	7,7	5,5
			2021	2,9	6,9	4,9	3,4	8,1	5,8
			2022	3,2	6,7	4,9	3,7	8,0	5,8
Z16	Relatieprobleem met kind	Acuut	2018	1,3	2,6	2,0	1,4	3,0	2,2
			2019	1,1	2,6	1,9	1,2	2,9	2,1
			2020	1,0	2,1	1,5	1,1	2,5	1,8
			2021	0,9	2,1	1,5	1,1	2,4	1,7
			2022	0,8	2,1	1,5	1,0	2,4	1,7
Z18	Probleem met ziekte van kind	Acuut	2018	1,3	3,5	2,4	1,4	4,0	2,7
			2019	1,2	3,7	2,4	1,4	4,1	2,7
			2020	1,3	4,3	2,8	1,5	4,6	3,1
			2021	1,5	5,1	3,3	1,7	5,7	3,7
			2022	1,4	5,0	3,2	1,6	5,6	3,6
Z19	Verlies/overlijden van kind	Acuut	2018	0,6	1,4	1,0	0,7	1,6	1,1
			2019	0,6	1,3	1,0	0,7	1,5	1,1
			2020	0,5	1,2	0,9	0,6	1,4	1,0
			2021	0,6	1,3	1,0	0,7	1,6	1,2
			2022	0,6	1,3	0,9	0,7	1,5	1,1
Z20	Relatieprobleem met ouders/familie	Acuut	2018	1,0	2,0	1,5	1,2	2,3	1,8
			2019	1,0	2,0	1,5	1,2	2,3	1,7
			2020	1,0	1,7	1,3	1,1	2,0	1,5
			2021	1,0	1,8	1,4	1,1	2,0	1,6
			2022	0,9	1,6	1,2	1,0	1,9	1,4
Z21	Probleem met gedrag van ouders/familie	Acuut	2018	0,9	1,3	1,1	1,0	1,4	1,2
			2019	0,9	1,3	1,1	1,0	1,5	1,2
			2020	0,8	1,2	1,0	0,9	1,4	1,1
			2021	0,8	1,2	1,0	0,9	1,4	1,1
			2022	0,7	1,1	0,9	0,8	1,3	1,0
Z22	Probleem met ziekte van ouders/familie	Acuut	2018	2,4	4,6	3,5	2,6	5,2	3,9
			2019	2,3	4,7	3,5	2,6	5,2	3,9
			2020	2,2	4,3	3,3	2,6	4,8	3,7
			2021	2,2	4,5	3,4	2,5	5,0	3,8

			2022	2,3	4,2	3,2	2,6	4,7	3,7
Z23	Verlies/overlijden van ouders/familie	Acuut	2018	2,3	4,4	3,4	2,6	4,9	3,8
			2019	2,5	4,3	3,4	2,8	4,9	3,8
			2020	2,5	4,2	3,4	2,9	4,8	3,9
			2021	2,6	4,7	3,6	3,0	5,3	4,2
			2022	2,6	4,4	3,5	3,0	5,2	4,1
Z24	Relatieprobleem met vrienden	Acuut	2018	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2
			2019	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
			2020	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
			2021	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
			2022	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Z25	Probleem ten gevolge van geweld	Acuut	2018	1,3	2,4	1,9	1,5	2,7	2,1
			2019	1,1	2,1	1,6	1,2	2,3	1,8
			2020	1,0	2,0	1,5	1,1	2,3	1,7
			2021	1,0	2,0	1,5	1,1	2,3	1,7
			2022	1,1	2,0	1,6	1,3	2,3	1,8
Z27	Angst een sociaal probleem te hebben	Acuut	2018	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2019	<0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2020	<0,1	0,1	0,1	<0,1	0,1	<0,1
			2021	0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
			2022	<0,1	0,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Z28	Sociale functiebeperking/handicap	Chronisch	2018	0,6	0,7	0,6	6,7	8,2	7,5
			2019	0,5	0,7	0,6	6,1	7,6	6,9
			2020	0,6	0,7	0,6	6,9	8,6	7,8
			2021	0,3	0,4	0,3	4,5	6,2	5,4
			2022	0,2	0,3	0,3	4,8	6,3	5,6
Z29	Ander sociaal probleem	Acuut	2018	4,0	5,6	4,8	4,6	6,6	5,6
			2019	4,3	6,0	5,2	4,9	6,8	5,9
			2020	3,4	4,7	4,1	4,0	5,6	4,8
			2021	3,5	4,8	4,2	4,1	5,7	4,9
			2022	4,4	6,1	5,3	5,2	7,0	6,1