

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 6^e gegevensrapportage volwassenen (april-juni 2023)

Mark Bosmans, Christos Baliatsas, Mariëtte Hooiveld, Tessa Magnée,
Babet Kanis, Michel Dückers

In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De data waarop de cijfers in dit cijferoverzicht betrekking hebben komen uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Nivel Zorgregistraties) en richt zich op volwassenen (25 jaar en ouder). Daarnaast worden vragenlijsten uitgezet in representatieve panels. Beide datastromen worden ook gepresenteerd op een RIVM-website: <https://www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19>.

Actuele cijfers gebruik huisartsenzorg

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de Nederlandse volwassenen, zowel direct als indirect. Om deze in kaart te brengen heeft het Nivel cijfers omtrent huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende gezondheidsproblemen op een rijtje gezet, met gebruikmaking van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We richten ons op een aantal 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat om zowel gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, en symptomen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Sinds 2022 zijn daar ook cijfers rondom suïcide(pogingen/gedachten) aan toegevoegd. De cijfers van april tot en met juni (2023) worden vergeleken met die van dezelfde maanden in eerdere jaren (2019, 2020 en 2021). Hierbij is onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75+), geslacht en provincies (zie bijlage).


NB: het gaat bij de kort-cyclische monitoring altijd om momentopnames: het geeft een beeld van het welzijn en de problemen van (doelgroepen binnen) de Nederlandse bevolking op een bepaald punt in de tijd. Tijdens de coronapandemie veranderen de omstandigheden met betrekking tot de virussituatie en de genomen maatregelen voortdurend. Het is mogelijk dat deze inmiddels anders zijn dan tijdens de periode waar de cijfers van de meest actuele ronde van kort-cyclische monitoring op zijn gebaseerd. Deze rapportage richt zich op april tot en met juni 2023.

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van gezondheidsproblemen die zeer weinig voorkomen (zoals in dit cijferoverzicht bijvoorbeeld het geval is bij suïcide(pogingen)). Hierbij kunnen kleine verschillen al tot grote schommelingen leiden.

Wat valt op in de periode april-juni 2023:

Geheugen- en concentratieproblemen

- De zorgprevalentie voor geheugen- en concentratieproblemen lag in het tweede kwartaal van 2023 flink hoger dan voor corona (2019). Wel is het verschil met 2019 iets lager dan in het eerste kwartaal van 2023.
- Het ging hierbij vrijwel uitsluitend om de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). De jongste twee leeftijdsgroepen (25-44 en 45-64 jaar) kwamen hiervoor veel minder bij de huisarts,. De toename t.o.v. 2019 was in dit kwartaal wel veel sterker bij de jongste twee leeftijdsgroepen dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Vrouwen kwamen hiervoor wat vaker bij de huisarts dan mannen.




Figuur 1 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen- en concentratieproblemen onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Spierpijn

- In het tweede kwartaal van 2023 lag het aantal contacten met de huisarts voor spierpijn lager dan in dezelfde periode van 2019. Er lijkt sprake te zijn van een aanhoudend dalende trend sinds het begin van de pandemie. Dit is bij alle leeftijdsgroepen terug te zien.


- Het gaat bij contacten met de huisarts voor spierpijn vooral om vrouwen. Bij deze groep is dan ook met name de afname in aantal contacten met de huisarts te zien.



Figuur 2 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Hartkloppingen


- Anders dan in het eerste kwartaal ligt het aantal contacten met de huisarts voor hartkloppingen in het tweede kwartaal van 2023 op een vergelijkbaar niveau met 2019.
- Vrouwen komen hiervoor veel vaker bij de huisarts dan mannen.



Figuur 3 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Misselijkheid


- In de periode april tot en met juni kwam men minder vaak bij de huisarts voor misselijkheid dan in 2019.
- De oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder) komt hiervoor vaker bij de huisarts dan de andere groepen. Hetzelfde geldt voor vrouwen.



Figuur 4 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Suicide(pogingen/gedachten)

- Het aantal huisartscontacten rondom suicide(pogingen/gedachten) zijn in absolute zin laag. In het tweede kwartaal van 2023 zijn de cijfers grotendeels vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Opvallend is wel dat er in het begin van juni een kleine piek in het aantal contacten met



de huisarts was. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Suicide(pogingen/gedachten) kwamen vaker voor onder de jongste leeftijdsgroep (25-44 jaar) dan onder de oudere leeftijdsgroepen.

Figuur 5 Weekcijfers huisartsconsulten van van suicide(pogingen/gedachten onder volwassenen (25 jaar en ouder).

Verschillen tussen mannen en vrouwen

- Over het algemeen liggen zorgprevalenties (in alle jaren) bij vrouwen hoger bij verschillende gezondheidsproblemen. Dit was met name het geval bij een aantal psychische problemen (angst, depressie en stress/crisis), maar ook bij misselijkheid, spierpijn, hartkloppingen,

moeheid, duizeligheid, slaapproblemen en hoofdpijn). Bij andere klachten en gezondheidsproblemen zijn er geen of kleine verschillen.

Verschillen naar leeftijd

- De leeftijdsgroep 75 jaar en ouder ging vaker naar de huisarts dan jongere mensen voor een deel van de in dit cijferoverzicht beschreven gezondheidsproblemen/aandoeningen, vooral voor geheugen- en concentratieproblemen, duizeligheid, benauwdheid en slaapproblemen, maar ook voor pijn en druk toegeschreven aan het hart, moeheid en misselijkheid.
- De jongere leeftijdsgroepen gingen juist vaker naar de huisarts voor depressieve klachten, hevige stress of crisis en suïcide pogingen/gedachten.

Over de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De surveillance cijfers van Nivel Zorgregistraties zijn bedoeld voor de signalering van (infectie-) ziekten en andere klachten in de algemene bevolking, maar kunnen ook gebruikt worden voor de monitoring van plotselinge veranderingen in andere acute klachten. Er zijn wekelijkse cijfers beschikbaar over gezondheidsproblemen en aandoeningen in de Nederlandse bevolking op basis van – geanonimiseerde – gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken. De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde gezondheidsproblemen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (cijfer van prevalentie van contact met de huisarts). De gegevens zijn afkomstig van ca. 390 deelnemende huisartsenpraktijken met ongeveer 1,6 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). De gegevens over de door huisartsen geregistreerde gezondheidsproblemen en aandoeningen worden routinematig vastgelegd gebruikmakend van de ICPC (International Classification of Primary Care, versie 1). Dit classificatiesysteem wordt in Nederland door alle huisartsen gebruikt.

Acute gezondheidsproblemen/condities die mogelijk (direct of indirect) gerelateerd zijn aan de coronapandemie, zoals gepresenteerd aan huisartsen, zijn in kaart gebracht. We richten ons op een aantal 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat om zowel gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, en gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen worden door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Een directe link is echter niet te maken: besmetting wordt niet geregistreerd in deze data. Zie onderstaande tabel voor de geïncludeerde gezondheidsproblemen en ICPC codes:

Tabel 1

Lijst met 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen en overeenkomende ICPC-1 codes

<i>Gezondheidsproblemen</i>	<i>ICPC code (naam code)</i>
Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)*	R02 (Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen) R03 (Piepende ademhaling) R04 (Andere problemen ademhaling) R29 (Andere symptomen/klachten luchtwegen)
Moeheid*	A04 (Moeheid/zwakte)
Spierpijn*	L18
Misselijkheid	D09
Pijn of druk op de borst*	K01 (Pijn toegeschreven aan hart)

	K02 (Druk/beklemming toegeschreven aan hart)
	K03 (Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel)
Hartkloppingen*	K04 (Hartkloppingen/bewust van hartslag)
Angstig/nerveus/gespannen gevoel	P01
Plotselinge (hevige) stress of crisis	P02 (Crisis/voorbijgaande stressreactie)
Depressief gevoel*	P03 (Down/depressief gevoel)
Suicide(pogingen) en suïcidale gedachten	P77 (Suicide(poging))
Slaapproblemen	P06 (Slapeloosheid/andere slaapstoornis)
Hoofdpijn*	N01
	N02 (Spanningshoofdpijn)
Duizeligheid of licht in het hoofd	N17
Geheugen- of concentratieproblemen*	P20 (Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen)
Andere afwijking(en) reuk/smaak*	N16

* Relevant voor 'Long covid' volgens de RIVM-lijst:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/langdurige-klachten-na-corona>

Deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel Zorgregistraties, onder nummer NZR-00321.036.

Meer weten?

Meer informatie over de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is te vinden op <https://www.nivel.nl/nl/project/integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-gor-covid-fysieke-en-psychische-gezondheidseffecten>.

U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties. Meer informatie over de surveillance staat op: www.nivel.nl/surveillance. Gegevens van Nivel Zorgregistraties zijn op aanvraag beschikbaar: www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel.

Titelgegevens van deze publicatie

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: Bosmans, M., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magneé, T., Kanis, B., Dückers, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 6e gegevensrapportage volwassenen (april-juni 2023). KORT-CYCLISCHE NIVEL ZORGREGISTRATIES RAPPORTAGE. Utrecht: Nivel, 2023.

1 Wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor gezondheidsproblemen en aandoeningen

1.1 Ademhalingsproblemen




Fig. 1.1 Weekcijfers huisartsconsulten van benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.2 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.3 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.4 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.5 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.6 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.7 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.8 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.9 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder volwassenen, verdeeld over geslacht.




Fig. 1.10 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.11 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.12 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.2 Moeheid




Fig. 1.13 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.14 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.15 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder volwassenen, verdeeld over geslacht.

1.3 Spierpijn




Fig. 1.16 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.17 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.18 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.4 Misselijkheid




Fig. 1.19 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.20 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.21 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder volwassenen, verdeeld over geslacht.

1.5 Pijn of druk op de borst




Fig. 1.22 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.23 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan hart onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.24 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.25 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.26 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan hart onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.27 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.28 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan het hart onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.29 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan het hart onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.30 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.6 Hartkloppingen




Fig. 1.31 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.32 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.33 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.7 Angstig, nerveus, gespannen




Fig. 1.34 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.35 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.36 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.8 Plotselinge (hevige) stress of crisis




Fig. 1.37 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.38 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.39 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.9 Depressieve gevoelens




Fig. 1.40 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.41 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.42 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.10 Suïcide(pogingen/gedachten)




Fig. 1.43 Weekcijfers huisartsconsulten van suïcide(pogingen/gedachten) onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.44 Weekcijfers huisartsconsulten van suïcide(pogingen/gedachten) onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.45 Weekcijfers huisartsconsulten van suïcide(pogingen/gedachten) onder volwassenen, verdeeld over geslacht.

1.11 Slaapproblemen




Fig. 1.46 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.47 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.48 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.12 Hoofdpijn




Fig. 1.49 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.50 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.51 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.52 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.53 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.




Fig. 1.54 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.13 Duizeligheid of licht in het hoofd




Fig. 1.55 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.56 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.57 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.14 Geheugen- of concentratieproblemen




Fig. 1.58 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.59 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.60 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder volwassenen verdeeld over geslacht.

1.15 Afwijkingen in reuk of smaak




Fig. 1.61 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen (25 jaar en ouder).




Fig. 1.62 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen, verdeeld over 4 leeftijdsgroepen (25-44, 45-64, 65-74, 75 jaar en ouder).




Fig. 1.63 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder volwassenen verdeeld over geslacht.

2 Bijlage. provinciale specificering wekelijkse zorgprevalenties van symptomen en aandoeningen




Fig. 1.64 Weekcijfers huisartsconsulten dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen per provincie.




Fig. 1.65 Weekcijfers huisartsconsulten piepende ademhaling per provincie.




Fig. 1.66 Weekcijfers huisartsconsulten andere problemen ademhaling per provincie.




Fig. 1.67 Weekcijfers huisartsconsulten andere symptomen/klachten luchtwegen per provincie.




Fig. 1.68 Weekcijfers huisartsconsulten moeheid naar provincie




Fig. 1.69 Weekcijfers huisartsconsulten spierpijn per provincie.




Fig. 1.70 Weekcijfers huisartsconsulten misselijkheid naar provincie




Fig. 1.71 Weekcijfers huisartsconsulten pijn toegeschreven aan het hart per provincie




Fig. 1.72 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan het hart per provincie.



Fig. 1.73 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hart vaatstelsel per provincie.




Fig. 1.74 Weekcijfers huisartsconsulten hartkloppingen per provincie.




Fig. 1.75 Weekcijfers huisartsconsulten angstige, nerveuze of gespannen gevoelens per provincie.




Fig. 1.76 Weekcijfers huisartsconsulten plotselinge (hevige) stress of crisis per provincie.




Fig. 1.77 Weekcijfers huisartsconsulten depressieve gevoelens per provincie.




Fig. 1.78 Weekcijfers huisartsenconsulten suicide(pogingen/gedachten) per provincie.




Fig. 1.79 Weekcijfers huisartsconsulten slaapproblemen per provincie.




Fig. 1.80 Weekcijfers huisartsconsulten hoofdpijn per provincie.




Fig. 1.81 Weekcijfers huisartsconsulten spanningshoofdpijn per provincie.




Fig. 1.82 Weekcijfers huisartsconsulten duizelig/licht in het hoofd per provincie.




Fig. 1.83 Weekcijfers huisartsconsulten geheugen- of concentratieproblemen per provincie.




Fig. 1.84 Weekcijfers huisartsconsulten afwijking(en) reuk/smaak per provincie.