

Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 15^e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2025)

Julie Penders, Christos Baliatsas, Mariëtte Hooiveld, Tessa Magnée,
Michel Dückers, Mark Bosmans

In dit cijferoverzicht worden resultaten getoond van de kort-cyclische monitoring binnen de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Doel van deze monitor is het bieden van een goede informatiebasis wat betreft de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis, om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Deze kort-cyclische monitoring levert ongeveer vier keer per jaar een beperkte verzameling van geïnterpreteerde cijfers op. De hoge frequentie van verschijnen draagt zorg voor inzicht in de actuele situatie in Nederland.

De data waarop de cijfers in dit cijferoverzicht betrekking hebben komen van huisartspraktijken die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (Nivel Zorgregistraties) en richten zich op jeugdigen (0 t/m 24 jaar). Daarnaast worden vragenlijsten uitgezet in representatieve panels. Beide datastromen worden ook gepresenteerd op een [RIVM-website](#).

Actuele cijfers gebruik huisartsenzorg

De coronapandemie heeft sinds maart 2020 grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd, zowel direct als indirect. Om deze in kaart te brengen heeft het Nivel cijfers omtrent huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende gezondheidsproblemen op een rijtje gezet, met gebruikmaking van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We richten ons hierbij op een aantal 'niet-specifieke' gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat zowel om gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, als om gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Sinds 2022 zijn daar ook cijfers rondom suicide(pogingen/gedachten) aan toegevoegd. De cijfers van januari tot en met maart (2025) worden vergeleken met die van dezelfde maanden in eerdere jaren (2019, 2023 en 2024). Hierbij is onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar), geslacht en provincies (zie bijlage). Hierbij willen we benadrukken dat deze cijfers niet aangeven of het om meer of minder mensen met deze gezondheidsproblemen gaat, maar alleen hoeveel consulten hiervoor bij de huisarts plaatsvonden.

NB: het gaat bij de kort-cyclische monitoring altijd om momentopnames: het geeft een beeld van het welzijn en de problemen van (doelgroepen binnen) de Nederlandse bevolking op een bepaald punt in de tijd. Deze rapportage richt zich op de periode januari tot en met maart 2025. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat men voorzichtig moet zijn met de interpretatie van gezondheidsproblemen die zeer weinig voorkomen, zoals in dit cijferoverzicht het geval is bij hartklachten en suicide(pogingen). Hierbij kunnen kleine verschillen al tot grote schommelingen leiden.


Wat valt op in de periode januari-maart 2025

In deze paragraaf lichten we de meest opvallende resultaten uit de periode januari-maart 2025 toe.

Depressieve gevoelens

- In januari-maart 2025 was het aantal huisartsconsulten voor depressieve gevoelens 10% lager dan in dezelfde periode in 2019. Dit is opvallend, omdat de prevalenties in 2023 en 2024 juist nog hoger waren dan in 2019. In het vierde kwartaal van 2024 werd voor het eerst een lichte daling ten opzichte van 2019 waargenomen (-4%). Deze daling heeft zich in het eerste kwartaal van 2025 dus verder doorgezet.
- Het merendeel van de consulten betrof de groep 15-24-jarigen. Bij 0-4-jarigen wordt deze klacht vrijwel niet geregistreerd en ook bij de 5-14-jarigen is het aandeel erg klein.
- Net als in eerdere kwartalen komen consulten voor depressieve gevoelens ruim twee keer zo vaak voor bij vrouwen/meisjes als bij mannen/jongens.

Figuur 1 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder jeugd (0-24 jaar).




Suïcidepogingen/gedachten

- In de periode januari-maart 2025 was het aantal huisartsconsulten voor suïcidepogingen en -gedachten 34% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Daarmee is dit het hoogste aantal gemeten in een eerste kwartaal, al ligt het slechts iets hoger dan in 2024 (toen +32% ten opzichte van 2019). De stijging van 2024 naar 2025 is kleiner dan de stijgingen die we eerder zagen ten opzichte van het vorige jaar.
- Het gaat bij deze cijfers om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Het wekelijks aantal huisartscontacten voor suïcide(pogingen) laat bij deze leeftijdsgroep al jaren (ook al voor de coronapandemie) een langzaam stijgende trend zien (zie Figuur 2.85 in de bijlage voor deze prevalenties), al was deze stijging voor de pandemie minder sterk.

- Zoals gebruikelijk kwamen de meeste consulten voor bij de oudste leeftijdsgroep (15-24 jaar). In de jongste leeftijdsgroep (0-4 jaar) kwamen deze consulten vrijwel niet voor; ook bij 5-14-jarigen bleef het aantal laag.
- Vrouwen/meisjes zochten drie keer zo vaak hulp als mannen/jongens. Sinds 2019 is ook vooral het aantal consulten bij vrouwen/meisjes gestegen.


Figuur 2 Weekcijfers huisartsconsulten suicide(pogingen/gedachten) onder jeugd (0-24 jaar).



Duizeligheid

- In de periode januari-maart was het aantal huisartsconsulten voor duizeligheid was 46% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Dit is vergelijkbaar met de prevalenties in dezelfde maanden van 2023 en 2024, waarbij de stijging respectievelijk 34% en 40% was ten opzichte van 2019. De stijging in 2025 is dus nog iets sterker dan in de voorgaande jaren, met nog steeds een aanzienlijke verhoging in consulten ten opzichte van 2019.
- Zoals gebruikelijk kwamen de meeste consulten voor bij de 15-24-jarigen, terwijl er bij de 0-4-jarigen nauwelijks sprake was van consulten voor duizeligheid.
- Vrouwen/meisjes zochten in dit kwartaal ruim 3 keer zo vaak contact voor duizeligheid als mannen/jongens. Ook in eerdere kwartalen raadpleegden vrouwen/meisjes vaker de huisarts hiervoor, maar ten opzichte van 2019 is het aantal consulten bij vrouwen/meisjes ook sterker toegenomen dan bij mannen/jongens. Deze trend was ook al zichtbaar in 2024.


Figuur 3 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder jeugd (0-24 jaar).



Angstige gevoelens

- Het aantal huisartsconsulten voor angstige gevoelens lag in januari-maart 2025 19% hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Daarmee is de prevalentie nog steeds duidelijk verhoogd, hoewel het verschil met 2019 iets kleiner is dan in 2023 (24% hoger dan 2019) en 2024 (25% hoger dan 2019).
- Net als in eerdere jaren kwamen de meeste consulten voor bij de oudste leeftijdsgroep, terwijl er bij de jongste groep (0-4 jaar) nauwelijks sprake was van consulten voor angstige gevoelens.
- Vrouwen/meisjes hadden in dit kwartaal 2,5 keer zo vaak consulten voor angstige gevoelens als mannen/jongens, wat aansluit bij het patroon van eerdere kwartalen.


Figuur 4 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder jeugd (0-24 jaar).



Andere klachten luchtwegen

- Het aantal huisartsconsulten voor andere symptomen/klachten aan de luchtwegen (hikken en prikkelbare luchtwegen) was in het eerste kwartaal van 2025 32% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Daarmee zitten de prevalenties weer op het niveau van 2023, na wat hogere prevalenties in 2024.
- De meeste consulten waren zoals gewoonlijk bij 0-4-jarigen. Door een afname van 49% ten opzichte van 2019 bij deze groep is het verschil met oudere groepen kleiner dan in eerdere jaren.
- Mannen/jongens kwamen vaker met deze klachten bij de huisarts dan vrouwen/meisjes. Ten opzichte van 2019 is bij beide groepen een vergelijkbare afname te zien.

Figuur 5 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder jeugd (0-24 jaar).



Over de surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De wekelijkse cijfers van Nivel Zorgregistraties zijn met name bedoeld voor de signalering van infectieziekten in de algemene bevolking, maar kunnen ook gebruikt worden voor de monitoring van plotselinge veranderingen in andere gezondheidsproblemen. Er zijn wekelijkse cijfers beschikbaar over gezondheidsproblemen en aandoeningen in de Nederlandse bevolking op basis van – geanonimiseerde – gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken. De cijfers worden berekend als het aantal personen dat de huisarts in die week heeft geraadpleegd voor bepaalde gezondheidsproblemen of aandoeningen, gedeeld door het totaal aantal ingeschreven patiënten in de praktijk (cijfer van prevalentie van contact met de huisarts). De gegevens zijn afkomstig van ca. 400 deelnemende huisartsenpraktijken met ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). De gegevens over de door huisartsen geregistreerde gezondheidsproblemen en aandoeningen worden routinematig vastgelegd gebruikmakend van de ICPC (International Classification of Primary Care, versie 1). Dit classificatiesysteem wordt in Nederland door alle huisartsen gebruikt.

Acute gezondheidsproblemen/condities die mogelijk (direct of indirect) gerelateerd zijn aan de coronapandemie, zoals gepresenteerd aan huisartsen, zijn in kaart gebracht. We richten ons op een aantal “niet-specifieke” gezondheidsproblemen die een fysieke en/of mentale oorzaak kunnen hebben (het gaat om zowel gezondheidsproblemen die zijn geregistreerd bij episodes van aandoeningen, als om gezondheidsproblemen die niet aan een aandoening worden toegeschreven). Een deel van deze gezondheidsproblemen wordt door het RIVM genoemd als mogelijke langdurige klachten na het doormaken van een infectie met het coronavirus. Een directe link is echter niet te maken: besmetting wordt niet geregistreerd in de data. Zie tabel 1 hierna voor de geïncorporeerde gezondheidsproblemen en ICPC-codes.

Specifiek voor jeugdigen is het belangrijk om te vermelden dat het in Nederland vanaf 12 jaar is toegestaan om zelf naar de huisarts te gaan (zonder begeleiding van ouder/verzorger). Tot 16 jaar geldt wel dat hiervoor toestemming nodig is van een ouder/verzorger. Dat betekent dat de beslissing om met een bepaalde klacht naar de huisarts te

gaan voor de jongere leeftijdsgroepen niet volledig in handen ligt van degene met de klachten. Dit is echter zo in ieder jaar en verklaart geen verschillen over de tijd.

Deze studie is goedgekeurd volgens de governance code van Nivel Zorgregistraties, onder nummer NZR-00322.009.

Meer weten?

Meer informatie over de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 is te vinden op

<https://www.nivel.nl/nl/project/integrale-gezondheidsmonitor-covid-19-gor-covid-fysieke-en-psychische-gezondheidseffecten>.

U vindt deze publicatie en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties. Meer informatie over de surveillance staat op: www.nivel.nl/surveillance. Gegevens van Nivel Zorgregistraties zijn op aanvraag beschikbaar: www.nivel.nl/nl/informatie-over-het-aanvragen-van-gegevens-nivel.

Titelgegevens van deze publicatie

De gegevens uit deze publicatie mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: Penders, J., Baliatsas, C., Hooiveld, M., Magnée, T., Dückers, M., Bosmans, M. Kort-cyclisch Cijferoverzicht gezondheidsmonitor COVID-19: 15e gegevensrapportage jeugd (januari-maart 2025). Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Utrecht: Nivel, 2025.

Tabel 1 Lijst met “niet-specifieke” gezondheidsproblemen en overeenkomende diagnosecodes (ICPC-1)

Gezondheidsprobleem	Diagnosecodes (ICPC naam)
Benauwd of kortademig in rust (zonder inspanning)*	R02 (Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen) R03 (Piepende ademhaling) R04 (Andere problemen ademhaling) R29 (Andere symptomen/klachten luchtwegen)
Moeheid*	A04 (Moeheid/zwakte)
Spierpijn*	L18 (Spierpijn)
Misselijkheid	D09 (Misselijkheid)
Pijn of druk op de borst*	K01 (Pijn toegeschreven aan hart) K02 (Druk/beklemming toegeschreven aan hart) K03 (Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel)
Hartkloppingen*	K04 (Hartkloppingen/bewust van hartslag)
Angstig/nerveus/gespannen gevoel	P01 (Angstig/nerveus/gespannen gevoel)
Plotselinge (hevige) stress of crisis	P02 (Crisis/voorbijgaande stressreactie)
Depressief gevoel*	P03 (Down/depressief gevoel)
Suicide(pogingen) en suïcidale gedachten	P77 (Suicide(poging))
Slaapproblemen	P06 (Slapeloosheid/andere slaapproblemen)
Hoofdpijn*	N01 (Hoofdpijn) N02 (Spanningshoofdpijn)
Duizeligheid of licht in het hoofd	N17 (Duizeligheid)
Geheugen- of concentratieproblemen*	P20 (Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen)
Andere afwijking(en) reuk/smaak*	N16 (Andere afwijking(en) reuk/smaak)


* Relevant voor “Long covid” volgens de RIVM-lijst: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/langdurige-klachten-na-corona>

Bijlage: Wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor gezondheidsproblemen en aandoeningen


Deze bijlage presenteert een overzicht van wekelijkse prevalenties van huisartscontacten voor diverse niet-specifieke gezondheidsproblemen en aandoeningen. De grafieken vergelijken gegevens van januari tot en met maart 2025 met voorgaande jaren (2019, 2023, 2024), gedifferentieerd naar leeftijd, geslacht en provincie.

2.1 Ademhalingsproblemen


Figuur 2.1 Weekcijfers huisartsconsulten van benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.2 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.3 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.4 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.5 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.6 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.7 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.8 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.9 Weekcijfers huisartsconsulten van dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen onder jeugd, verdeeld over geslacht.




Figuur 2.10 Weekcijfers huisartsconsulten van piepende ademhaling onder jeugd verdeeld over geslacht.



Figuur 2.11 Weekcijfers huisartsconsulten van andere problemen ademhaling onder jeugd verdeeld over geslacht.




Figuur 2.12 Weekcijfers huisartsconsulten van andere symptomen/klachten luchtwegen onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.2 Moeheid


Figuur 2.13 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.14 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.15 Weekcijfers huisartsconsulten van moeheid onder jeugd, verdeeld over geslacht.




2.3 Spierpijn


Figuur 2.16 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.17 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.18 Weekcijfers huisartsconsulten van spierpijn onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.4 Misselijkheid


Figuur 2.19 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.20 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.21 Weekcijfers huisartsconsulten van misselijkheid onder jeugd, verdeeld over geslacht.




2.5 Pijn of druk op de borst


Figuur 2.22 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.23 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan hart onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.24 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.25 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan hart onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.26 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan hart onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.27 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.28 Weekcijfers huisartsconsulten van pijn toegeschreven aan het hart onder jeugd verdeeld over geslacht.



Figuur 2.29 Weekcijfers huisartsconsulten van druk/beklemming toegeschreven aan het hart onder jeugd verdeeld over geslacht.




Figuur 2.30 Weekcijfers huisartsconsulten van andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.6 Hartkloppingen


Figuur 2.31 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.32 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.33 Weekcijfers huisartsconsulten van hartkloppingen onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.7 Angstig, nerveus, gespannen


Figuur 2.34 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.35 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.36 Weekcijfers huisartsconsulten van angstige, nerveuze of gespannen gevoelens onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.8 Plotselinge (hevige) stress of crisis


Figuur 2.37 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.38 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.39 Weekcijfers huisartsconsulten van plotselinge (hevige) stress of crisis onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.9 Depressieve gevoelens


Figuur 2.40 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.41 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.42 Weekcijfers huisartsconsulten van depressieve gevoelens onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.10 Suicide(pogingen)


Figuur 2.43 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.44 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.45 Weekcijfers huisartsconsulten van suicide(pogingen/gedachten) onder jeugd, verdeeld over geslacht.




2.11 Slaapproblemen


Figuur 2.46 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapproblemen onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.47 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapproblemen onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.48 Weekcijfers huisartsconsulten van slapeloosheid/andere slaapstoornissen onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.12 Hoofdpijn


Figuur 2.49 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.50 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder jeugd (0-24 jaar).




Figuur 2.51 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.52 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).



Figuur 2.53 Weekcijfers huisartsconsulten van hoofdpijn onder jeugd verdeeld over geslacht.




Figuur 2.54 Weekcijfers huisartsconsulten van spanningshoofdpijn onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.13 Duizeligheid of licht in het hoofd


Figuur 2.55 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.56 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.57 Weekcijfers huisartsconsulten van duizeligheid/licht in het hoofd onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.14 Geheugen- of concentratieproblemen


Figuur 2.58 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.59 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.60 Weekcijfers huisartsconsulten van geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen onder jeugd verdeeld over geslacht.




2.15 Afwijkingen in reuk of smaak


Figuur 2.61 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder jeugd (0-24 jaar).



Figuur 2.62 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder jeugd, verdeeld over 3 leeftijdsgroepen (0-4, 5-14, 15-24 jaar).




Figuur 2.63 Weekcijfers huisartsconsulten van andere afwijking(en) reuk/smaak onder jeugd verdeeld over geslacht.




Provinciale specificering wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor gezondheidsproblemen en aandoeningen


Figuur 2.64 Weekcijfers huisartsconsulten dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen per provincie.




Figuur 2.65 Weekcijfers huisartsconsulten piepende ademhaling per provincie.




Figuur 2.66 Weekcijfers huisartsconsulten andere problemen ademhaling per provincie.




Figuur 2.67 Weekcijfers huisartsconsulten andere symptomen/klachten luchtwegen per provincie.




Figuur 2.68 Weekcijfers huisartsconsulten moeheid naar provincie.




Figuur 2.69 Weekcijfers huisartsconsulten spierpijn per provincie.




Figuur 2.70 Weekcijfers huisartsconsulten misselijkheid naar provincie.




Figuur 2.71 Weekcijfers huisartsconsulten pijn toegeschreven aan het hart per provincie.




Figuur 2.72 Weekcijfers huisartsconsulten druk/beklemming toegeschreven aan het hart per provincie.




Figuur 2.73 Weekcijfers huisartsconsulten andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel per provincie.




Figuur 2.74 Weekcijfers huisartsconsulten hartkloppingen per provincie.




Figuur 2.75 Weekcijfers huisartsconsulten angstige, nerveuze of gespannen gevoelens per provincie.




Figuur 2.76 Weekcijfers huisartsconsulten plotselinge (hevige) stress of crisis per provincie.




Figuur 2.77 Weekcijfers huisartsconsulten depressieve gevoelens per provincie.




Figuur 2.78 Weekcijfers huisartsconsulten suicide(pogingen/gedachten) per provincie.




Figuur 2.79 Weekcijfers huisartsconsulten slaapproblemen per provincie.




Figuur 2.80 Weekcijfers huisartsconsulten hoofdpijn per provincie.




Figuur 2.81 Weekcijfers huisartsconsulten spanningshoofdpijn per provincie.




Figuur 2.82 Weekcijfers huisartsconsulten duizelig/licht in het hoofd per provincie.



Figuur 2.83 Weekcijfers huisartsconsulten geheugen- of concentratieproblemen per provincie.



Figuur 2.84 Weekcijfers huisartsconsulten afwijking(en) reuk/smaak per provincie.



Wekelijkse zorgprevalenties van contact met de huisarts voor suïcide(pogingen/gedachten) vanaf 2015

Figuur 2.85 Weekcijfers huisartsconsulten suïcide(pogingen/gedachten) onder jeugd (0-24 jaar) van 2015–3e kw. 2024.

